

## Ackerbohne - Sortenbeschreibung in Bayern

Die Grundlage dieser Beschreibungen bilden die Ergebnisse der bayerischen Landessortenversuche sowie die Einstufungen in der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes (BSA).

Sorten nach Prüfdauer und alphabetisch geordnet, empfohlene Sorten grün unterlegt

Sorte	Prüfjahre	Blühbeginn <sup>1</sup>	Kornertrag	Rohproteinertrag*	Rohproteingehalt*	Tausendkorngewicht	Pflanzenlänge	Standfestigkeit	Anfangsentwicklung	Resistenz gegen <sup>1</sup>		
										Brennflecken ( <i>Ascochyta fabae</i> )	Schokoflecken ( <i>Botrytis fabae</i> )	Ackerbohnenrost
Allison <sup>2</sup>	2020-2023	(+)	(+)	++	0	0	0	0	0		0	(+)
Birgit	2017-2023	(+)	(+)	(+)	0	0	(+)	0	+		0	0
Fuego	2011-2023	(+)	0	0	0	(+)	(-)	0	0	0	0	0
Tiffany <sup>2</sup>	2015-2023	(+)	0	0	0	0	0	0	(+)	0	0	0
Trumpet	2018-2023	0	(-)	(-)	0	-	0	0	(-)	0	0	(-)
Apollo	2021-2023	(+)	0	0	0	0	0	0	0		0	0
GL Lucia	2021-2023	0	0	0	0	++	++	(-)	0			

Zweijährige Ergebnisse sind vorläufig; einjährige stellen einen Trend dar.

Caprice	2022-2023	(+)	0	0	0	(+)	0	(-)	+		0	0
Futura	2023	(+)	(-)			(+)	(-)					0
Genius	2023	(+)	+			+	(-)				(+)	(-)
Iron	2023	(+)	+			+	0				0	(+)
LG Viper	2023	0	(-)			(+)	(-)				(+)	(+)
Protina	2023	(+)	(+)			0	(-)				0	(+)

1) Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes

2) vicin- und convicinarm

\*)Beschreibung aus dem Vorjahr, da Untersuchungsergebnisse aus 2023 noch nicht vorliegen

**Sortenbeschreibung - In früheren Jahren geprüfte Sorten**

Sorten alphabetisch geordnet

Sorte	Prüfjahre <sup>4</sup>	Blühbeginn	Kornertrag	Rohprotein-ertrag	Rohprotein-gehalt	Tausend-kornge-wicht	Pflanzen-länge	Standfes-tigkeit	Anfangs-entwick-lung	Resistenz gegen		
										Brennflecken ( <i>Ascochyta fabae</i> ) <sup>6</sup>	Schokoflecken ( <i>Botrytis fabae</i> )	Bohnen-rost
Alexia	2009-2012		+	(+)	(-)	-	0	-	(+)	(+)	0	(+)
Bianca <sup>2,3</sup>	2019-2020		--	(-)	0	(+)	0	(+)	(-)	0	(-)	(-)
Bioro	2009-2012		0	0	(+)	-	+	-	+	0	0	+
Bolivia <sup>2</sup>	2021-2022		(+)	(+)	0	0	(-)	0	(-)	0	(-)	(+)
Boxer	2014-2016		0	0	0	(+)	0	(+)	0	0	(+)	0
Capri	2020-2022		0	0	(+)	0	(+)	0	0		(-)	-
Daisy	2019-2021		0	0	0	0	0	(+)	+	0	(-)	0
Divine	2009-2011		(-)	(-)	0	0	0	(-)		0	(-)	
Espresso	2009-2011		0	0	(-)	0	0	(+)		(-)	0	(-)
Fabelle	2012-2013		0	0	(+)	0	0	(+)	(+)	0		0
Fanfare	2013-2022		(-)	(-)	0	0	0	(+)	0	0	0	0
GL Sunrise	2018-2020		-	(-)	(+)	(-)	(-)		(-)	0	(-)	+
Herz Freya	2012-2013		(-)	(-)	(-)	-	+	-	+	(+) <sup>6</sup>		+
Isabell	2011-2016		0	0	0	(+)	(+)	0	+	0	(+)	(+)
Julia <sup>1</sup>	2011-2022		0	0	(+)	(-)	(+)	0	-		0	(+)
Macho	2019-2021		0	(-)	(-)	++	(-)	(+)	(-)	(-)	0	0
Melodie	2015-2016		(-)	-	(-)	0	0	-	(-)		-	(+)
Pyramid	2011-2015		0	0	(+)	+	(-)	(+)	(+)	0	0	0
Stella	2019-2021		0	0	0	(+)	0	(-)	++	0	(-)	0
Taifun <sup>3</sup>	2013-2016		-	-	(+)	(-)	-	(-)	-	-	0	(-)
Tangentia <sup>3</sup>	2009-2012		-	(-)	+	0	(-)	+	(-)	(-)	(-)	(-)

1) Julia erzielt auf Standorten ohne Belastung mit Fußkrankheiten einen mittleren Ertrag, bei Krankheitsdruck ist sie ertraglich den übrigen Sorten überlegen

2) vicin- und convicinarm, 3) tanninarm

6) Beschreibung Brennflecken bei Herz Freya aus eigenen Daten

**Zeichenerklärung für die Sortenbeschreibung**

+++	sehr gut, TKG sehr hoch, sehr früh, sehr lang
++	gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, lang bis sehr lang
+	gut, hoch, früh, lang
(+)	mittel bis gut, mittel bis hoch, mittel bis früh, mittel bis lang
0	mittel
(-)	mittel bis schlecht, mittel bis gering, mittel bis spät, mittel bis kurz
-	schlecht, gering, spät, kurz
--	schlecht bis sehr schlecht, gering bis sehr gering, spät bis sehr spät, kurz bis sehr kurz
---	sehr schlecht, sehr gering, sehr spät, sehr kurz