

Herbizide zur Spätbehandlung im Getreidebau 2025

Präparat Wirkstoffe	Aufwand- menge je ha	Kosten €/ha ¹⁾	Anwendung in:		Indikation und Anwendungshinweise
			Kultur	BBCH- Stadium	
Spätbehandlung gegen Acker-Kratzdistel					
Ariane C Fluroxypyr + Florasulam + Clopyralid	1,5 l	53	WW,WG,WR,WT,DI	13 - 39	Gegen Acker-Kratzdistel und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter . Nebenwirkung gegen Ackerwinde und Durchwuchskartoffeln. Wüchsige Witterung unterstützt die Wirkung.
Dirigent SX Metsulfuron + Tribenuron	35 g	23	WW,WG,WR,WT	30 - 37	Gegen Acker-Kratzdistel .
Pointer Plus Florasulam + Metsulfuron + Tribenuron	50 g	33	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	12 - 39	Gegen Acker-Kratzdistel und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter . Ampfer wird miterfasst. Wüchsiges Wetter vorteilhaft.
Pointer SX, ...u.a. Tribenuron	37,5 g	20	WW,WG,WR,WT	30 - 37	Gegen Acker-Kratzdistel . Ampfer wird miterfasst. Wüchsiges Wetter und Tankmischung mit MCPA vorteilhaft.
U 46 M-Fluid, ...u.a. MCPA	1,4 l	23	WW,WG,WR,WT,WDU,DI SW,SG,SH,SR,SDU	13 - 39	Gegen Acker-Kratzdistel und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter .. Behandlung ab 10-15 cm Höhe.
Spätbehandlung gegen Acker-Kratzdistel und Acker-Winde					
(Biathlon 4D) + Dash Tritosulfuron + Florasulam	70 g + 1,0 l	37	WW,WG,WR,WT,WDU,WH,DI SW,SG,SR,ST,SDU,SH	13 - 39	Gegen zweikeimblättrige Unkräuter , einschließlich Acker-Winde und Acker-Kratzdistel . Wirkungsgeschwindigkeit abhängig von der Witterung. Nebenwirkung gegen Lichtnelke.
U 46 M-Fluid, ...u.a. MCPA	1,4 l	23	WDU,SDU,DI	13 - 39	Gegen Acker-Winde und Acker-Kratzdistel . Behandlung ab 10-15 cm Höhe.
Spätbehandlung gegen Klettenlabkraut					
Tomigan XL, ...u.a. Fluroxypyr + Florasulam	1,5 l	39	WW,WG,WR,WT	30 - 39	Gegen Klettenlabkraut mit rascher, intensiver Wirkung. Mittelreduzierung bei warmer, wüchsiger Witterung möglich. Nebenwirkung gegen Ackerwinde und Ampfer.
Tomigan 200, ...u.a. Fluroxypyr	0,9 l	21	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	30 - 45 30 - 39	
Spätbehandlung gegen Windhalm, Acker-Fuchsschwanz, Flughafer und Weidelgras					
Axial 50 Pinoxaden	0,9 / 1,2 l	48 / 64	WW,WG,WR,WT,WDU,DI SW,SG,SDU	13 - 39	Spätanwendung gegen Windhalm , Flughafer (0,9 l/ha) und Ackerfuchsschwanz (1,2 l/ha) und Weidelgräser (1,2 l).
Stoppelbehandlung gegen mechanisch schwer regulierbare Wurzelunkräuter					
Kyleo Glyphosat + 2,4-D	5,0 l	95	Ackerbaukulturen,Stoppelbe- handlung	-	Stoppelbehandlung gegen schwer bekämpfbare Wurzelunkräuter , vor allem Winden und Schachtelhalm , sowie Quecke . Die Zielpflanzen müssen ausreichende Blattmasse für die Wirkstoffaufnahme entwickelt haben. Bodenbearbeitung nach 10-14 Tagen. Nachbau von Senf/Ölrettich/Phacelia nach 15-30 Tagen. Kein Nachbau von Raps. EINSATZ AUF DAS ABSOLUT NOTWENDIGE MASS BEGRENZEN!
Taifun forte, ...u.a. Glyphosat	3,0 - 5,0 l	28 - 47	Getreidestoppel	-	Stoppelbehandlung gegen schwer bekämpfbare Wurzelunkräuter , insbesondere zur Queckenbehandlung . Einsatz ab 15 cm Wuchshöhe. Bodenbearbeitung erst nach Vergilbung der Zielpflanzen bzw. nach min. 10-14 Tagen Wirkungszeit. Zusatz von Netzmittel kann die Wirkung unterstützen. EINSATZ AUF DAS ABSOLUT NOTWENDIGE MASS BEGRENZEN!
Starane XL Fluroxypyr + Florasulam	1,8 l	38	Getreidestoppel	-	Stoppelbehandlung gegen Zaunwinde . Winden müssen ausreichende Blattmasse für die Wirkstoffaufnahme besitzen.

(...) = Zulassung abgelaufen, Ablauffrist bis 07.11.2025!

WW = Winterweizen, WG = Wintergerste, WR = Winterroggen, WT = Wintertriticale, WH = Winterhafer,
WDU = Winterdumrum bzw. Winterhartweizen, DI = Dinkel,
SW = Sommerweizen, SG = Sommergerste, SR = Sommerroggen, ST = Sommertriticale,
SH = Sommerhafer, SDU = Sommerdumrum bzw. Sommerhartweizen

BBCH-Stadium:

30 = Beginn Schossen

37 = Erscheinen des Fahnenblatts

39 = Ligula (Blatthäutchen)-Stadium; Fahnenblatt vollentwickelt

45 = Blattscheide des Fahnenblattes geschwollen

1) Preise nach aktueller Handelsliste für Großgebände, ohne Mehrwertsteuer

Beachten Sie die Gebrauchsanleitung der jeweiligen Präparate!



Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

K. Gehring, S. Thyssen

Herbologie © März 2025

Herbizide zur Spätbehandlung im Getreidebau 2025

Präparat Wirkstoffe	Indikation	Maximale Aufwand- menge / ha	Kosten €/ha ¹⁾	Anwendung:		Wirkung auf Unkräuter und Ungräser:												
				in Kultur ²⁾	bis BBCH- Stadium ³⁾	Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Weidelgras	Flughafer	Acker-Kratzdistel	Ampfer	Durchwuchskartoffeln	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Kornblume	Winden-Arten	
Ariane C Florasulam + Fluroxypyr + Clopyralid	Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,5 l	53	WW,WG,WR,WT,DI	39	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Axial 50 Pinoxaden	Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Weidelgras-Arten, Windhalm	0,9 - 1,2 l	48 / 64	WW,WG,WR,WT,WDU,DI SW,SG,SDU	39	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(Biathlon 4D) + Dash Tritosulfuron + Florasulam	Acker-Kratzdistel, Acker-Winde Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	70 g + 1,0 l FHS	37	WW,WG,WR,WT,WDU,WH,DI SW,SG,SR,ST,SDU,SH	39	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dirigent SX Metsulfuron + Tribenuron	Acker-Kratzdistel	35 g	23	WW,WG,WR,WT	37	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pointer Plus Florasulam + Metsulfuron + Tribenuron	Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	50 g	33	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	39	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pointer SX, ...u.a. Tribenuron	Acker-Kratzdistel	37,5 g	20	WW,WG,WR,WT	37	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tomigan XL, ...u.a. Florasulam + Fluroxypyr	Klettenlabkraut	1,5 l	39	WW,WG,WR,WT	39	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tomigan 200, ...u.a. Fluroxypyr	Klettenlabkraut	0,9 l	21	WW,WG,WR,WT SW,SG,SH	45 39	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●
U 46 M-Fluid MCPA	Acker-Kratzdistel, Acker-Winde Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l	23	WW,WG,WR,WT,WDU,DI SW,SG,SR,SH,SDU	39	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	●

Die Einstufung der Herbizide erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Bedingungen und Standardanwendung der Mittel.

(...) = Zulassung abgelaufen, Ablauffrist bis 07.11.2025!

1) Preise nach aktueller Handelsliste für Großgebäude, ohne Mehrwertsteuer

2) WW = Winterweizen, WG = Wintergerste, WR = Winterroggen, WT = Wintertriticale, WH = Winterhafer, WDU = Winterdurum bzw. Winterhartweizen, DI = Dinkel, SW = Sommerweizen, SG = Sommergerste, SR = Sommerroggen, ST = Sommertriticale, SH = Sommerhafer, SDU = Sommerdurum bzw. Sommerhartweizen

3) BBCH-Stadium = Entwicklungsstadium, z.B. 37 = Erscheinen des Fahnenblattes, 39 = Ligula (Blatthütchen)-Stadium, 45 = Blattscheide des Fahnenblattes geschwollen.

Symbolerklärung: ● sehr gute ● gute ● mittlere ○ geringe ○ keine Wirkung



Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft

LfL

Herbologie / © K. Gehring, S.Thyssen
Stand: März 2025