

## Infos zum Rapsbau

## Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Schnecken	Schneckenkorn auf Basis von Fe-III-Phosphat oder Metaldehyd z.B. Axcela, Clartex blau, Ironmax Pro, Metarex INOV MetaPads und Schnecken-Linsen		abhängig vom Präparat	F	abhängig vom Präparat max. 2x	Kontrolle nach der Saat mittels Schneckenfolien oder nassen Jutesäcken. Wird nach einer Nacht bei fünf Kontrollstellen durchschnittlich unter jeder Falle mindestens eine Schnecke gefunden, dann ist eine Behandlung erforderlich. Auf kritischen Flächen ist die Behandlung nach ca. 10 Tagen zu wiederholen. Raps ist bis zum 4-Blatt-Stadium gefährdet. Bei Ausbringung mit Kreiselstreuern Mineraldünger zumischen. Gleiche Korngröße wichtig! Wegen der kleinen Korngröße ist für die Ausbringung von Schnecken-Linsen ein spezieller Granulatstreuer oder ein Zwischenfrucht-Streuer notwendig!
Feldmaus, Erdmaus	Ratron Giftlinsen	09	NW704, NS648 NT659, NT680, NT820-2, NT820-3	F	100 g / Köderste lle max. 2,5 kg/ha	In geeigneten Köderstationen auslegen. Keine breitflächige Ausbringung erlaubt. Nur eine Anwendung pro Kultur und Jahr erlaubt.
		09	NW704, NS648 NT664, NT659, NT802-1, NT803-1, NT820-1, NT820-2, NT820-3	F	5 Körner pro Loch max. 2,0 kg/ha	Bei Bedarf bedecktes Auslegen in die Mäusegänge. Das Mittel ist sehr giftig für Vögel und Wild. Nur eine Anwendung pro Kultur und Jahr erlaubt.

## Infos zum Rapsbau

## Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rapserrfloh	Kaiso Sorbie	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	56	150 g	Um Schäden durch Rapserrfloh (und Kohlflye) gering zu halten, sind Fröhsaaten zu vermeiden. Schadschwelle gegen Käferfraß: Behandlung notwendig sobald mehr als 10 Prozent der Blattfläche an den Keimblättern oder an den ersten Laubblättern abgefressen ist. Häufig reicht für den Keimlingsschutz eine Randbehandlung aus. Schadschwelle gegen Larven: Bekämpfung sinnvoll, wenn bis Anfang Oktober mehr als 50 (schlechter, lückiger Bestand) bis 100 (guter, gleichmäßiger Bestand) Rapserrflöhe in der Gelbschale gefangen werden oder wenn mehr als 5 Larven/Rapsrpflanze vorhanden sind. Amtlichen Warndienst beachten! Karate Zeon, Lamdex Forte und Hunter WG dürfen pro Vegetationsperiode max. 2x eingesetzt werden!
	Karate Zeon	07, 08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	35	75 ml	
	Lamdex Forte, Hunter WG	06, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	35	150 g	

## Infos zum Rapsbau

## Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Rapsstängelrüssler	Kaiso Sorbie	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	56	150 g max. 1x	<p>Gelbschalenkontrolle ab 5°C Bodentemperatur! Schadschwelle: 10 bis 15 Käfer in 3 Tagen je Gelbschale. Bei anhaltendem Zuflug die Behandlung frühestens nach 14 Tagen wiederholen. Lamdex Forte und Karate Zeon haben in Mischung mit Azol-Fungiziden (ausgenommen Proline) ebenfalls eine B2-Bieneneinstufung. Karate Zeon darf pro Vegetationsperiode max. 2x eingesetzt werden! In dieser Anwendung ist Trebon 30 EC max. 2x zugelassen.</p> <p>Hinweis: Bei allen aufgeführten Präparaten ist die Wirkung gegen pyrethroidresistente Rapsglanzkäfer unsicher. Jedoch ist zum Zeitpunkt der Stängelschädlingsbekämpfung häufig schon ein Großteil der Rapsglanzkäferpopulation im Schlag vorhanden. Deshalb auf Hinweise des amtlichen Pflanzenschutzdienstes achten, ob für die Saison 2022 weitere neue Insektizide zur Verfügung stehen, die neben Stängelrüsslern auch Rapsglanzkäfer sicher erfassen.</p>
	Karate Zeon	07, 08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	35	75 ml max. 2x	
	Lamdex Forte, Hunter WG	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	56	150 g max. 2x	
	Trebon 30 EC	05, 07 08, 09	NB6621 NW -(-/-10)m NW701, NT101	F	200 ml max. 2x	

## Infos zum Rapsbau

## Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Kohlschotenrüssler	Lamdex Forte, Hunter WG	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	56	150 g max. 2x	Schadschwelle bei Kohlschotenrüssler: 1 Käfer/Pflanze. Karate Zeon, Mavrik und Lamdex Forte haben in Mischung mit Azol-Fungiziden (ausgenommen Proline) ebenfalls eine B2-Bieneneinstufung. Mavrik darf pro Vegetationsperiode max. 1x eingesetzt werden. Karate Zeon darf in der Vegetationsperiode max. 2x eingesetzt werden. In dieser Anwendung ist Trebon 30 EC max. 2x zugelassen. In vielen Regionen Bayerns besteht beim Rapsglanzkäfer Resistenz gegen Pyrethroide. Deshalb wird der Einsatz dieser Insektizide nicht empfohlen, wenn gleichzeitig Rapsglanzkäfer im Bestand vorhanden sind. Amtlichen Warndienst zur Insektizidstrategie im Jahr 2022 beachten!
	Kaiso Sorbie	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	56	150 g max. 1x	
	Karate Zeon	07, 08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	35	75 ml max. 2x	
	Mavrik Vita, Evure	09	NB6623, NN410 NW 15(10/5/5)m NT101	56	200 ml max. 1x	
	Trebon 30 EC	05, 07 08, 09	NB6621 NW -(-/-10)m NW701, NT101	F	200 ml max. 2x	
Rapsglanzkäfer	Avaunt	07, 08 09	NB6611 NW 5(*/*/*)m NT101	F	170 ml max. 1x	Schadschwelle Rapsglanzkäfer: In Winterraps bei mehr als 10 Käfern, in Sommerraps bei mehr als 1-3 Käfern je Pflanze am Feldrand. Bei geöffneter Blüte schädigt der Käfer in der Regel nicht mehr. Mospilan SG und Avant sind in der Summe aller Anwendungen max. 1x zugelassen. Amtlichen Warndienst zur Insektizidstrategie im Jahr 2022 beachten!
	Mospilan SG	07, 09	NB6612 NW 5(*/*/*)m NT102, NN410 VV553	F	200 g max. 1x	

## Infos zum Rapsbau

## Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Kohlschotenmücke	Kaiso Sorbie	07, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	56	150 g max. 1x	Schadschwelle: Ab Blühbeginn bei durchschnittlich 1 Mücke/Pflanze und Tag. Lamdex Forte, Hunter WG, Mavrik und Karate Zeon haben in Mischung mit Azol-Fungiziden (ausgenommen Proline) eine B2-Bieneneinstufung. Karate Zeon, Hunter WG und Lamdex Forte dürfen pro Vegetationsperiode max. 2x eingesetzt werden. Die anderen aufgeführten Insektizide dürfen in dieser Anwendung max. 1x eingesetzt werden!
	Karate Zeon	07, 08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	35	75 ml max. 2x	
	Mavrik Vita, Evure	09	NB6623, NN410 NW 15(10/5/5)m NT101	56	200 ml max. 1x	
	Lamdex Forte, Hunter WG	06, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	35	150 g max. 2x	
Beißende Insekten	Karate Zeon	07, 08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	35	75 ml max. 2x	Mavrik Vita, Lamdex Forte und Karate Zeon haben in Mischung mit Azol-Fungiziden ebenfalls eine B2-Bieneneinstufung (ausgenommen in Mischung mit Proline)! In dieser Anwendung ist Karate Zeon, Lamdex Forte und Hunter WG max. 2x zugelassen. Mavrik Vita darf pro Vegetationsperiode max. 1x und Lamdex Forte, Hunter WG sowie Sumicidin Alpha EC max. 2x eingesetzt werden. Mavrik Vita ist nicht zur Bekämpfung von Stängelschädlingen zugelassen!
	Mavrik Vita, Evure	09	NB6623, NN410 NW 15(10/5/5)m NT101	56	200 ml max. 1x	
	Lamdex Forte, Hunter WG	06, 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	35	150 g max. 2x	
	Sumicidin Alpha EC	02, 05 07, 08 09	NB6621, NN400 NW -(20/10/5)m NW706, NT103	56	250 ml max. 2x	

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!