

Zugelassene Herbizide in Erdbeeren (Stand Januar 2025)

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit	Anwendungsbestimmungen/Auflagen	Bienenschutz	Zulassung bis
Beloukha (Pelargonsäure) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Abtötung von Ausläufern	16 l/ha	bis 14 Tage vor der Ernte und nach der Ernte max. 2 Anw. pro Jahr im Abstand von 14 Tagen	F	NT 101 NW 468 NW 642-1 SE110, SS110-1, SS2101	B 4	15.12.25
Betasana SC Betosip SC (Phenmedipham) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	6 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 1 Anw. pro Jahr (Splitting der Aufwandmenge in bis zu 3 Teilgaben möglich, Abstand der Behandlungen zwischen 5-7 Tagen)	F	NW 468 NW 604 NW 607(75%:20m, 90%:10m)	B 4	15.02.26
		2 x 3 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 2 Anw. pro Jahr		NW 468 NW 604 NW 607(50%:20m, 75%:10m, 90%:5m)		
	3 x 2 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 3 Anw. pro Jahr	NW 468 NW 604 NW 607(50%:15m, 75%:10m, 90%:5m)				
	6 l/ha	im Ertragsjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr (Splitting der Aufwandmenge in bis zu 3 Teilgaben möglich, Abstand der Behandlungen zwischen 5-7 Tagen)	NW 468 NW 604 NW 607(75%:20m, 90%:10m)				
einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	2 x 3 l/ha	im Ertragsjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 2 Anw. pro Jahr	NW 468 NW 604 NW 607(50%:20m, 75%:10m, 90%:5m)				
3 x 2 l/ha	im Ertragsjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 3 Anw. pro Jahr	NW 468 NW 604 NW 607(50%:15m, 75%:10m, 90%:5m)					
BAKATA (Flufenacet) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einjähriges Rispengras	0,3 l/ha	nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642 NW 705	B 4	15.06.26
	einjähriges Rispengras	0,3 l/ha	vor der Blüte nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642 NW 705		

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Cadou SC (Flufenacet) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjähriges Rispengras	0,3 l/ha	nach dem Pflanzen nicht im Ertragsjahr max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642 NW 705	B 4	15.06.26
	einjähriges Rispengras	0,3 l/ha	vor der Blüte nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642 NW 705		
Colzamid (Napropamid)	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter	2,5 l/ha	Ertragsanlagen, vor der Blüte oder nach der Ernte vor dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 470 NW609-2: 5m SF275-7BE SS110-1, SS2101 WP734	B 4	31.03.28
	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter	2,5 l/ha	im Pflanzjahr, nach dem Pflanzen vor der Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 470 NW609-2: 5m SF275-7BE SS110-1, SS2101 WP734		
Finalsan (Pelargonsäure) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	zweikeimblättrige Unkräuter, einkeimblättrige Unkräuter)	62,5 l/ha	vor dem Reihenschluss max. 6 Anw.pro Kultur und Jahr, zeitlicher Abstand der Behandlungen mind. 3 Tage	F	NW 468 NW 642-1 SE110 spritzen ist nur über Einzelpflanzenbehandlung mit optischer Unkrauterkenntung mit dem speziellen Gerät (Kilter AX-1) genehmigt.	B 4	15.12.25
Flexidor (Isoxaben) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter ausgenommen zur Pflanzguterzeugung	0,4 l/ha	nach der Ernte vor dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609: 5m, NW 706, SS110-1, SS2101 VV 600	B 4	31.12.27
	Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter ausgenommen zur Pflanzguterzeugung	0,4 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen vor dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609: 5m, NW 706, SS110-1, SS2101 VV 600		
	Gem. Kreuzkraut Gem. Hirtentäschel Acker-Senf Vogel-Sternmiere ausgenommen zur Pflanzguterzeugung	0,4 l/ha	bei Vegetationsbeginn vor dem Auflaufen der Unkräuter nicht im Pflanzjahr max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609-1: 5m, NW 706 SS110-1, SS2101		
	Gem. Kreuzkraut Gem. Hirtentäschel Acker-Senf Vogel-Sternmiere	0,2 l/ha	bei Vegetationsbeginn vor dem Auflaufen der Unkräuter nicht im Pflanzjahr in dieser Anw. max. 1, pro Jahr, max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609-1: 5m, NW 706 SS110-1, SS2101		
			max. Mittelaufwand pro Kultur pro Jahr 0,4 l/ha				

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Flexidor (Isoxaben) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Gem. Kreuzkraut Gem. Hirtentäschel Acker-Senf Vogel-Sternmiere	0,2 l/ha	nach der Ernte vor dem Auflaufen der Unkräuter in dieser Anw. max. 1, pro Jahr, max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609-1: 5m, NW 706 SS110-1, SS2101	B 4	31.12.27
	Gem. Kreuzkraut Gem. Hirtentäschel Acker-Senf Vogel-Sternmiere	0,2 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen bis Schieben des ersten Laubblattes vor dem Auflaufen der Unkräuter in dieser Anw. max. 1, pro Jahr, max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr max. Mittelaufwand pro Kultur pro Jahr 0,4 l/ha	F	NG 403, NT 102, NW 468, NW 609-1: 5m, NW 706		
Focus Ultra (Cycloxydim) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einj.einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. einjähriges Rispengras)	2,5 l/ha	nach dem Auflaufen der Unkräuter bis Blütenboden Erdbeere deutlich aufgewölbt max. 1 Anw.pro Kultur und Jahr	14 Tage	NT 101, NW 468 NW 642-1 SE110, SS110-1, SS2101, SS610	B 4	31.12.25
	Gemeine Quecke	5 l/ha	nach dem Auflaufen der Unkräuter bei Unkrauthöhe bis 25 cm bis Blütenboden Erdbeere deutlich aufgewölbt max. 1 Anw.pro Kultur und Jahr Erdbeere deutlich aufgewölbt max. 1 Anw.pro Kultur und Jahr	14 Tage	NT 102, NW 468 NW 642-1 SE110, SS110-1, SS2101, SS610		
Fusilade MAX, TRIVKO (Fluazifop-P)	einj.einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. einjähriges Rispengras)	1 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	42 Tage F	NT 101, NW 470 NW 642-1	B 4	31.05.27
Goltix Gold (Metamitron) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjährige Risppe einj. zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Klettenlab- kraut u. Knöterich- Arten)	2 l/ha	nach der Ernte Spätsommer bis Herbst max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468, NG 402 NW 642	B 4	31.08.26
Kerb Flo, GROOVE (Propyzamid)	Vogel-Sternmiere einjährige einkeimblättrige Unkräuter	1,25 l/ha	Winter (in der Vegetations- ruhe) max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468, NW 642 WP 775	B 4	31.01.26
Lontrel 720 SG (Clopyralid)	Acker-Kratzdistel Kamille-Arten Acker-Hundskamille	167 g/ha	Frühjahr vor der Blüte max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 101 NW 468 NW 642-1	B 4	31.12.25
	Acker-Kratzdistel Kamille-Arten Acker-Hundskamille	167 g/ha	Sommer nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 316 (keine Anwendung nach dem 15. September) NT 101, NW 468 NW 642-1		

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Naprop 450 (Napropamid) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Acker-Fuchsschwanz einjähriges Rispengras einj. zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Klettenlab- kraut)	2,5 l/ha	im Ertragsjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 470, NW609-2 SF275-42BE	B 4	31.12.27
	Acker-Fuchsschwanz einjähriges Rispengras einj. zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Klettenlab- kraut)	2,5 l/ha	nicht im Ertragsjahr nach dem Pflanzen	F	NW 470, NW609-2 SF275-42BE		
Vivendi 100 (Clopyralid)	Acker-Kratzdistel Kamille-Arten Acker-Hundskamille	1,2 l/ha	Frühjahr vor der Blüte max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 101 NW 468 NW 642-1	B 4	31.12.25
	Acker-Kratzdistel Kamille-Arten Acker-Hundskamille	1,2 l/ha	Sommer nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 316 (keine Anwendung nach dem 15. September) NT 101, NW 468 NW 642-1		
Quickdown + Toil (Pyraflufen + Rapsöl- Methylester) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Abtötung von Ausläufern	0,8 l/ha + 2,0 l/ha	nach der Ernte max. 2 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642-1 SE110, SS110-1, SS2101	B 4	31.01.26
Sedim 120 (Clethodim)	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	0,8 l/ha	nach dem Pflanzen nach dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Jahr	35 Tage	NT102-1, NW470,NW642-1 SF275-EEBE, SS110-1, SS2101,	B 4	31.08.27
	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	0,8 l/ha	nach der Ernte nach dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Jahr	35 Tage	NT102-1, NW470,NW 642-1, SF275-EEBE, SS110-1, SS2101,		
	Gemeine Quecke	2 l/ha	nach dem Pflanzen nach dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Jahr	35 Tage	NT103-1, NW470,NW 642-1, SF275-EEBE, SS110-1, SS2101,		
	Gemeine Quecke	2 l/ha	nach der Ernte nach dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Jahr	35 Tage	NT103-1, NW470,NW 642-1, SF275-EEBE, SS110-1, SS2101,		
Select 240 EC (Clethodim) (in Mischung mit Radiumix 1 l/ha)	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	0,75 l/ha	Pflanzjahr nach dem Pflanzen max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108, NW 468, NW 642-1, SE110, SF275-01, SS110-1, SS2101, SS610	B 4	31.08.27
	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	0,75 l/ha	im Ertragsjahr nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108, NW 468, NW 642-1, SE110, SF275-01, SS110-1, SS2101, SS610		
	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter in Beständen zur Pflanzguterzeugung	0,75 l/ha	nach Austrieb oder nach dem Pflanzen max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108, NW 468, NW 642-1, SE110, SF275-01, SS110-1, SS2101, SS610		

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Arrodim (Clethodim) (in Mischung mit Arroactive 1 l/ha)	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter in Junganlagen	0,75 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108-1, NW 470 NW 642-1, SE110, SF275-56BE, SS110-1, SS2101	B 4	31.05.27
	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter in Ertragsanlagen	0,75 l/ha	nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108-1, NW 470 NW 642-1, SE110, SF275-56BE, SS110-1, SS2101		
	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter in Beständen zur Pflanzguterzeugung	0,75 l/ha	nach Austrieb oder nach dem Pflanzen max. 1 Anw. pro Jahr	28 Tage	NT 108-1, NW 470 NW 642-1, SE110, SF275-56BE, SS110-1, SS2101		
Spectrum (Dimethenamid-P) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjähriges Rispen- gras, Schadhirsen, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l/ha	im Pflanzjahr nach dem Pflanzen max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NT 101, NW 470 NW 605 (50%: 10m, 75%:5m 90%:5m) NW 606: 20 m SF143 SS110-1, SS120-1 SS2101, SS530, SS610, VA 271	B 4	30.04.25
	einjähriges Rispen- gras, Schadhirsen, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l/ha	im Pflanzjahr vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 101, NW 470 NW 605 (50%: 5m, 75%:5m 90%:*) NW 606: 10 m NW 706 SF143 SS110-1, SS120-1 SS2101, SS530, SS610, VA 271		
	einjähriges Rispen- gras, Schadhirsen, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l/ha	im Ertragsjahr vor der Blüte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 101, NW 470 NW 605 (50%: 5m, 75%:5m 90%:*) NW 606: 10 m NW 706 SF143 SS110-1, SS120-1 SS2101, SS530, SS610, VA 271		
	einjähriges Rispen- gras, Schadhirsen, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	1,4 l/ha	im Ertragsjahr nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 101, NW 470 NW 605 (50%: 10m, 75%:5m 90%:5m) NW 606: 20 m SF143 SS110-1, SS120-1 SS2101, SS530, SS610, VA 271		
Stomp Aqua Stomp Raps (Pendimethalin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Acker-Fuchsschwanz Gemeiner Windhalm einj.zweikeimblättrige Unkräuter ausgenommen: Acker-Hundskamille Kletten-Labkraut Kamille-Arten Gemeines Kreuzkraut	3,5 l/ha	während der Vegetationsruhe Spätherbst bis Winter max. 1 Anw. pro Jahr auf unkrautfreien Boden	F	NT 112, NT 145, NT 146, NT 170, NW 468, NW 605-1: (90 % 5m) SE110 SS110-1,SS2101, SS610	B 4	30.06.25

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit	Anwendungsbestimmungen/Auflagen	Bienenschutz	Zulassung bis
Target SC (Metamitron) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter einjährige einkeimblättrige Unkräuter Jungpflanzenanzucht	0,5 l/ha	nach dem Pflanzen max. 3 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NW 470 NW 642-1 SB1904 SS110-1, SS 120-1, SS2101	B 4	31.08.26
Venzar 500SC (Lenacil) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (nicht im Ertrag stehende Anlagen)	0,5 l/ha	im Pflanzjahr und nach dem Pflanzen von Auflaufen bis 3.Laubblatt entfaltet max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 360, NW 468, NW 605-1 (50%: 5m, 75%:5m, 90%:*), NW 606: 5m, NW 706,NW 800, SS110-1, SS2101, SS 610 SF275-14BE	B 4	15.08.26
	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter in Ertragsanlagen	0,5 l/ha	nach der Ernte und zum Abschluss des vegetativen Wachstums im Sommer, von Auflaufen bis 3.Laubblatt entfaltet max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 360, NW 468, NW 605-1 (50%: 5m, 75%:5m, 90%:*), NW 606: 5m, NW 706,NW 800, SS110-1, SS2101, SS 610 SF275-14BE		
	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Vermehrungsgut	0,5 l/ha	nach dem Pflanzen von Auflaufen bis 3.Laubblatt entfaltet max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NG 360, NW 468, NW 605-1 (50%: 5m, 75%:5m, 90%:*), NW 606: 5m, NW 706,NW 800, SS110-1, SS2101, SS 610 SF275-14BE		
Zetrola, AGIL-S (Propaquizafop) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einjährige einkeimblättrige Unkräuter ausgenommen: einj. Rispengras Gemeine Quecke	0,75 l/ha	nach der Ernte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	35 Tage	NW 468 NW 642-1 SE110, SS110, SS2101 WP 733	B 4	30.11.27
	Gemeine Quecke	1,5 l/ha	nach dem Austrieb April bis August bei 15-20 cm Unkrauthöhe max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	35 Tage	NW 468 NW 642-1 SE110, SF275-28BE SS110, SS2101		
PROPAK (Propaquizafop)	einjährige einkeimblättrige Unkräuter ausgenommen: einj. Rispengras	0,7 l/ha	nach der Ernte nach dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NW 470, NW 642-1 SE110 SF275-28BE SS110-1, SS2101 WP 733	B 4	30.11.27
	Gemeine Quecke	1,5 l/ha	nach der Ernte nach dem Auflaufen der Unkräuter bei 15-20 cm Unkrauthöhe max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NW 470, NW 609-1 SE110 SF275-28BE SS110-1, SS2101 WP 733		
	Gemeine Quecke	0,6 l/ha	nach der Ernte nach dem Auflaufen der Unkräuter bei 15-20 cm Unkrauthöhe max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr im Abstand von 12 Tagen	F	NW 470, NW 642-1 SE110 SF275-28BE SS110-1, SS2101 WP 733		

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
READY (Propaquizafop)	einjährige einkeim- blättrige Unkräuter ausgenommen: einj. Rispengras	0,75 l/ha	nach der Ernte nach dem Auflaufen der Unkräuter max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	35 Tage	NW 470, NW 642-1 SE110 SF275-21BE SS110-1, SS2101 WP 733 WW742	B 4	30.11.27
KALAMOS (Propaquizafop)	Schadhirsen, Flug-Hafer, Deutsches Weidelgras	0,6 l/ha	nach der Ernte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NW 470, NW 642-1 SE110 SF275-35BE SS110-1, SS2101 WP 733	B 4	30.11.27
	Ausfallgetreide, Gemeiner Windhalm	0,7 l/ha	nach der Ernte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NW 470, NW 642-1 SE110 SF275-35BE SS110-1, SS2101 WP 733		
	Gemeine Quecke	1,5 l/ha	nach der Ernte bei 15-20 cm Unkrauthöhe max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NW 470, NW 642-1 SE110 SF275-35BE SS110-1, SS2101 WP 733		
	Gemeine Quecke	0,6 l/ha	nach der Ernte bei 15-20 cm Unkrauthöhe max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr im Abstand von 12 Tagen	F	NW 470, NW 642-1 SE110 SF275-35BE SS110-1, SS2101 WP 733		

**Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; die jeweiligen Anwendungsbestimmungen sind zu beachten.
Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter
Präparate oder Verfahren ergeben könnte, wird nicht übernommen.**