

### Zugelassene Herbizide in Himbeeren/Brombeeren (Stand März 2025)

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit	Anwendungsbestimmungen/Auflagen	Bienenschutz	Zulassung bis
Beloukha (Pelargonsäure) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einj. einkeimblättrige Unkräuter einj. zweikeimblättrige Unkräuter	16 l/ha	während der Vegetationsperiode max. 2 Anw.pro Kultur und Jahr	F	NW 468 NW 642-1 SE110 SS110-1 SS2101	B 4	15.12.25
	Abtöten von Ruten	16 l/ha	während der Vegetationsperiode max. 2 Anw.pro Kultur und Jahr	F	NW 468 NW 642-1 SE110 SS110-1 SS2101		
Colzamid (Napropamid)	einjährige einkeimblättrige Unkräuter einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	2,5 l/ha	vor Vegetationsbeginn, Reihenbehandlung max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 470 NW609-2: 5m SF275-42 OS SS110-1, SS2101 WP734	B 4	31.03.28
Flexidor (Isoxaben) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	0,5 l/ha	ab Pflanzjahr bis Blühbeginn auf unkrautfreien Boden max. 1 Anw. pro Jahr	F	NG 403, NW 468 NT 102, NW 605 (50% : 5m, 75% *, 90% *) NW 606: 5m NW 706 SS110-1, SS2101	B 4	31.12.27
Fusilade MAX (Fluazifop-P) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einjährige einkeimblättrige Unkräuter ausgenommen: einjähriges Rispengras	1 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NT 101, NW 470, NW 642-1	B 4	31.05.27
	Gemeine Quecke	2 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F	NT 103, NW 470, NW 642-1		
Kerb Flo, GROOVE (Propyzamid) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	einkeimblättrige Unkräuter Vogel-Sternmiere	3,75 l/ha	Winter (in der Vegetationsruhe) max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NT 102 NW 642	B 4	31.01.26
Naprop 450 (Napropamid) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Acker-Fuchsschwanz einjähriges Rispengras einj. zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Klettenlabkraut )	2,5 l/ha	Ertrags- und Junganlagen Frühjahr vor dem Austrieb, bei Vegetationsbeginn max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 470, NW609-2 SF275-42OS	B 4	31.12.27

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Phantom (Fluazifop-P)	einjährige einkeimblättrige Unkräuter ausgenommen: einjähriges Rispen- gras	1 l/ha	nach dem Auflaufen der Unkräuter vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	45 Tage	NG720, NT101, NW470, NW 642-1 SE110 SF275-EEOS SS110-1 SS2101, SS610	B 4	31.05.27
Quickdown + Toil (Pyraflufen + Rapsöl- Methylester) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Abtötung von Ruten (Himbeeren Brombeeren)	0,8 l/ha + 2,0 l/ha	bis 15 cm Trieblänge max. 2 Anw. pro Jahr	F	NW 468 NW 642-1 SE110 SS110-1 SS2101	B 4	31.01.26
Select 240 EC (Clethodim) (in Mischung mit Radiamix 1 l/ha) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	einjähriges Rispengras	0,75 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NT 108, NW 468, NW 642-1	B 4	31.08.27
Spectrum (Dimethenamid-P) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einj.Rispengras, Schadhirsen Franzosenkraut-Arten Amarant-Arten Kamille-Arten Kleine Brennnessel Gem. Kreuzkraut	1,4 l/ha	bis erste Einzel- blüten sichtbar (geschlossen) Himbeere/Brombeere max. 1 Anw. pro Jahr ab 1.Standjahr nicht im Pflanzjahr	F	NW 470, NW 642 SF143, SF 275-EEOS SF 276-7OS SS110-1, SS120-1 SS122, SS2101, SS522, SS530, SS 610, ST 1122, VA271	B 4	30.04.25
Stomp Aqua Stomp Raps (Pendimethalin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	einj.zweikeim- blättrige Unkräuter ausgenommen: Acker-Hundskamille Kletten-Labkraut Kamille-Arten Gemeines Kreuzkraut Franzosenkraut-Arten	3l/ha	bis erste Einzel- blüten sichtbar (geschlossen) Himbeere/Brombeere max. 1 Anw.pro Jahr ab 1.Standjahr nicht im Pflanzjahr	F	NT 145, NT 146, NT 170, NW 468 NW 705 NW 641 (nur mit Verwendung eines Spritzschirmes) NW 642-1 SE 110 SS110-1 SS2101. SS610	B 4	30.06.25
TRIVKO (Fluazifop-P) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	einjährige einkeimblättrige Unkräuter ausgenommen: einjähriges Rispen- gras  Gemeine Quecke	1 l/ha  2 l/ha	vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr  vor der Blüte oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	F  F	NT 101, NW 470, NW 642-1  NT 103, NW 470, NW 642-1	B 4	31.05.27

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsbereich	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Vorox F (Flumioxazin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	einj. einkeimblättrige Unkräuter einj. zweikeimblättrige Unkräuter	600 g/ha	ab Pflanzjahr vor der Blüte oder nach der Ernte Reihenbehandlung mit Abschirmung vor der Blüte max. 1 Anw. pro Jahr, nach der Ernte max. 1 Anw.pro Jahr pro Kultur und Jahr max. 2 Anw.	F	NW 470 NW 706 NW 642-1 SS110-1 SS120-1 SS2101	B 4	30.06.25

Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; die jeweiligen Anwendungsbestimmungen sind zu beachten.  
Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für die Richtigkeit und  
Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter  
Präparate oder Verfahren ergeben könnte, wird nicht übernommen.