

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bekämpfungszeitraum Ende der Bestockung bis Spitzen des Fahnenblattes nach der Hauptinfektionsperiode. Infektionsgefahr bei längeren feuchtkühlen Witterungsperioden. Warndiensthinweise beachten. Ausbringung in Kombination mit Wachstumsreglern ist möglich. Die aufgeführten Präparate wirken zugleich gegen zahlreiche Blattkrankheitserreger.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Aviator Xpro	W	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Fandango	W,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 08,	NW 5(5/*/*)m NW701	F	1,25 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Flexity	W,G,R,T	07		F	0,5 l	
	Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W,G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW -(10/5/*)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Proline, Curbatur	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Tokyo	WW,SW, DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Unix	W,G,R,T	09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	1,0 kg	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU,G,R, WT	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Unix Top = Unix + Plexeo	W,G,R,T	05, 07, 08	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Verben	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Im Frühjahr zu Epidemiebeginn bis spätestens zur Getreideblüte.
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Aviator Xpro	W,G,R,T	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l G: 1,0 l	
	Fandango	W,G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
Flexity	W,G,R,T	07		F	0,5 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	Kantik mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023!
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Jordi	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	(Kantik)	W,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(-/15/15)m NW706, NW712 VV214	F	2,0 l	
	Kayak	G		NW 10(5/5/*)m NW706	49	1,5 l	Reine Schwefel-Präparate. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide. Reines Schwefel-Präparat. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide.
	Kumulus WG, Netzschwefel Stulln, Thiovit Jet	W,G,R			35	6 kg	
	Microthiol WG	W,G,R,T,H			35	7,5 kg	
	Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Property 180 SC	WW,G	08, 09		F	0,5 l	
Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Protektor Pro = Property 180 SC + Patel 300 EC	WW	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,5 + 0,5 l	Reines Schwefel-Präparat in einer SC-Formulierung. Wirkung gegen Echten Mehltau. Keine oder nur sehr begrenzte Wirkung gegen weitere Schadpilze im Getreide.
	Revystar	W,G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	W,G,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	W,G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
			DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Skyway Xpro	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
			G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	
	Talius	W,G,R,T	05, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,25 l	
	Thiopron	W,G,R,T	07		F	7,5 l	
Tokyo	WW,SW, DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich)
	Traciafin	WW,SW, DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,T	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU, WT	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Vegas Plus	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW 20(15/10/10)m VA271	F	0,8 l	
	Verben	W,G,WT	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Abran	WW,SW,DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bei warmer Witterung schnelle Vermehrung möglich, daher in der Ährenphase auf langanhaltenden Fungizidschutz achten. Ampera mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023!
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Alonty	W,G,R,T	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	W,G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar Gold	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	(Ampera)	W,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	W,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G,H	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	W,WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU,WR,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Aviator Xpro	W,G,R,T	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l G: 1,0 l	
	Azbany, Azoxystar SC	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	W,R,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W,G,R	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Comet	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Domark 10 EC	W			F	1,25 l	
	Elatus Era	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42 G: F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W,G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42 G: F	1,0 + 0,33 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Elatus Plus	W,G,R,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Fandango	W,G,R,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Fezan	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Folicur	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l W: 1,0 l	
	Greteg	W,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Hint	WW,SW, DU,G,R,T, H	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	R	05, 07, 08, 09	NW -(10/5/*)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	(Kantik)	W,R	05, 07, 08, 09	NW -(-/15/15)m NW706, NW712 VV214	F	2,0 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).
Orius	W,G,R,T	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l W: 1,25 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,R	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	W,G,R,T	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Priaxor	W,G,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	W,G,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
Revystar + Flexity	W,G,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
		R,T	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	W,G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
		R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
	Siltra Xpro	W,G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,R,T,H	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sinstar	WW,SW,G	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	W,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	
	Tebucur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Torero	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Traciafin	WW,SW,DU,WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
		G,H	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	W,R	05,07,09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l R: 1,5 l	
	Unix Top = Unix + Plexeo	W,G,R	05, 07, 08	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Abran	WW,SW, DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Bei feuchtkühler Witterung und anfälliger Sorte schnelle Vermehrung möglich, daher bei Befallsbeginn sofort handeln.
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Alonty	W,T	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar Gold	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Aviator Xpro	W	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Balaya	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarket. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Chamane	W	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Domark 10 EC	W			F	1,25 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Greteg	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Priaxor	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Protektor Pro = Property 180 SC + Patel 300 EC	WW	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,5 + 0,5 l	
	Revystar	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	W,DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sinstar	W	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Tebucur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Tokyo	WW,SW, DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
					G	07, 09	
	Torero	W	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Traciafin	WW,SW, DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
					G	07, 09	
	Univoq	W,T	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Unix Top = Unix + Plexeo	W	05, 07, 08	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vastimo	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
Verben	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>)	Abran	WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Längere Nässeperioden fördern die Krankheitsausbreitung. Fungizideinsatz ab BBCH 31 je nach Temperatur 7 - 14 Tage nach Infektionsbeginn. Ampera mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023!
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Alonty	G,R	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	G,R	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	(Ampera)	R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	WR	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WR,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>)	Aviator Xpro	G,R	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l G: 1,0 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarket. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Azbany, Azoxystar SC	G,R,T	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	G,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	G,R	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Comet	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Elatus Era	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G,R	05, 07,	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	G,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Folicur	G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Hint	G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>)	Input Triple	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(10/5/*)m NW706,NW800	F	1,25 l	Mirage 45 EC mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023!
	Jordi	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	(Mirage 45 EC)	R	09	NW 10(5/5/*)m NW705	F	1,2 l	
	Orius	G,R	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte	G,R,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Pioli	G,R	07, 08, 09		F	2,0 l	
Priaxor	G,R	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>)	Proline, Curbatur	R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Pronto Plus	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revystar	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
		R	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
		R	05, 07 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		R	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sinstar	G	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>)	Skyway Xpro	R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Tokyo	R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Torero	G,R,T	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Traciafin	WR,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Univoq	R	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	1,5 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	G	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Unix Top = Unix + Plexeo	G	05, 07, 08	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vastimo	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben	G,WR	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Abran	G	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Zu Beginn der Befallsausbreitung bis Ende des Ährenschiebens. Ausbreitung durch feuchtwarme Witterung begünstigt.
	Alonty	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Aurelia	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Aviator Xpro	G	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,0 l	
	Azbany, Azoxystar SC	G	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	G	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	G	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	
	Comet	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	G	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,25 l	
	Folicur	G	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Hint	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G	05, 07, 08, 09	NW -(10/5/*)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Kayak	G		NW 10(5/5/*)m NW706	49	1,5 l	
	Orius	G	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Pioli	G,R	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Priaxor	G	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Protektor Pro = Property 180 SC + Patel 300 EC	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,5 + 0,5 l	
	Revystar + Flexity	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Sinstar	G	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Tokyo	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Torero	G	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Traciafin	G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	G	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Unix Top = Unix + Plexeo	G	05, 07, 08	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vastimo	G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben	G		NW 5(*/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Abran	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Die Ausbreitung wird begünstigt durch warme, wechselfeuchte Witterungsabschnitte mit hoher Luftfeuchte. Besonders hohe Gefährdung bei Weizenvorfrucht mit Minimalbodenbestellung und anfälligen Sorten.
	Ascra Xpro	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Aviator Xpro	W	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Fandango	W	05, 07, 08,	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Hint	WW,SW, DU	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W	05, 07, 08, 09	NW -(10/5/*)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Priaxor	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
		DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Tokyo	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Traciafin	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	35	0,8 l	
	Univoq	W	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
Vastimo	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Abran	WW,SW,DU,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Feuchtwarme Witterung begünstigt Infektionen durch <i>Septoria nodorum</i> , feuchtkühle die durch <i>Septoria tritici</i> . Folpan 500 SC ist ein reines Kontaktfungizid und hat nur eine vorbeugende Wirkung. Systemische Fungizide besitzen auch eine heilende Wirkung, d.h. sie erfassen auch noch wenige Tage alte <i>Septoria</i> -Infektionen. Azbany, Azoxystar SC, Azoxystar SC, Chamane und Sinstar sind in Weizen nur gegen <i>Septoria nodorum</i> zugelassen. Strobilurin-Solo-Präparate wie Azbany, Azoxystar SC, Azoxystar SC, Chamane, Comet, Sinstar oder Torero besitzen aufgrund weitverbreiteter Resistenz keine ausreichende Wirkung gegen <i>Septoria tritici</i> .
	Alonty	W,T	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	
	Ambarac	W,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Amistar Gold	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Aurelia	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW,DU,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Aviator Xpro	W,T	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Azbany, Azoxystar SC	W	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Balaya	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena EC	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Chamane	W	09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Elatus Era	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Era Folpan	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,75 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Folpan 500 SC	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	42	1,5 l	
	Greteg	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	0,5 l	
	Hint	WW,SW, DU,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(10/5/*)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	(Kantik)	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NW712 VV214	F	2,0 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	(Mirage 45 EC)	W	09	NW 10(5/5/*)m NW705	F	1,2 l	Mirage 45 EC mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023! Pioli wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen. Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Orius	T	07, 08	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
		T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU,WT	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,65 l	
	Pioli	W,T	07, 08, 09		F	2,0 l	
	Priaxor	W,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
		T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	
	Prosaro, Sympara	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Protektor Pro = Property 180 SC + Patel 300 EC	WW	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m	35	0,5 + 0,5 l	
	Revystar + Flexity	W,T	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
	Revytrex	W	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
			05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,125 l	
	Revytrex + Comet	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
			05, 07 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,1 + 0,35 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
			DI,T	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Sinstar	W	09	NW 10(5/5/*)m	35	1,0 l	
	Skyway Xpro	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l	
	Tokyo	WW,SW, DU,R,T	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35	0,8 l	
	Torero	W	09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
Traciafin	WW,SW, DU,WR,T DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Univoq	W,T	05,07,09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l T: 1,5 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).
	Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW,SW,DU	05, 07, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	35	0,5 kg + 0,5 l	
	Unix Top = Unix + Plexeo	W,T	05, 07, 08	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vastimo	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	
	Verben	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Abran	WW,SW, DU	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	Hohe Infektionsgefahr nach Vorfrucht Mais, nicht-wendender Bodenbearbeitung, anfälligen Sorten und warmer Witterung mit einzelnen gewittrigen Niederschlägen Mitte des Ährenschiebens bis Ende der Blüte. Elatus Era, Pioli oder Skyway Xpro sollten zur Resistenzvermeidung in Spritzfolgen nur bei Vorbehandlung ohne Carboxamidpräparate (z.B. Alonty, Elatus Era, Elatus Plus, Pioli, Priaxor, Revytrex, Vastimo, Xpro- Produkte) eingesetzt werden. Ampera mit Aufbrauchfrist bis 30.06.2023!
		G	07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	0,8 l	
	Ambarac	W	02, 05, 07, 08,	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	(Ampera)	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Aurelia	W	07, 09	NW 10(5/5/*)m	F	0,8 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	WW,SW, DU	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Caramba, Plexeo, Remocco 60, Sirena	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m	F	1,5 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42	1,0 + 0,33 l	
	Fandango	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/*)m NW701	F	1,5 l	
	Fezan	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l	
	Folicur	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701, NT101	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Gigant	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m NG342-1	F	1,0 l	
	Hint	WW,SW, DU,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, VA277	42	1,25 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701	F	1,25 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	1,0 l	
	Osiris MP = Caramba + Curbatur	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	1,0 + 0,5 l	
	Patel 300 EC, Pecari 300 EC, Protendo Forte	WW,SW, DU	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m NT850	35	0,65 l	
	Polyversum	W,G			F	0,1 kg	Polyversum ist ein biologisches Pflanzenschutzmittel (<i>Phytium oligandrum</i> M1) zur Stärkung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte. Die Anwendung ist vom Drei-Blatt-Stadium (BBCH 13) bis Mitte der Blüte (BBCH 65) insgesamt 2x (Gerste) oder 3x (Weizen) möglich. Wirkung stark schwankend bzw. wetterabhängig.
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	F	0,8 l	Präparat ist deshalb nur zur Befallsminderung bei schwachem
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,0 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Sirena Pro Pack = Sirena EC + Protendo Forte + VextaSil	WW,SW, DU	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NT850	35	1,0 + 0,5 + 0,2 l	VextaSil ist ein empfohlener Zusatzstoff	
	Siltra Xpro	W,DI,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	F	1,0 l		
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	42	1,2 l		
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,25 l		
	Tebucur 250 EW	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,25 l W: 1,0 l		
	Tokyo	WW,SW, DU	G	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35		0,8 l
				07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, NW800	35		0,8 l
	Traciafin	WW,SW, DU	G	07, 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F		0,8 l
				07, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F		0,8 l
	Univoq	W	05,07, 09	NW -(15/10/5)m NW706	F	2,0 l	Univoq ist zugelassen ab BBCH 41 (= Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich).	

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Ramularia</i> - Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo-cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Alonty	G	07, 09	NW 5(*/*/*)m	35	1,5 l	Die typischen Sprenkelnekrosen erscheinen meist erst nach dem Ähren-schieben, oft nach einem Witterungs-umschwung von bewölkt und regnerisch (strahlungsarm) auf sonnig mit starkem Anstieg der Temperatur und der Global-strahlung. Fungizide mindern den Schadensverlauf, wenn sie in den empfindlichen Entwicklungsstadien zwischen Fahnenblattstadium (BBCH 39) und Beginn der Blüte (BBCH 61) möglichst kurz vor oder kurz nach einem Witterungsumschwung zu einer Hoch-strahlungsphase eingesetzt werden. Folpan 500 SC ist ein reines Kontaktfungizid zur Befalls-minderung. Da <i>Ramularia collo-cygni</i> mittlerweile in ganz Bayern eine zunehmende Resistenz gegen wichtige Fungizid-wirkstoffe zeigt, kann die Ergänzung von Folpan 500 SC die Wirkung gegen die Sprenkelkrankheit verbessern und zugleich die Ausbreitung der Resisten-zen verzögern. Empfohlen wird eine Kombination mit Gerstenfungiziden, welche die Wirkstoffe Mefentriflu-conazol oder Prothioconazol enthalten.
	Ascra Xpro	G	05, 07, 09	NW 5(5/5/*)m	F	1,2 l	
	Avastel Pack = Pioli + Abran	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NT850, VA277	F	1,5 + 0,75 l	
	Aviator Xpro	G	05, 09	NW 10(5/5/*)m NW706	F	1,0 l	
	Balaya	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/*)m	35	1,5 l	
	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Folpan	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15)m NW706	42	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Folpan 500 SC	G	07, 08, 09	NW -(20/15)m NW706	42	1,5 l	
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Triple	G	05, 07, 08, 09	NW -(10/5/*)m NW706, NW800	F	1,25 l	
	Jordi	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706	F	1,5 l	
	Revystar	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l	
	Revystar + Flexity	G	07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 + 0,5 l	
Revytrex	G	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,5 l		

Infos zum Getreidebau
Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Ramularia</i> - Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo- cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Revytrex + Comet	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	35	1,5 + 0,5 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/*)m NW705	F	1,0 l	
	Vastimo	G	07, 08, 09	NW 5(5/*/*)m	F	2,0 l	

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!