



Herbizidempfehlung zur Herbstbehandlung in Wintergerste

Windhalm-Standorte

Im frühen Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)	
➤ Herold SC	0,3 - 0,4
➤ Battle Delta + Beflex	0,3 + 0,3
➤ Malibu	2,5 - 3,0
➤ Pontos	0,5
➤ Jura	3,5 - 4,0
➤ Boxer + Alliance	3,0 + 0,06
➤ Boxer + Beflex	2,5 + 0,3
➤ Carmina 640 + Alliance	1,5 + 0,06
➤ Carmina 640 + Beflex	1,5 + 0,3
➤ Cadou SC + Agolin	0,24 + 1,5
➤ Trinity	2,0

Ackerfuchsschwanz-Standorte

Im Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)	
➤ Herold SC + Axial 50	0,5 + 0,9
➤ Malibu + Axial 50	2,5 + 0,9
➤ Quirinus Forte Set + Axial 50	0,5 + 0,5 + 0,9
➤ Stomp Aqua + Axial 50	2,5 + 0,9

Hoher Ackerfuchsschwanz-Besatz

Herbst-/Frühjahr-Spritzfolge

NAK	- Herold SC	0,6
	- Malibu	4,0
	- Quirinus Forte Set	0,5 + 0,5
	- Boxer + Battle Delta	3,0 + 0,4
NAF	- Axial 50	1,2

NAK

NAH

