



# Herbizidempfehlung zur Herbstbehandlung in Weizen, Roggen und Triticale (kulturspezifische Aufwandmengen beachten)

## Windhalm-Standorte

### Im frühen Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)

- Herold SC 0,3 – 0,4
- Malibu 2,5 – 3,0
- Pontos 0,5
- Jura 3,5 – 4,0
- Boxer + Alliance 3,0 + 0,06
- Boxer + Beflex 2,5 + 0,3
- Battle Delta + Beflex 0,3 + 0,3
- Carmina 640 + Alliance 1,5 + 0,06
- Carmina 640 + Beflex 1,5 + 0,3
- Cadou SC + Agolin 0,24 + 1,5
- Trinity 2,0

## Ackerfuchsschwanz-Standorte

### Im frühen Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)

- Herold SC 0,6
- Malibu 3,5 – 4,0
- Quirinus Forte Set 0,5 + 0,5
- Boxer + Herold SC 2,0 + 0,5

### Bei Bedarf Folgebehandlung im Frühjahr:


Atlantis Flex + FHS  
0,2 - 0,33 + 0,6 - 1,0

### Im Nachauflauf (Mittel; l,kg/ha)

- Herold SC + Traxos 0,5 + 1,2

**NAK**

**NAH**



Entwicklungsstadien nach BBCH-Code



**LfL**