

## Infos zum Kartoffelbau

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Kraut- und Knollenfäule ( <i>Phytophthora infestans</i> )	<b>Kontaktmittel</b>					
	Airone SC	09	NW 5(5/*/*)m NT620-2	7	3,1 l max. 3x	Bei starkem Krautfäuledruck sind Spritzabstände von 6-8 Tagen vorzusehen. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, spätestens nach zwei Anwendungen hintereinander einen Wechsel mit einem anderen Mittel aus einer anderen Wirkstoffgruppe vornehmen. Bei den Kupfer-Präparaten (Airon SC, Coprantol Duo, Cuprozin progress, Funguran progress) ist die maximal zulässige Kupferaufwandmenge pro Jahr und im Fünfjahreszeitraum zu beachten! Amtlichen Warndienst beachten!
	Coprantol Duo	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT620-2	7	3 kg max. 3x	
	Cuprozin progress	05, 07, 09	NW 5(5/*/*)m NT620-1	14	2,0 l max. 6x	
	Funguran progress	07, 09	NW 5(5/*/*)m NT620	14	2,0 kg max. 4x	
	Carneol	07, 08, 09	NW 10(5/5/*)m	7	0,4 l max. 8x	
	Nando 500 SC	07, 08 09	NW 10(5/5/*)m NT101	7	0,4 l max. 10x	
	Polyram WG	07, 08 09	NW -(15/10/5)m	14	1,8 kg max. 5x	
	Ranman Top	09	NW 5(*/*/*)m NW705	7	0,5 l max. 6x	
	Shirlan	07, 08 09	NW 10(5/5/*)m NW701	7	0,4 l max. 10x	
Terminus	07, 08 09	NW 10(5/5/*)m	7	0,4 l max. 8x		

## Infos zum Kartoffelbau

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Kraut- und Knollenfäule ( <i>Phytophthora infestans</i> )	<b><i>lokalsystemische Fungizide</i></b>					
	Carial Flex	07, 08 09		7	0,6 kg max. 6x	Bei starkem Krautfäuledruck in Spritzfolge einbauen. Ab gelbwerden der unteren Blätter nicht mehr einsetzen. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, spätestens nach zwei Anwendungen hintereinander einen Wechsel mit einem anderen Mittel aus einer anderen Wirkstoffgruppe vornehmen! Amtlichen Warndienst beachten!
	Banjo forte	08, 09	NW 10(5/5/*)m	7	1,0 l max. 4x	
	Plexus	07, 08 09	NW 15(10/5/5)m SB1904	7	0,6 l max. 6x	
	Presidium	07, 09	NW 5(5/5/*)m	7	1,0 l max. 5x	
	Reboot	07, 08 09	NW 5(5/*/*)m NW 706	7	0,45 kg max. 6x	
	Revus	09		7	0,6 l max. 4x	
	Revus Top	09	NW 5(5/5/*)m	3	0,6 l max. 3x	
	<b><i>systemische Fungizide</i></b>					
	Infinito	05, 07, 09	NG324-2, NG325	14	1,6 l max. 4x	Bei starkem Befallsdruck zu Beginn der Spritzfolge einsetzen. Warndienst beachten! Um Resistenzbildungen vorzubeugen muss spätestens nach zwei Anwendungen hintereinander einem Wechsel mit einem anderen Fungizid aus einer anderen Wirkstoffgruppe vorgenommen werden.
Zorvec Endavia	07, 08, 09	NW 5(*/*/*)m	7	0,4 l max. 4x		

## Infos zum Kartoffelbau

## Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Dürrfleckenkrankheit ( <i>Alternaria solani</i> )	Narita	07, 08 09	NW 5(5/*/*)m	14	0,5 l max. 1x	Bei anhaltender <i>Alternaria</i> -Gefahr Behandlung wiederholen. Gegen Ortiva und Signum besteht in den bayerischen Kartoffelanbaugebieten verbreitete Resistenz (Informationen für die Resistenzsituation in ihrer Region beim zuständigen amtlichen Pflanzenschutzdienst einholen). Amtlichen Warndienst beachten!
	Ortiva	09	NW 5(*/*/*)m NW604	7	0,5 l max. 3x	
	Polyram WG	07, 08 09	NW -(15/10/5)m	14	1,8 kg max. 5x	
	Propulse	08, 09	NW 5(*/*/*)m	F	0,5 l max. 3x	
	Revus Top	09	NW 5(5/5/*)m	3	0,6 l max. 3x	
	Signum	09	NW 5(*/*/*)m NW604	3	0,25 kg max. 4x	

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!