

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser und Schädlinge

| Schaderreger | Präparate | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----|------------------|---|
| Schnecken | Ironmax Pro | | NT116,870 | F | 7 kg max. 4x | Schneckenkorn auf Basis von Eisen III Phosphat. Breitflächiges Streuen vom Auflaufen bis zur Ernte möglich. |
| Beißende und saugende Insekten | Karate Zeon | 08 09 | NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108 | 35 | 75 ml max. 2x | Zeitlicher Abstand der Behandlungen mindestens 10 Tage. |
| Unkräuter | Centium 36 CS | 09 | NT102,127,149 | F | 0,25 l | Im Voraufbau, bis 5 Tage nach der Saat, gegen Unkräuter. Nicht in Beständen zur Saatguterzeugung. |
| | Clearfield Clentiga + Dash | 05 07 08 09 | NT108, NG343,354 | F | 1,0 + 1,0 l | Gegen Unkräuter im Nachaufbau bis BBCH 25 der Sojabohne. |
| | Harmony SX | 09 | NT101 | F | 2x 7,5 g | Gegen Amaranth, Hohlzahn, Kamille, Vogelmilch. Nach dem Auflaufen im Splitting-Verfahren in BBCH 12 und 14. Nebenwirkung gegen Ampfer. Anwendung in Mischung mit einem geeigneten Netzmittel empfohlen. |
| | Sencor Liquid | 09 | NW 5(*/*/*)m, NT101, NW701 | F | 0,3 - 0,4 l | Im Voraufbau bis BBCH 07. Ergänzung mit weiteren Bodenherbiziden sinnvoll. Sortenverträglichkeit gegenüber Metribuzin beachten. |

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser und Schädlinge

| Schaderreger | Präparate | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|------------------------|----------------|--|--|-------------|--|---|
| Unkräuter | Stomp Aqua | 07 08 09 | NW -(-/-/5)m NT112 NT145,146,170 | F | 1,5 - 2,0 l | Im Voraufbau gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Aufwandmenge je nach Bodenart und Niederschlagsverhältnissen. Tankmischung mit Ergänzungspartner, wie z.B. 0,75 l/ha Spectrum, notwendig. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden. |
| Unkräuter und Ungräser | Artist | 07 08 09 | NW 5(*/*/*)m NW706, NT103 | F | 2,0 kg | Im Voraufbau gegen Unkräuter, Jährige Rispe und Schadhirs. Sortenverträglichkeit beachten. |
| | Quantum | 05 07 08 09 | NW 5(5/5/*)m NW706, NG405, NT101 | F | 2,0 l | Im Voraufbau gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Kombination mit Ergänzungspräparat sinnvoll. |
| | Spectrum | 07 09 | NW 5(5/5/*)m NT101, NW701 | F | 0,8 l | Gegen Schadhirs, Amaranth und Kamille-Arten im Voraufbau mit 0,8 l auf leichten Böden bzw. mit 1,4 l/ha auf mittleren bis schweren Böden. Ergänzung mit z.B. Stomp Aqua oder Sencor Liquid notwendig. |
| | | | NW 10(5/5/*)m NT101, NW706 | F | 1,4 l | |
| Spectrum Plus | 07 08 09 | NW -(-/-/5)m NW706, NG405, NT112,145,146,170 | F | 2,5 - 3,5 l | Im Voraufbau gegen Hirsen, Jährige Rispe und Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Gute Bodenfeuchtigkeit notwendig. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden. | |

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser und Schädlinge

| Schaderreger | Präparate | GHS | Auflagen* | WZ | Aufwand | Bemerkungen |
|---|--|----------------------|-----------|----|------------------------|--|
| Samenungräser, außer Jährige Rispe | Fusilade MAX | 07 08 09 | NT101 | F | 0,75-1,0 l | Gegen Ungräser und Ausfallgetreide im Nachauflauf bis BBCH 51. Zielpflanzen sollten im Stadium BBCH 11 bis spätestens BBCH 21 sein. |
| | Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash | 05 07 08 09 | NT101 | F | 1,0 - 1,5 l + 1,0 l | Gegen Ungräser und Ausfallgetreide im Nachauflauf von BBCH 11-51. Zielpflanzen sollten im Stadium BBCH 12 bis spätestens BBCH 19 sein. |
| | Targa Super | 05 07 08 09 | NT101 | 90 | 1,5 l | Gegen Ungräser im frühen Nachauflauf von BBCH 12-29 oder als Spätbehandlung von BBCH 49-59. Ausfallgetreide wird mit erfasst. |
| Quecke, ausgenommen Jährige Rispe | Fusilade MAX | 07 08 09 | NT103 | F | 2,0 l | Gegen Quecke im Nachauflauf bis BBCH 51. Quecken sollten 2-4 Blätter entwickelt haben. |
| | Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash | 05 07 08 09 | NT102 | F | 2,5 l + 1,0 l | Gegen Quecke im Nachauflauf von BBCH 11-51 bei einer Wuchshöhe der Quecke von 25 cm. |
| | Targa Super | 05 07 08 09 | NT102 | 90 | 2,5 l | Gegen Quecke bei 15-20 cm Wuchshöhe im frühen Nachauflauf von BBCH 12-29 oder als Spätbehandlung von BBCH 49-59. Ausfallgetreide wird mit erfasst. |

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!