

Infos zum Rübenbau

Pilz- und Mangelkrankheiten

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Cercospora- und Ramularia-Blattflecken, Echter Mehltau	Amistar Gold	07 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l max. 2x	<p>Bekämpfungsschwellen für Blattkrankheiten: Erstbehandlung bis 31. Juli: 5 von 100 zufällig entnommene Blätter aus dem mittleren Blattapparat sind befallen.</p> <p>Juli: 5 von 100 zufällig entnommene Blätter aus dem mittleren Blattapparat sind befallen. Zweitbehandlung bis 31. Juli: 15 von 100 zufällig entnommene Blätter aus dem mittleren Blattapparat sind befallen. Erstbehandlung ab 1. August bis 15. August: 15 von 100 zufällig entnommene Blätter sind befallen. Folgebehandlung bis 15. August: 15 von 100 Blätter zeigen Befall. Erst- und Folgebehandlung ab 16. August: 45 von 100 Blättern zeigen Befall.</p> <p>Zweitbehandlungen sind frühestens zwei Wochen nach einer Erstbehandlung zweckmäßig. Bei einer Erstbehandlung ab 16. August ist in der Regel keine Folgebehandlung erforderlich.</p> <p>Schwellenwerte gelten für die Summe an Cercospora-, Ramularia-Blattflecken, Mehltau und Rost.</p> <p>Ab September sind in der Regel keine Behandlungen mehr erforderlich.</p> <p>Score ist nicht gegen Mehltau zugelassen.</p> <p>Warndienst beachten!</p> <p>Hinweis: In Bayern wurde verbreitet Fungizidresistenz gegenüber Cercospora-Blattflecken nachgewiesen. Bei allen aufgeführten Präparaten muss mit einer Minderwirkung gegen Cercospora-Blattflecken gerechnet werden! Deshalb auf Hinweise des amtlichen Pflanzenschutzdienstes achten, ob für die Saison 2022 alternative Präparate bzw. Mischungspartner kurzfristig zur Verfügung stehen.</p>
	Domark 10 EC	07 08 09	NW642	28	1,0 l max. 2x	
	Score	07 08 09	NW 10(5/5/*)m	28	0,4 l max. 2x	

Infos zum Rübenbau

Pilz- und Mangelkrankheiten

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Cercospora</i> -Blattflecken	Serenade ASO		NW642	F	4,0 l max. 4x	Biologisches Pflanzenschutzmittel (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Stamm QST 713) zur Stärkung der pflanzeigenen Abwehrkräfte. Die Anwendung ist ab Beginn Bestandesschluß insgesamt 4x im Abstand von 5 Tagen möglich. Wirkung stark schwankend bzw. wetterabhängig. Präparat ist deshalb nur zur Befallsminderung bei schwachem Befallsdruck geeignet!
Echter Mehltau	Thiopron	'07	NW701	F	7,5 l max. 2x	Nur zur Befallsminderung bei schwachen Mehлтаudruck!
Rhizoctonia (Späte Rübenfäule)	Amistar Gold	07 09	NW 5(5/*/*)m	35	1,0 l max: 1x	Auf Befallsflächen vor Bestandesschluss spritzen (BBCH 31-39). Nur zur Befallsminderung!
Herz- und Trockenfäule	Bor-haltige Dünger				lt. Firmen- angabe	Bei höheren Aufwandmengen ist eine Splittinganwendung sinnvoll.
Manganmangel	Mn-haltige chelatisierte Blattdünger				lt. Firmen- angabe	Besonders auf anmoorigen Böden. Bei Bedarf wiederholen.
Magnesiummangel	Mg-haltige chelatisierte Blattdünger				lt. Firmen- angabe	

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!