

## Zulassung Basamid Granulat im Beerenobst und Erdbeeren (Stand März 2025)

Basamid Granulat (Wirkstoff: Dazomet), B 3, Zulassung bis 31.08.2027

| Kulturen   | Krankheit  | Aufwandmenge   | Anwendungszeitpunkt                                 | Wartezeit | Bienenschutz | Anwendungsbestimmungen   |
|--|--|--|---|-----------|--------------|--|
| Erdbeeren  | Bodenpilze<br>Insekten<br>Wurzelgallenälchen wandernde<br>Wurzelnekrotosen<br>(Freiland und Gewächshaus) | 500 kg/ha<br><br>Anwendungstechnik:<br>streuen mit<br>sofortiger Einarbeitung<br>Anzahl der Behandlungen:<br>Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre,<br>Einarbeitung bis 20 cm Bodentiefe, anschließend mind. 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung),<br>13 Wochen (Herbstanwendung)<br>5 Wochen (Gewächshaus) | vor dem Pflanzen<br>max. 1 Anw. Pro Kultur und Jahr | F         | B3           | NW 467, SE1201, SF499, SF535, SF536, SF537, SF539, SF553: Grundsätzlich ist ein Sicherheitsabstand von 25 m von der Grenze des behandelten Gewächshauses bzw. Feldes zu Bereichen in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten einzuhalten. Für die Dauer von 14 Tagen ab Beginn der Behandlung ist eine Sperrzone von 5 m um das Gewächshaus bzw. das Feld einzurichten, die mit Warningschildern zu kennzeichnen sind.<br>SF 554: Es dürfen nur Einzelflächen bis 1,1 ha behandelt werden. Zwischen behandelten Flächen in ein Mindestabstand von 50 m einzuhalten.<br><br>SS1201-1, SS2204, ST227, ST340, VA310, VA311, VA312 |
| Erdbeeren  | einj.einkeimblättrige Unkräuter,<br>einj. zweikeimblättrige Unkräuter,<br>(Freiland und Gewächshaus)     | 300 kg/ha<br><br>Anwendungstechnik wie oben<br>Einarbeitung bis 10 cm Bodentiefe   | vor dem Pflanzen<br>max. 1 Anw. Pro Kultur und Jahr | F         |              | SS1201-1, SS2204, ST227, ST340, VA310, VA311, VA312  |
| Schwarze Johannisbeere<br>Rote Johannisbeere<br>Weiße Johannisbeere<br>Stachelbeere<br>Himbeere<br>Brombeere<br>Heidelbeer-Arten | Bodenpilze<br>Insekten<br>Wurzelgallenälchen wandernde<br>Wurzelnekrotosen<br>(Freiland)                 | 500 kg/ha<br><br>Anwendungstechnik:<br>streuen mit<br>sofortiger Einarbeitung<br>Einarbeitung bis 20 cm Bodentiefe, anschließend mind. 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung),  | vor dem Pflanzen<br>max. 1 Anw. Pro Kultur und Jahr | F         | B3           | NW 467, SE1201, SF499, SF535, SF536, SF537, SF539, SF553: Grundsätzlich ist ein Sicherheitsabstand von 25 m von der Grenze des behandelten Gewächshauses bzw. Feldes zu Bereichen in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten einzuhalten. Für die Dauer von 14 Tagen ab Beginn der Behandlung ist eine Sperrzone von 5 m um das Gewächshaus bzw. das Feld einzurichten, die mit Warningschildern zu kennzeichnen sind.<br>SF 554: Es dürfen nur Einzelflächen bis 1,1 ha behandelt werden. Zwischen behandelten Flächen in ein Mindestabstand von 50 m einzuhalten.<br><br>SS1201-1, SS2204, ST227, ST340, VA310, VA311, VA312 |
|  | einj.einkeimblättrige Unkräuter,<br>einj. zweikeimblättrige Unkräuter,<br>(Freiland)                     | 300 kg/ha<br><br>Anwendungstechnik wie oben<br>Einarbeitung bis 10 cm Bodentiefe   | vor dem Pflanzen<br>max. 1 Anw. Pro Kultur und Jahr | F         |              | SF 554: Es dürfen nur Einzelflächen bis 1,1 ha behandelt werden. Zwischen behandelten Flächen in ein Mindestabstand von 50 m einzuhalten.<br><br>SS1201-1, SS2204, ST227, ST340, VA310, VA311, VA312   |

| Kulturen                              | Krankheit  | Aufwandmenge  | Anwendungszeitpunkt                                    | Wartezeit | Bienenschutz | Anwendungsbestimmungen  |
|---------------------------------------|--|---|--|-----------|--------------|---|
| Obstkulturen<br>Anzucht- und Topferde | Bodenpilze<br>Insekten<br>Wurzelgallenälchen<br>wandernde<br>Wurzelnematoden | 0,25 kg/m <sup>3</sup>  | vor Kulturbeginn<br>max. 1 Anw. pro<br>Kultur und Jahr | F         | B3           | NW 467, SE1201, SF499,<br>SF535, SF536, SF537, SF539,<br>SF553: Grundsätzlich ist ein<br>Sicherheitsabstand von 25 m von<br>der Grenze des behandelten<br>Gewächshauses bzw. Feldes zu<br>Bereichen in denen sich Menschen<br>dauerhaft aufhalten einzuhalten.<br>Für die Dauer von 14 Tagen ab<br>Beginn der Behandlung ist eine<br>Sperrzone von 5 m um das<br>Gewächshauses bzw. das Feld<br>einzurichten, die mit Warnschildern<br>zu kennzeichnen sind.<br>SF 554, SS1201-1,<br>SS2204, ST227, ST340,<br>VA310, VA311, VA312 |
| Obstkulturen<br>Anzucht- und Topferde | einj.einkeimblättrige<br>Unkräuter,<br>einj. zweikeimblättrige<br>Unkräuter, | 0,3 kg/m <sup>3</sup>   | vor Kulturbeginn<br>max. 1 Anw. pro<br>Kultur und Jahr | F         |              |   |
|                                       |  | Anwendungstechnik:<br>streuen mit<br>sofortiger Einarbeitung<br>anschließend<br>mind. 5 Wochen mit Plastik-<br>folie abdecken |  |           |              |   |
|                                       |  | Anwendungstechnik:<br>streuen mit<br>sofortiger Einarbeitung<br>anschließend<br>mind. 5 Wochen mit Plastik-<br>folie abdecken |  |           |              |   |

**Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; die jeweiligen Anwendungsbestimmungen sind zu beachten.  
Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für die Richtigkeit und  
Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter  
Präparate oder Verfahren ergeben könnte, wird nicht übernommen.**