


Sortenempfehlung Gräser, Klee und Luzerne

Vegetation 2026



Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM Mitte Süd				Ertrag TM ¹⁾			Narben- dichte ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 3)}	Eignung Aus- dauer ⁴⁾	D ⁵⁾ E ⁵⁾	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾	
			trocken		frisch		Gesamt	1.	weitere					6	7	8	10	11		
			1.	1. - 3.	1.	1. - 3.														
			Schnitt/e																	
Artesia	(T) STEI	07	(-)	(-)	0	(-)	0	(-)	+	0	+	++	D	■	■	■	■	■	✓	
Arvicola	(T) FREU	04	0	(-)	0	0	0	(-)	+	(+)	(+)	+++	D	■	■	■	■	■	✓	
Ferris	(T) STEI	16	0	0	0	(-)	0	(-)	+	0	(+)	+		■	■	■	■	■	✓	
Giant	(T) DLF	07	0	0	0	0	(+)	-	++	0	0	+	D	E	■	■	■	■	■	✓
Soronia	(T) FREU	18	0	0	(+)	(+)	(+)	(-)	+	0	+	(+)		E	■	■	■	■	■	✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte		Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM Mitte Süd				Ertrag TM ¹⁾			Narben- dichte ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 3)}	Eignung Aus- dauer ⁴⁾	D ⁵⁾ E ⁵⁾	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾	
				trocken		frisch		Gesamt	1. Schnitt/e	weitere					6	7	8	10	11		
				1.	1. - 3.	1.	1. - 3.														
Activa	(T)	R2N	09	0	0	0	0	(+)	(+)	(+)	0	(+)	+			■	■	■	■	■	✓
Alligator	(T)	DSV	01	+	(+)	(+)	(+)	+	+	(+)	0	0	+	D	E	■	■	■	■	■	✓
Allodia	(T)	RUDC	15	0	0	(+)	(+)	(+)	+	0	0	(+)	(+)			■	■	■	■	■	
Azerrot*		DSV	23	(+)	+	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)			■	■	■	■	■	
Bellator	(T)	FREU	19	(+)	+	(+)	(+)	+	+	(+)	0	(+)	+			■	■	■	■	■	
Botond	(T)	DSV	19	+	+	(+)	(+)	+	+	(+)	0	(+)	+	D	E	■	■	■	■	■	
Caritou	(T)	R2N	20	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+	(+)	0	(+)	(+)			■	■	■	■	■	✓

*vorläufige Empfehlung

[Anbauggebiete \(Karte\)](#)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

[Details zur Skala \(- - -\) bis \(+ + +\)](#)

[Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen](#)

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM				Ertrag TM ¹⁾				Narben- dichte ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 3)}	Eignung Aus- dauer ⁴⁾	D ⁵⁾	E ⁵⁾	Anbauggebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Mitte		Süd		Gesamt	1.	weitere	6						7	8	10	11		
			trocken 1.	frisch 1. - 3.	trocken 1.	frisch 1. - 3.															
Diwan	(T) DLF	12	(+)	+	(+)	(+)	+	+	(+)	0	+	(+)									✓
Explosion	(T) DSV	18	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+	(+)	0	(+)	+		E							
Garbor	(T) DLF	12	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+	(+)	0	(+)	+	D	E							✓
Hanova	(T) DLF	22	**	(+)	**	(+)	+	+	(+)	0	(+)	(+)									✓
Soraya	(T) FREU	13	0	(+)	0	0	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)	++									✓
Tribal	(T) R2N	11	(+)	(+)	0	0	(+)	+	(+)	0	+	(+)									✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM				Ertrag TM ¹⁾				Narben- dichte ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 3)}	Eignung Aus- dauer ⁴⁾	D ⁵⁾ E ⁵⁾	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Mitte Süd				Gesamt	1.	weitere	6					7	8	10	11		
			trocken		frisch															
			1.	1. - 3.	1.	1. - 3.													Schnitt/e	
Dressano	(T) DLF	14	+	(+)	0	(+)	(+)	(+)	(+)	0	(+)	(+)	E							
Hurricane	(T) R2N	14	++	(+)	(+)	(+)	+	+	0	0	+	(+)								
Irondal	(T) R2N	11	(+)	0	0	0	(+) ²⁾	(+) ²⁾	(+) ²⁾	(+) ²⁾	(+) ²⁾	+							✓	
Kentaur	(T) DLF	05	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+++	0	(-)	(+)	(+)	E						✓	
Novello	(T) DLF	09	+	(+)	0	0	(+)	+	(+)	0	(+)	(+)	E						✓	
Polim	(T) DLF	07	0	(+)	(-)	0	+	+	0	0	(+)	+	D						✓	
Spectre	(T) DLF	22	**	+	**	(+)	+	++	(+)	0	+	(+)							✓	
Sputnik	DLF	14	++	+	(+)	(+)	+	+	0	0	(+)	(+)	D E						✓	
Valerio	(T) DSV	11	(+)	(+)	0	0	+	++	0	0	(+)	+	D						✓	

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
 Feldfutterbaumischungen
 Grünland- und Feldfutterbaumischungen
 Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Massenb. im Anfang ¹⁾	Winter- härte ^{1), 3)}	Resistenz ^{1), 3)} gegen Rost	Zeitpunkt Ähren- schieben ¹⁾	Beratungsgebiet Bayern	gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1.	weitere						
			Schnitt/e								
Ibex	(T) DSV	00	(+)	(+)	(+)	+	(+)	(+)	früh	☐	✓
Leonis	(T) STEI	07	(+)	+	(+)	+	(+)	(+)	sehr früh - früh	☐	✓
Melcombi	(T) FREU	16	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	früh	☐	✓
RGT Everial	(T) R2N	20	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	früh - mittel	☐	
Rusa	(T) FREU	02	(+)	(+)	(+)	+	0	(+)	sehr früh - früh	☐	✓
Segovia	DSV	20	(+)	(+)	(+)	+	(+)	0	früh	☐	

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- ☒ Grünlandmischungen
☐ Feldfutterbaumischungen
☒ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
☐ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM Mitte Süd				Ertrag TM ¹⁾			Mas- senb. im An- fang ¹⁾	Win- ter- här- te ^{1), 3)}	Resistenz gegen ^{1),3)}			Zeit- punkt Äh- ren- schie- ben ¹⁾	Q ⁵⁾	Z ⁵⁾	E ⁵⁾	Beratungs- gebiet Bayern		gelistet in den BQSM® ⁶⁾	
			trocken		frisch		Ge- samt	1.	wei- tere			Rost	Fusa- rium	Bakt. Welke					tro- cken	frisch		
			1.	1.–2.	1.	1.–2.																Schnitt/e
Baressa	(T) BAHO	23	(+)	**	0	**	(+)	0	+	(+)	**	++	**	(+)	mittel	Q		E	☐	☐		
Barmultra II	(T) BAHO	08	0	**	(+)	**	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	mittel				☐	☐	✓	
Capelli	(T) R2N	17	(+)	**	0	**	(+)	(+)	(+)	0	(+)	++	0	+	mittel	Q	Z		☐	☐		
Carital	(T) R2N	16	(+)	**	(+)	**	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	0	fr-m		Z	E	☐	☐	✓	
Dolomit	(T) DSV	09	0	**	0	**	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	fr-m			E	☐	☐		
Dorike	(T) DSV	06	0	**	0	**	(+)	0	(+)	0	0	+	**	(+)	fr-m			E	☐	☐		
Jeanne	(T) DLF	96	0	**	0	**	0 ²⁾	0 ²⁾	(+ ²⁾	(+ ²⁾	(+ ²⁾	++ ²⁾	**	(+ ²⁾	fr-m	Q			☐	☐	✓	
Kingsgreen	(T) RUDC	19	(+)	**	(+)	**	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	+	(+)	0	fr-m		Z	E	☐	☐		
Melquatro	(T) FREU	04	0	**	0	**	(+)	0	+	0	(+)	(+)	(+)	(+)	mittel			E	☐	☐	✓	
Melsprinter	(T) FREU	17	(+)	**	(+)	**	(+)	0	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	mittel			E	☐	☐	✓	
Merapido	FREU	22	(+)	0	(+)	0	(+)	0	+	0	**	+	**	0	fr-m			E	☐	☐		

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- ☒ Grünlandmischungen
☐ Feldfutterbaumischungen
☒ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
☐ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM Mitte Süd				Ertrag TM ¹⁾			Mas- senb. im An- fang ¹⁾	Win- ter- här- te ^{1), 3)}	Resistenz gegen ^{1),3)}			Zeit- punkt Äh- ren- schie- ben ¹⁾	Q ⁵⁾	Z ⁵⁾	E ⁵⁾	Beratungs- gebiet Bayern		gelistet in den BQSM® ⁶⁾	
			trocken		frisch		Ge- samt	1.	wei- tere			Rost	Fusa- rium	Bakt. Welke					tro- cken	frisch		
			1.	1.–2.	1.	1.–2.																Schnitt/e
Oryttus	(T) FREU	19	(+)	**	(+)	**	(+)	(-)	+	(+)	(+)	+	+	+	fr-m			E	☐	☐	✓	
Oryx	FREU	03	0	**	0	**	(+)	0	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	mittel			E	☐	☐	✓	
Rulicar	(T) R2N	19	(+)	**	0	**	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	++	(+)	(+)	fr-m	Q	Z	E	☐	☐	✓	
Sendero	DSV	19	0	**	(+)	**	(+)	0	+	0	(+)	+	(+)	(+)	mittel			E	☐	☐	✓	
Silvius	(T) STEI	14	0	**	0	**	0	0	(+)	0	(+) ²⁾	++	**	(+)	mittel	Q			☐	☐		
Udine	(T) DLF	11	0	0	0	0	(+)	(+)	(+)	0	(+)	++	**	0	fr-m	Q	Z		☐	☐	✓	

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- ☒ Grünlandmischungen
☐ Feldfutterbaumischungen
☒ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
☐ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte		Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Massenb. im Anfang ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1),3)}	Zeitpunkt Ähren-schieben ¹⁾
				Gesamt	1. Schnitt/e	weitere			
Banco	(T)	R2N	20	(+)	0	+	(+)	0	mittel
Bendix	(T)	RUDC	12	+	0	+	(+)	+	mittel - spät
Caid		R2N	21	+	+	(+)	+	(+)	sehr früh – früh
Jumper	(T)	DLF	04	(+)	-	++	(-)	+	mittel - spät
Meljump	(T)	FREU	17	+	(-)	++	0	(+)	mittel - spät
Volubyl		R2N	11	+	(-)	++	0	+	früh – mittel

[Details zur Skala \(- - - bis + + +\)](#)

empfohlen für alle bayerischen Anbauggebiete

[Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen](#)

Sorte		Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾ 1.Schnitt	Massenb. im Anfang ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1),3)}	Zeitpunkt Ähren-schieben ¹⁾
Alberto	(T)	DSV	10	+	(+)	+	früh
Bendix	(T)	RUDC	12	(+)	+	+	mittel – spät
Falladino	(T)	DSV	17	(+)	(+)	+	früh – mittel
Glodaro	(T)	DSV	20	++	+	(+)	sehr früh – früh
Rodillo		DSV	23	(+)	0	(+)	früh – mittel
Souvenir	(T)	DSV	09	+	(+)	+	sehr früh – früh
Weyda	(T)	DSV	24	(+)	+	(+)	früh – mittel

[Details zur Skala \(- - - bis + + +\)](#)

empfohlen für alle bayerischen Anbauggebiete

[Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen](#)

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Massenb. im Anfang ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1),3)}	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1.	weitere				6	7	8	10	11	
			Schnitt/e											
Baltas	DSV	16	(+)	+	0	(+)	+	0	■	■	■	■	■	✓
Cosima	STEI	10	**	**	**	**	**	**	■	■	■	■	■	✓
Cosmolit Z	STEI	93	(+)	(+)	0	(+)	(+)	(+)	■	■	■	■	■	✓
Cosmopolitan	STEI	13	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+	■	■	■	■	■	✓
Liherold	DSV	05	(+)	(+)	0	(+)	+	(+)	■	■	■	■	■	✓
Pardus	FREU	06	(+)	0	(+)	(+)	(+)	(+)	■	■	■	■	■	✓
Pradel	BAHO	00	**	**	**	**	**	**	■	■	■	■	■	
Preval	DSV	00	(+)	(+)	(+)	(+)	+	(+)	■	■	■	■	■	✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

[Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen](#)

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹¹⁾			Winter- härte ¹⁰⁾	Massenb. im Anfang ¹⁰⁾	Resistenz gegen Blattkrank- heiten ¹⁰⁾	Verdau- lichkeit ¹¹⁾	Anbauggebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1.	weitere					6	7	8	10	11	
Barolex	BAHO	12	0	**	**	(+)	+	+	0	■	■	■	■	■	✓
Belfine	DSP	03	0	**	**	(+)	0	+	(+)	■	■	■	■	■	
Callina	R2N	12	0	**	**	(+)	(+)	++	0	■	■	■	■	■	
Elodie	JOUF	08	0	**	**	+	(+)	++	0	■	■	■	■	■	✓
Otaria	FREU	10	(-)	**	**	(+)	(+)	+	(-)	■	■	■	■	■	✓

Anbaugebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1),3)}	Massenb. im Anfang ¹⁾	Anbauggebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1. Schnitt/e	weitere			6	7	8	10	11	
Aturo	DSV	10	0	0	(+)	0	0	■	■	■	■	■	✓
Comer	DLF	99	0	0	(+)	0	(+)	■	■	■	■	■	✓
Fjord	ILVO	20	0	0	(+)	0	+	■	■	■	■	■	✓
Licora	DSV	97	0	0	0	0	0	■	■	■	■	■	
Lischka	DSV	95	0	(-)	0	0	0	■	■	■	■	■	✓
Phlewiola	RUDC	65	**	**	**	**	**	■	■	■	■	■	✓
Polarking	FREU	16	0	0	(+)	0	(+)	■	■	■	■	■	✓
Radde	DSV	20	(+)	(+)	(+)	0	+	■	■	■	■	■	
Summergraze	DLF	07	(+)	(+)	(+)	0	(+)	■	■	■	■	■	✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Massenb. im Anfang ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 3)}	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾	
			Gesamt	1. Schnitt/e	weitere				6	7	8	10	11		
Erntegruppe früh (Reifegruppe 1 – 4)															
Dragoner	STEI	10	0	(+)	0	(+)	(+)	+							✓
Treposno	FREU	97	(+)	+	(-)	(+)	+	0							
Erntegruppe mittel/mittelspät (Reifegruppe 5 - 6)															
Aldebaran ⁹⁾	DLF	07	0	0	(+)	(+)	0	+							✓
Baraula ⁹⁾	BAHO	59	(-)	(-)	0	0	(-)	(+)							✓
Husar ⁹⁾	BAYP	01	0 ²⁾	(+) ²⁾	0 ²⁾	(+) ²⁾	(+) ²⁾	(-) ²⁾							✓
Lidacta	DSV	82	0	0	0	0	0	(+)							
Musketier	STEI	13	0	0	0	0	0	+							✓
Revolin	DSV	10	0	(-)	(+)	0	0	++							✓
Rosseur	DSV	20	(+)	0	+	0	0	++							✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Massenb. im Anfang ¹⁾	Resistenz gegen Rost ^{1), 3)}	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1.	weitere				6	7	8	10	11	
Erntegruppe spät (Reifegruppe 7 – 9)														
Barlegro	BAHO	13	0	0	0	(+)	(+)	0	■	■	■	■	■	✓
Diceros	FREU	10	(+)	0	(+)	0	0	+	■	■	■	■	■	✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Zeitpunkt Ähren- schieben ¹⁾	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1.	weitere			6	7	8	10	11	
				Schnitt/e									
Glatthafer													
Arone	STEI	92	0	(+)	(-)	0	früh - mittel	■	■	■	■	■	✓
Goldhafer													
Trisett 51	STEI	55	0	0	0	0	mittel	■	■	■	■	■	✓
Wiesenfuchsschwanz													
Alopex	FREU	07	0	(+)	0	0	mittel	■	■	■	■	■	
Talope	FREU	04	0	--	(+)	(-)	mittel	■	■	■	■	■	
Velox	FREU	18	(+)	+	(+)	++	früh - mittel	■	■	■	■	■	✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Resistenz gegen Rost ^{1), 3)}	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1.	weitere			6	7	8	10	11	
Chester	DLF	16	(+)	(+)	0	0	+	■	■	■	■	■	✓
Kenan	DLF	24	+	(+)	+	0	++	■	■	■	■	■	✓
Lato	STEI	89	+	+	(+)	0	+	■	■	■	■	■	✓
Likollo	DSV	04	(+)	+	(-)	0	++	■	■	■	■	■	
Selista	FREU	16	(+)	(+)	(+)	0	++	■	■	■	■	■	✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Zeitpunkt Rispen- schieben ¹⁾	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM ^{® 6)}
			Gesamt	1. Schnitt/e	weitere			6	7	8	10	11	
Gondolin	DLF	93	(+)	(+)	(+)	(+)	mittel - spät	■	■	■	■	■	✓
Rafael	DSV	09	0	(+)	0	(+)	früh - mittel	■	■	■	■	■	✓
Reverent	FREU	90	(+)	(+)	(+)	0	mittel - spät	■	■	■	■	■	✓
Roland 21	STEI	55	(+)	+	0	(+)	mittel - spät	■	■	■	■	■	✓

Anbaugebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Anteil ^{1), 3)} blausäure- freie Pfl.	Narben- dichte ¹⁾	Wuchs- höhe ¹⁾	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1.	weitere					6	7	8	10	11	
Apis	STEI	12	0	(-)	(+)	(+)	(+)	0	mittel - lang	■	■	■	■	■	✓
Bombus	FREU	09	0	(-)	(+)	0	(+)	(-)	mittel	■	■	■	■	■	
Calimero	BAHO	12	0	0	(+)	(+)	+	(+)	mittel	■	■	■	■	■	
Jura	FREU	96	0	0	(+)	0	+	0	mittel - lang	■	■	■	■	■	✓
Klondike	DLF	96	0	(+)	0	0	0	0	mittel - lang	■	■	■	■	■	✓
Liflex	DSV	03	0	(+)	0	0	+	(+)	mittel	■	■	■	■	■	✓
Rabbani	DLF	06	0	0	(+)	(+)	++	(+)	mittel	■	■	■	■	■	✓
Silvester	DLF	15	0	0	(+)	(+)	++	0	mittel	■	■	■	■	■	✓
Vysocan	NPZ	98	0	0	0	(+)	++	(-)	mittel - lang	■	■	■	■	■	✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
■ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Massenb. im Anfang ¹⁾	Stand- festig- keit ^{1), 3)}	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			Gesamt	1.	weitere				6	7	8	10	11	
Andantino	DLF	24	(+)	+	(+)	0	(+)	(+)						✓
Artemis	BAHO	20	(+)	(+)	(+)	0	(+)	+						✓
Catera	BAYP	12	(+)	(+)	(+)	0	(+)	0						✓
Cigale	DLF	24	(+)	(+)	(+)	0	(+)	(+)						
Daphne	DLF	00	0	0	0	0	(+)	+						✓
Fleetwood	BAYP	12	0	0	(+)	0	0	0						✓
Ludelis	DLF	20	(+)	(+)	(+)	0	(+)	(+)						✓
Planet	DSV	92	0	0	0	0	0	(+)						
Plato	FREU	90	0	0	0	0	0	(+)						✓
Sibemol	SMFR	20	(+)	(+)	+	0	(+)	+						✓
Verko	FREU	79	(+)	0	(+)	0	(+)	(+)						✓
Volga	SMFR	20	(+)	0	(+)	**	(+)	(+)						✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

-  Grünlandmischungen
 Feldfutterbaumischungen
 Grünland- und Feldfutterbaumischungen
 Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM Mitte Süd				Ertrag TM ¹⁾			Winterhärte ^{1), 3)}	Massenb. im Anfang ¹⁾	Resistenz gegen Klee-krebs ^{1), 3)}	Blühbeginn ¹⁾	Beratungsgebiete Bayern		gelistet in den BQSM® ⁶⁾	
			trocken		frisch		Gesamt	1.	weitere					tro-cken	frisch		
			1.	1.–2.	1.	1.–2.											
			Schnitt/e														
tetraploide Sorten																	
Blizard	(T) FREU	16	+	+	(+)	+	+	+	(+)	(+)	0	(+)	mittel			✓	
Carbo	(T) BAYF	19	(+)	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	(+)	früh			✓	
Osmia	(T) FREU	21	(+)	+	+	++	+	+	+	+	+	+	sehr früh - früh				
Taifun	(T) STEI	04	(+)	(+)	(+)	0	0	(+)	0	0	(-)	**	mittel			✓	
Titus	(T) STEI	94	(+)	(+)	(+)	0	(+)	+	(+)	(+)	0	(+)	mittel			✓	

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

-  Grünlandmischungen
 Feldfutterbaumischungen
 Grünland- und Feldfutterbaumischungen
 Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM Mitte Süd				Ertrag TM ¹⁾			Winter- härte ^{1), 3)}	Mas- senb. im An- fang ¹⁾	Resis- tenz gegen Klee- krebs ^{1), 3)}	Blüh- beginn ¹⁾	Beratungs- gebiete Bayern		gelistet in den BQSM® ⁶⁾
							Ge- samt	1.	weitere					Schnitt/e		
			trocken	frisch												
			1.	1.-2.	1.	1.-2.										
diploide Sorten																
Loreley	NPZ	15	0	0	0	0	0	(+)	0	(+)	0	0	mittel			
Milvus	DSV	97	0	0	0	0	0	0	0	(+)	0	0	sehr früh - früh			✓
Nemaro ⁸⁾	STEI	86	(-)	(-)	(-)	(-)	0	0	(-)	0	(-)	0	früh - mittel			✓
Saphir	NPZ	15	0	0	0	0	0	(+)	0	(+)	0	0	mittel			
Semperina	DSV	15	0	0	0	(+)	0	0	(+)	(+)	0	0	früh			✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

-  Grünlandmischungen
 Feldfutterbaumischungen
 Grünland- und Feldfutterbaumischungen
 Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾			Massenb. im Anfang ¹⁾	Standfestigkeit ^{1), 3)}	Winterhärte ^{1), 3)}	Anbaugebiete					gelistet in den BQSM® ⁶⁾	
			Gesamt	1.	weitere				6	7	8	10	11		
				Schnitt/e											
Hornklee															
Bull	FREU	00	0	(+)	0	(+)	0	0	■	■	■	■	■	✓	
Lotella	FREU	19	(+)	0	+	(+)	(-)	0	■	■	■	■	■		
Marianne	FREU	17	(+)	(+)	0	(+)	(+)	0	■	■	■	■	■	✓	

Persischer Klee														
Felix	PETR	79	0	(-)	(+)	0	(+)		□	□	□	□	□	

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Ertrag TM ¹⁾ 1. Schnitt	Massenb. im Anfang ¹⁾	Standfes- tigkeit ^{1), 3)}	Blüh- beginn ¹⁾	Anbaugebiete				
							6	7	8	10	11
Alexandriner Klee											
Otto	PETR	15	(+)	0	0	spät	☐	☐	☐	☐	☐
Tabor	AGDR	10	+	+	-	sehr früh	☐	☐	☐	☐	☐
Winner	FREU	97	(-)	(-)	0	sehr spät	☐	☐	☐	☐	☐

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
AG 7: günstige Übergangslagen
AG 8: Hügelländer
AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
□ Feldfutterbaumischungen
■ Grünland- und Feldfutterbaumischungen
□ Keine Eignung
D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Anmerkungen zu den Tabellen

- 1) Einstufung nach "Beschreibender Sortenliste - Futtergräser, Esparsette, Klee, Luzerne" Ausgabe 2024; Hrsg: Bundessortenamt; erstellt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der Länder
- 2) Bewertung aus „BSA Beschreibende Sortenliste 2020 und 2022“, da keine oder zu wenig Daten in „BSA Beschreibende Sortenliste 2024“ vorhanden.
- 3) Gegenläufig zu Anfälligkeit gegen....
- 4) Maß für die regionale Ausdauer und Winterhärteleistung in Bayern
- 5) Mit D wird jeweils die diploide bzw. tetraploide Sorte einer Erntegruppe mit der höchsten Ausdauer gekennzeichnet (für Grünland wichtig). Mit E gekennzeichnete Sorten zeigen überdurchschnittliche Ertragsleistung. Ein Z weist auf sehr hohe Erträge zum 1. Schnitt hin (wichtig für den Zwischenfruchtanbau). Mit Q gekennzeichnete Sorten besitzen besonders hohe Resistenzeigenschaften (Qualitätssicherung).
- 6) Bayerische Qualitätssaatgutmischungen
- 7) Geringere Anfälligkeit für Bakterienwelke als vergleichbare zugelassene Sorten
- 8) Unter kontrollierten Bedingungen geringerer Befall mit Stängelnematoden (*Ditylenchus dipsaci*) als bei vergleichbaren mitgeprüften Sorten
- 9) kann späte Sorten ersetzen, wenn diese nicht verfügbar sind
- 10) vorläufige Einstufung nach Beschreibender Sortenliste Schweiz
- 11) Jahresertrag an 5 Schweizer Versuchsstandorten mit 4-5 Erhebungen (2013) bzw. 5 Erhebungen (2014)

(T) tetraploide Sorte

verwendete „Kreuzchen-Skala“ und die Bedeutung ihrer Abstufungen

+++	sehr gut, sehr spät, sehr stark, sehr lang
++	gut bis sehr gut, spät bis sehr spät, stark bis sehr stark, lang bis sehr lang
+	gut, spät, stark, lang
(+)	mittel bis gut, mittel bis spät, mittel bis stark, mittel bis lang
0	mittel
(-)	mittel bis schlecht, früh bis mittel, gering bis mittel, kurz bis mittel
-	schlecht, früh, gering, kurz
--	schlecht bis sehr schlecht, sehr früh bis früh, sehr gering bis gering, sehr kurz bis kurz
---	sehr schlecht, sehr früh, fehlend bis sehr gering, sehr kurz
**	keine oder zu wenig Daten vorhanden

Karte der Anbaubereiche



Bezeichnung Anbaubereiche

- ⊖ 6: sommertrockene Lagen
- ⊙ 7: günstige Übergangslagen
- ⊕ 8: Hügelländer
- ⊗ 9: Mittelgebirgslagen West
- 10: Mittelgebirgslagen Ost
- 11: Voralpengebiet
- ⊠ 12: Alpengebiet

Züchterabkürzungen mit Namen

Abkürzung	Züchter	Land
AGDR =	Agridera Seeds and Agriculture, Gedera	IL
BAHO =	Barenbrug Holding B.V., Oosterhout	NL
BAYF =	Bayerische Futtersaatbau GmbH, Ismaning	D
BAYP =	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, Freising	D
DLF =	Dansk Planteforaedling A/S, Store Heddinge	DK/NL
DSP =	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley	CH
DSV =	Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt	D
FREU =	Feldsaaten Freudenberger GmbH, Krefeld	D
ILVO =	ILVO-Plant-Toegepaste Genetica en Veredeling, Melle	B
JOUF =	Jouffray-Drillaud SA Conseil d' Administration, Cisse	F
NPZ =	Norddeutsche Pflanzenzucht KG, Holtsee	D
PETR =	Petersen Asmus, Lundsgaard	D
R2N =	R2n S.A.S. (Societe RAGT 2N), Rodez Cedex	F
RUDC =	Rudloff Christopher, Bad Schwartau	D
SMFR =	Semences de France, Paris	F
STEI =	Saatzucht Steinach, Steinach	D