



**LfL**

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

# Hopfen 2022

**Anbau**  
**Sorten**  
**Düngung**  
**Pflanzenschutz**  
**Ernte**



## **Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft**

Arbeitsbereich Hopfen Wolnzach – Hüll

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg,  
Karlsruhe und Außenstelle Tettngang

Landratsamt Bodenseekreis – Landwirtschaftsamt,  
Friedrichshafen

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Jena



## **Impressum**

Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)  
Vöttinger Straße 38, 85354 Freising-Weihenstephan  
Internet: [www.lfl.bayern.de](http://www.lfl.bayern.de)

Redaktion: Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Arbeitsbereich Hopfen  
Kellerstr. 1, 85283 Wolnzach  
E-Mail: [hopfenbau.wolnzach@lfl.bayern.de](mailto:hopfenbau.wolnzach@lfl.bayern.de)  
Telefon: 08161/8640-2400



1. Auflage: April 2022

Druck: Druckhaus Kastner, Schloßhof 2 - 6, 85283 Wolnzach

© LfL

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Statistik .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Witterung und Hopfenanbaugebiete.....</b>	<b>9</b>
2.1	Hallertau.....	10
2.2	Tettnang .....	11
2.3	Elbe-Saale.....	12
<b>3</b>	<b>Anbau .....</b>	<b>13</b>
3.1	Standortansprüche .....	13
3.2	Neuanpflanzung .....	13
3.3	Anlage und Pflege des Junghopfens.....	14
3.4	Frühjahrsarbeiten .....	19
3.5	Hopfenputzen.....	21
3.6	Bodenbearbeitung.....	24
3.7	Bewässerung und Fertigation.....	24
3.8	Zwischenfruchteinsaat.....	29
<b>4</b>	<b>Sorten.....</b>	<b>32</b>
4.1	Sortenwahl .....	32
4.2	Gute Klimaresilienz der neuen Hüller Zuchtsorten .....	32
4.3	Sorteneigenschaften auf einen Blick – Aromasorten.....	34
4.4	Sorteneigenschaften auf einen Blick – Bitter- und Hochalphasorten.....	37
4.5	Sorten privater Züchter.....	38
<b>5</b>	<b>Düngung.....</b>	<b>39</b>
5.1	Rechtliche Vorgaben bei der Düngung.....	39
5.1.1	Vor der Düngung .....	39
5.1.2	Bei der Düngung .....	41
5.1.3	Nach der Düngung .....	42
5.2	Besondere Regelungen in Baden-Württemberg.....	43
5.3	Besondere Regelungen im Anbaugebiet Elbe-Saale (TH, SN, ST).....	44
5.4	Stickstoffdüngung im Hopfen.....	45
5.5	Düngung mit Phosphat, Kali und Magnesium.....	47
5.6	Kalkdüngung .....	50
5.7	Schwefeldüngung.....	51
5.8	Düngung mit Spurenelementen.....	51
5.8.1	Zink .....	51
5.8.2	Bor.....	52

5.8.3	Bodendüngung von Spurenelementen .....	53
5.8.4	Blattdüngung von Spurenelementen .....	53
5.9	Organische Düngung .....	56
5.10	Gesteinsmehle, Bodenhilfsstoffe .....	57
5.11	Bodenuntersuchungen .....	57
5.11.1	Nmin-Untersuchung .....	58
5.11.2	Standardboden-Untersuchung .....	58
5.11.3	EUF-Methode .....	59
5.11.4	Ringwarte und Organisation der Probenahme .....	60
<b>6</b>	<b>Pflanzenschutz .....</b>	<b>61</b>
6.1	Gute fachliche Praxis und integrierter Pflanzenschutz .....	61
6.1.1	Integrierter Pflanzenschutz im Hopfen .....	61
6.1.2	Sachkundenachweis als Grundvoraussetzung.....	62
6.1.3	Pflanzenschutzgerätekontrolle .....	63
6.1.4	Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen .....	63
6.1.5	Zulassung und Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln.....	64
6.1.6	Einschränkungen seitens der Hopfenvermarkter.....	64
6.1.7	Sachgerechte Lagerung chemischer Pflanzenschutzmittel und Aufbrauchfrist .....	65
6.1.8	Import von Pflanzenschutzmitteln.....	65
6.1.9	Definition: Pflanzenschutzmittel.....	66
6.1.10	Definition: Grundstoffe.....	66
6.1.11	Definition: Pflanzenstärkungsmittel .....	66
6.1.12	Biostimulanzien .....	67
6.1.13	FiBL – Betriebsmittelliste.....	67
6.1.14	Offizielle Liste für PSM im ökologischen Landbau.....	68
6.1.15	Vermeidung von Gewässerverunreinigung beim Befüllen und Reinigen von Pflanzenschutzgeräten.....	68
6.1.16	Überbetrieblicher Einsatz von Pflanzenschutzgeräten (privat oder über Maschinenring).....	69
6.1.17	Ausbringung nur auf Nutzflächen (z. B. Hopfengärten) erlaubt.....	69
6.1.18	Reihen-/Bandbehandlung.....	70
6.1.19	Anwendungsbestimmungen/Auflagen .....	70
6.1.20	Leergutentsorgung 2022 (PAMIRA).....	75
6.1.21	Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel.....	76
6.1.22	Klassifikation der Wirkstoffe im Hopfen.....	77

6.1.23	Hinweise zur Mischbarkeit und Anwendung – Stand März 2022.....	79
6.1.24	Mischreihenfolge verschiedener PSM-Formulierungen.....	80
6.2	Schädlinge.....	81
6.2.1	Liebstöckelrüssler, Luzernerüssler.....	81
6.2.2	Hopfen-Erdfloh.....	81
6.2.3	Wildverbiss.....	82
6.2.4	Hopfenblattlaus.....	85
6.2.5	Gemeine Spinnmilbe (Rote Spinne).....	88
6.2.6	Gelegentlich auftretende Schädlinge.....	93
6.3	Krankheiten.....	94
6.3.1	Peronospora.....	94
6.3.2	Botrytis.....	100
6.3.3	Echter Mehltau.....	100
6.3.4	Stockfäule.....	101
6.3.5	Verticillium-Welke.....	104
6.3.6	Viruserkrankungen.....	105
6.3.7	Viroide.....	106
6.4	Hopfenputzen und Unkrautbekämpfung.....	107
6.5	Applikationstechnik.....	113
6.5.1	Spritztechnik zum Abspritzen (Bodenschädlinge, Hopfenputzen, Unkrautbekämpfung.....	113
6.5.2	Spritztechnik zum Sprühen.....	115
6.5.3	Spritztechnik Tettngang.....	122
6.5.4	Sensorsteuerung im Pflanzenschutz.....	123
6.5.5	Pflegen und Einwintern der Pflanzenschutzgeräte.....	124
<b>7</b>	<b>Ernte.....</b>	<b>124</b>
7.1	Erntetechnik.....	124
7.2	Erntezeitpunkt.....	126
7.3	Befruchteter Hopfen.....	127
7.4	Trocknung.....	127
7.5	Nutzung alternativer Energiequellen bei der Hopfentrocknung.....	132
7.6	Konditionierung.....	134
7.7	Neutrale Qualitätsfeststellung (NQF).....	137
7.8	Aktuelle Qualitätstabelle für deutschen Siegelhopfen – Fassung 2021.....	138
7.9	Rebenhäcksel.....	139
<b>8</b>	<b>Cross Compliance.....</b>	<b>140</b>

<b>9</b>	<b>Dokumentationssysteme für den Hopfenbaubetrieb .....</b>	<b>140</b>
9.1	Erfassungsbogen Pflanzenschutz .....	141
9.2	Erfassungsbogen Düngung .....	142
9.3	Bayerische Schlagkartei Hopfen .....	143
<b>10</b>	<b>Hopfenring e. V. – der Erzeugerring für Hopfen .....</b>	<b>147</b>
<b>11</b>	<b>Organisationen im Hopfenbau .....</b>	<b>153</b>


# 1 Statistik

Tab.: Hopfenanbau in Deutschland 2021

	Anbaufläche in ha		Betriebe		ha Hopfen / Betrieb	
	2021		2021		2021	2020
Hallertau	17 122	(- 111)	860	(- 20)	19,9	19,6
Spalt	400	(- 8)	46	(- 5)	8,7	8,0
Tettngang	1 494	(42)	125	(± 0)	12,0	11,8
Elbe-Saale	1 582	(18)	29	(± 0)	54,5	53,9
Baden-Bitburg- Rheinpfalz	22	(0)	2	(± 0)		
<b>Deutschland</b>	<b>20 620</b>	<b>(- 86)</b>	<b>1 062</b>	<b>(- 25)</b>	<b>19,4</b>	<b>19,0</b>

( ) Veränderung seit 2020

Quelle: Verband dt. Hopfenpflanzer



Quelle: Jahresbericht 2021 Sonderkultur Hopfen

Abb.: Durchschnittsertrag (Ztr. bzw. kg/ha) in Deutschland

Tab.: Bedeutende Hopfensorten in Deutschland 2021

	Hallertau		Spalt		Tettnang		Elbe-Saale		Ertrag* 2021 (kg/ha)	Alpha 2021 (%)	Alpha 10-jähr.Ø (%)
	Fläche 2021 (ha)	Verände- rung seit 2020	Fläche 2021 (ha)	Verände- rung seit 2020	Fläche 2021 (ha)	Verände- rung seit 2020	Fläche 2021 (ha)	Verände- rung seit 2020			
<b>Aromasorten (53,3 %)</b>	<b>51,2 %</b>		<b>88,3 %</b>		<b>78,3 %</b>		<b>44,0 %</b>				
Perle	2.886	- 1	37	2	127	24	272	10	2.085	9,0	7,0
Hall. Tradition	2.661	- 57	42	3	81	14	55	14	2.021	6,1	5,7
Hersbrucker Spät	815	- 83	6	- 1	0				1.769	4,6	2,7
Tettnanger					682	- 37			1.463	4,7	3,6
Hall. Mfr.	478	- 23	26	- 3	138	- 1	7	7	1.637	5,2	4,0
Spalter Select	444	- 48	86	- 5	23	1	4		2.095	6,4	4,6
Saphir	317	- 52	18	- 1	40	- 2	20	0	2.219	4,3	3,6
Northern Brewer	127	- 6				- 1	128	- 5	1.894	10,5	8,5
Mandarina Bavaria	205	- 40	3		11	0	10	- 8	2.292	9,9	8,1
Saazer	7	0					155	6	1.626		
Hallertau Blanc	127	- 13	3		13	0	6	- 5	2.350	9,9	9,2
Amarillo	127	- 29			8	0	10	- 5	2.609		
Opal	135	- 7	1		1	0			2.129	8,7	7,4
Spalter	1	1	107	- 6					1.490	5,2	3,7
Akoya	90	66			3	3	9	8			
Ariana	73	- 1	5		2	- 3			2.130		
Smaragd	58	- 6	1		14	- 3			2.108	7,6	5,3
Huell Melon	54	- 28	5		10	0	2	- 8	2.072	8,4	6,5
Cascade	48	- 13	4	0	2	- 1	8	0	2.248		
Callista	44	- 4	1		8		9	5	2.115		
Sonstige	66	- 2	9	3	5	0	0	0			
<b>Σ</b>	<b>8.764</b>	<b>- 342</b>	<b>353</b>	<b>- 10</b>	<b>1.169</b>	<b>- 4</b>	<b>696</b>	<b>18</b>			
<b>Bittersorten (46,7 %)</b>	<b>48,8 %</b>		<b>11,7 %</b>		<b>21,7 %</b>		<b>56,0 %</b>				
Herkules	6.499	245	38	2	294	12	137	- 1	2.942	18,5	16,5
Hall. Magnum	1.234	- 56	2	- 1			621	- 1	2.272	16,0	13,4
Polaris	291	75			27	8	119	13		21,5	19,7
Hall. Taurus	165	- 31	1		0	0	3	- 11	2.156	17,8	16,0
Nugget	107	- 10					4	- 1	2.425	11,1	10,8
Sonstige	61	8	5	1	3	0	2	1			
<b>Σ</b>	<b>8.358</b>	<b>231</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>325</b>	<b>19</b>	<b>886</b>	<b>0</b>			
<b>Gesamtfläche</b>	<b>17.122</b>	<b>- 111</b>	<b>400</b>	<b>- 8</b>	<b>1.494</b>	<b>15</b>	<b>1.582</b>	<b>18</b>	<b>2.321</b>	<b>13,0</b>	

\* Ertrag = abgewogene Hopfenmenge / Gesamtfläche Quelle: Verband deutscher Hopfenpflanzer; Jahresbericht - Sonderkultur Hopfen der LfL; AG Hopfenanalytik



## 2 Witterung und Hopfenanbaugebiete




Abb.: Witterung Hüll 2021 im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt

### Witterungsrückblick Hallertau 2021

Das Hopfenjahr 2021 startete mit kalten Temperaturen aber unter trockenen Bedingungen, so dass alle Feldarbeiten im März und April auf abgetrockneten Böden termingerecht erledigt werden konnten. Der Austrieb und das Wachstum des Hopfens setzten aber nur sehr zögerlich ein. Mit dem Ausputzen und Anleiten der Hopfentriebe konnte daher erst Anfang Mai begonnen werden und die Arbeiten zogen sich sorten- und lagebedingt bis Ende Mai hin. Überdurchschnittliche Niederschläge im Mai und kühle Temperaturen verzögerten notwendige Pflegemaßnahmen wie das Ackern und Hopfenputzen. Der Juni war zwar überdurchschnittlich warm, konnte aber den Wachstumsrückstand, der bisweilen 14 Tage betrug, nicht entscheidend aufholen, so dass die Blüte etwa eine Woche später begann. Da auch der Juli und August kühl und nass waren, ließ sich der Hopfen mit der Ausdoldung Zeit und der Beginn der Erntereife war mit Anfang September sehr spät. Warmes und trockenes Erntewetter ab

September beschleunigte schließlich die Abreife.

Von den Starkniederschlagsereignissen des Sommers 2021, die in weiten Teilen Deutschlands und Bayern größere Verwüstungen und Schäden verursachten, blieb die Hallertau und der Hopfen weitgehend verschont. So waren nur lokal größeren Erosionsschäden zu verzeichnen. Insgesamt fielen während der Vegetationsperiode des Hopfens von März bis August am Standort Hüll über 150 mm mehr Niederschlag als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre, wobei es in der nördlichen Hallertau in den Monaten Juli und August wiederum etwa 100 mm weniger regnete als in der südlichen Hallertau. Die Bodenfeuchte war aber überall ausreichend, so dass der Hopfen dieses Jahr nicht unter Trockenstress litt und sehr gute Erträge und Inhaltsstoffe bescherte. Auf stau-nassen und schweren Böden in der südlichen Hallertau, wo die Wassermengen nicht abfließen konnten, zeigte der Hopfen sogar Symptome von Sauerstoffmangel aufgrund zu nasser Bodenverhältnisse.

2.1 Hallertau

## Hopfenflächen nach Gemeinden in der Hallertau




Abb.: Peronospora-Sporenfallen und Wetterstationen in der Hallertau

## 2.2 Tettngang





Abb.: Witterung Tettngang-Strass 2021 im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt

## Hopfenanbaugebiet Tettngang



### Standorte der Peronospora-Prognosestationen

- 1 Vorderreute
- 2 Tettngang – Kau
- 3 Holzhäusern
- 4 Kressbronn

Abb.: Standorte der Peronospora-Prognose-Stationen im Hopfenanbaugebiet Tettngang

2.3 Elbe-Saale




Abb.: Witterung Dornburg 2021 im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt




Abb.: Hopfenbetriebe im Anbauggebiet Elbe-Saale

## 3 Anbau

### 3.1 Standortansprüche

#### Klima

Hopfen wächst in den gemäßigten Klimazonen zwischen dem 35. und 55. Breitengrad. Als ursprüngliche Aupflanze stellt er hohe Ansprüche an die Wasserversorgung. Niederschläge in den Sommermonaten Juni, Juli und August von je 100 mm und mehr versprechen hohe Erträge. Ein regnerischer Sommer mit mäßigen Temperaturen steigert zudem den wertbestimmenden Inhaltsstoff, die Alphasäuren.

#### Boden

Die Wahl eines geeigneten Standortes ist die erste Voraussetzung für einen ertragreichen Hopfengarten. Der Hopfen verlangt einen gut durchwurzelbaren, tiefgründigen Boden mit guter Wasserführung. Da der Hopfengarten sehr oft befahren werden muss, ist auch die Befahrbarkeit wichtig. Diese Voraussetzungen sind auf leichten Böden besser erfüllt als auf schweren Böden. Auch erwärmen sich leichte Böden besser.

Ertragsermittlungen in der Hallertau haben ergeben, dass auf leichteren Böden (lehmi-ger Sand) die Hopfenerträge über lange Jahre um 12 % höher waren als auf schweren Böden. Auf staunassen Böden und solchen, die zu Verdichtungen neigen, sollte deshalb kein Hopfengarten angelegt werden. Wer die Möglichkeit hat, wird auf leichtere Böden ausweichen, wobei jedoch auch kiesige und reine Sandböden für den

Hopfenanbau wegen mangelnder Wasserversorgung nur wenig geeignet sind, es sei denn, die Wasserversorgung ist durch künstliche Bewässerung gesichert.

#### Lage

Bei der örtlichen Lage ist vor allem die Hangneigung wichtig. In stark geneigten Hopfengärten ist die Abschwemmgefahr sehr groß, auch erhöht sich die Unfallgefahr bei Arbeiten mit der Kanzel. Bei der Anlage eines Hopfengartens soll deshalb folgendes beachtet werden:

- Ein Hopfengarten soll bevorzugt auf ebener oder nur wenig geneigter Fläche angelegt werden.
- Auf flachen und gleichmäßig geneigten Hängen sollen die Bifänge quer zum Hang angelegt werden, soweit es die Grundstücksform zulässt.

Auf stärker geneigten Hängen ist es günstiger, die Bifänge in der Falllinie anzulegen. Hier müssen aber Erosionsschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die Erosion ist umso größer, je steiler der Hang und je länger die Bifänge sind. Bei großen Schlägen ist deshalb eine Unterbrechung der Reihen mit 3-5 m breiten Grasstreifen vorzunehmen. Zusätzlich ist zur Verminderung der Erosion eine Zwischenfrucht einzusäen und das Vorgewende dauerhaft zu begrünen.

### 3.2 Neuanpflanzung

Seit dem 01.08.2019 darf in Bayern entlang von Gewässern ein 5 m breiter Streifen nicht mehr garten- und ackerbaulich genutzt werden (5 m bis zur Uferlinie). Dieses Nutzungsverbot wurde im Zuge des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit – Rettet die Bienen“ ins Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSch) aufgenommen. Eine ähnliche Verpflichtung zur Anlage von begrünten Uferrandstreifen

findet sich auch im Bundes-Wasserhaushaltsgesetz.

#### Standraum

Standard sind heute Großraumanlagen mit Doppelstockaufleitung. Als Reihenabstand hat sich in Bayern 3,20 m bewährt, im Anbaugebiet Elbe-Saale beträgt er 3 m. Beim alten Tettlinger Pflanzsystem empfiehlt sich ein Reihenabstand von 1,5-1,6 m mit Spritzgassen nach jeder 6. Reihe.

**Wassergesetz Baden-Württemberg**

Zu Gewässern von wasserwirtschaftlicher Bedeutung ist bei Neuerrichtung von baulichen Anlagen (u. a. Anker, Pfähle,

Gerüst, ...) und der Anpflanzung nicht standortgerechter Bäume und Sträucher ein Mindestabstand von 10 m zur Böschungsoberkante einzuhalten.

Tab.: Pflanzabstände in der Reihe

Sorten		Pflanzabstand in der Reihe
<b>Aromahopfen</b>	Ariana	1,5 – 1,6 m
	Aurum	1,4 – 1,5 m
	Callista	1,4 – 1,6 m
	Cascade	1,4 – 1,6 m
	Diamant	1,4 – 1,5 m
	Hallertau Blanc	1,5 – 1,6 m
	Hallertauer Mfr.	1,4 m
	Hallertauer Tradition	1,4 - 1,5 m
	Hersbrucker Spät	1,6 - 1,7 m
	Huell Melon	1,4 - 1,6 m
	Mandarina Bavaria	1,4 - 1,5 m
	Northern Brewer	1,3 - 1,4 m
	Opal	1,4 - 1,5 m
	Perle	1,4 - 1,5 m
	Saazer	1,4 - 1,5 m
	Saphir	1,4 - 1,5 m
	Smaragd	1,4 - 1,6 m
	Spalter	1,4 - 1,5 m
Spalter Select	1,5 - 1,6 m	
Tango	1,5 – 1,6 m	
Tettnanger	1,4 - 1,5 m	
<b>Bitterhopfen</b>	Hallertauer Magnum	1,5 - 1,6 m
	Hallertauer Taurus	1,4 - 1,5 m
	Herkules	1,5 - 1,6 m
	Nugget	1,5 - 1,7 m
	Polaris	1,4 - 1,5 m

**3.3 Anlage und Pflege des Junghopfens****Rodung von Althopfen**

Sorgfältiges mechanisches Roden mit Rodeschar (Säulenbifang nicht möglich), Schnecke oder Fräse. Rodetiefe an Sorte und Standorte anpassen. Zur Vermeidung der Verschleppung von *Verticillium*-Welke, Virosen und Viroiden Hygienemaßnahmen beim Feldwechsel beachten!

**Bodengesundung**

Zur Reduzierung von Krankheiten und Viren auf durchgewachsenen Hopfentrieben sollte ein hopfenfreies Jahr eingeplant werden. Bei Befall mit der aggressiven (letalen) Rasse des bodenbürtigen Pilzes *Verticillium nonalfalfae* (alte Bezeichnung: *Verticillium albo-atrum*) sollte die Anbaupause sogar 5 Jahre betragen. In dieser Zeit sollten auf der Fläche nur einkeimblättrige Pflanzen, wie z. B. Getreide, Mais oder Gräser angebaut werden (Quarantänefruchtfolge). Die Einsaat von neutralen

Fruchtarten, wie z. B. Getreide oder Klee-gras erhöht die Bodenfruchtbarkeit.

### **Bodenvorbereitung vor der Pflanzung**

- Aufwuchs von Stilllegungsflächen mulchen und zur Verhinderung des Wiederaustriebs bei Bedarf Pflanzenschutzmaßnahmen mit der Indikation „Einsatz auf Stilllegungsflächen zur Rekultivierung“ vor der Einarbeitung vornehmen
- Pflugfurche im Herbst (CC-Auflagen beachten!)

### **Pflanzung**

- Pflanzreihen in feinkrümeligen Bodenzustand bringen
- Pflanzfurche im Frühjahr anlegen: Versuche haben gezeigt, dass bei tieferem Einlegen kräftigere Stöcke entstehen. Es wird deshalb empfohlen Pflanzlöcher mit einer Tiefe von ca. 25 cm in die vorher gezogene Furche zu machen.

### **Pflanzgut**

Zum Aufbau gesunder Bestände und bei der Einführung neuer Hopfensorten ist der Hopfenbetrieb gezwungen Pflanzgut zuzukaufen bzw. aus Praxisbeständen anderer Betriebe in den eigenen Betrieb zu holen. Bei nicht kontrolliertem Pflanzgut besteht die Gefahr, Krankheiten wie z. B. Virose, Viroide oder *Verticillium*-Welke in den Betrieb einzuschleppen, die zu massiven Ertragsverlusten bzw. zur Infektion in allen Hopfenbeständen des Betriebes führen können. Der Bodenzpilz *Verticillium nonalfalfae* konnte durch Mutationen seine Virulenz steigern. Durch diese letalen (aggressiven) Formen sind die Toleranzen gegen die milden Formen des Erregers der Hopfenwelke gebrochen, so dass auch bisher tolerante Hopfensorten von der Welke befallen werden können. Die gesetzlichen Bestimmungen verpflichten zur Kontrolle. Pflanzgut darf nur von Betrieben abgegeben werden, deren Flächen bekanntermaßen frei von *Verticillium*-Welke sind und dies mit dem Pflanzenpass bestätigen können.

Alle Züchtungs- und Vermehrungsverfahren müssen mit dem Ziel der Erzeugung von gesundem Pflanzmaterial neu geordnet werden. Bei der Vermehrung von Pflanzgut zum Eigenbedarf ändert sich in den Praxisbetrieben nichts. Wenn Pflanzgut aus dem eigenen Betrieb abgegeben, d. h. in den Verkehr gebracht wird, müssen die Pflanzengesundheitsbestimmungen eingehalten werden.

### **Vollzug der Pflanzengesundheitsverordnung (Pflanzenpass)**

Der Pflanzenpass ist die Voraussetzung, um Vermehrungsmaterial in Verkehr bringen zu können. Er beinhaltet keine Virusuntersuchung.

Seit dem 14.12.2019 sind die Kontrollverordnung (EU) 2017/625 und die Pflanzengesundheitsverordnung (EU) 2016/2031 über Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen in Kraft getreten. Ziele der Regelungen sind die Vereinheitlichung der Kontrollverfahren und -anforderungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Veterinärkontrolle, Pflanzengesundheit und ein verbesserter Schutz der Union vor Einschleppung und Verbreitung von besonders gefährlichen Pflanzenkrankheiten und -schädlingen durch gemeinsame Kontrollstandards und bessere Rückverfolgbarkeit.

### **Vollzug in Bayern**

1. Betriebe, die Fehser abgeben wollen, müssen sich einmalig durch die LfL, Institut für Pflanzenschutz, Lange Point 10, 85354 Freising registrieren lassen. Der Registrierantrag steht auf der Homepage der LfL – Institut für Pflanzenschutz – Pflanzengesundheit und Quarantäne – Registrierung von Unternehmern (gemäß Art. 65 Pflanzengesundheitsverordnung 2016/2031).

Link: <https://lfl.bayern.de/ips/pflanzengesundheit/224407/index.php>



Flächen bzw. Sorten, von denen im kommenden Frühjahr Schnittfechser abgegeben bzw. Topf- oder Wurzelfechser zum Verkauf aufgeschult werden, müssen **jährlich bis spätestens 30.04.** (Ausschlussfrist) an o. g. Adresse oder per Mail an [pflanzenpass@lfl.bayern.de](mailto:pflanzenpass@lfl.bayern.de) gemeldet werden.

2. Hopfenfechser dürfen nur mit einem Pflanzenpass abgegeben werden. Der Pflanzenpass ist ein Etikett auf einem bedruckbaren Träger (z. B. Etikett, Lieferschein etc.). Der Pflanzenpass muss deutlich von allen anderen Informationen (z. B. Qualitätsangaben) abgegrenzt sein und muss folgende Angaben enthalten:

- die Flagge der EU in Farbe oder in Schwarz-Weiß (in der oberen linken Ecke)
- Pflanzenpass/Plant Passport (in der oberen rechten Ecke)
- **A** botanischer Name der betreffenden Pflanzenart
- Sortenname (optional)
- **B** Registriernummer des Unternehmers
- **C** Rückverfolgbarkeitscode
- **D** Ursprungsland (Zwei-Buchstaben-Code des Ursprungslandes, z. B. DE für Deutschland)

3. Die Abgabe muss dokumentiert werden und wird im Rahmen von Betriebskontrollen überprüft.

Generell gilt:

- Nur von der LfL registrierte Betriebe sind zur Ausstellung eines Pflanzenpasses berechtigt. Diese Betriebe verfügen über eine amtliche Registriernummer.
- Jeder registrierte Betrieb darf selbstentscheiden, wie sich der Rückverfolgbarkeitscode zusammensetzt. Z. B. kann die FID-Nr. oder auch die Feldstücksbezeichnung verwendet werden.
- Der ermächtigte Unternehmer kontrolliert die passpflichtigen Pflanzen gründlich insbesondere auf

Quarantäne- und geregelte Nicht-Quarantäneschadorganismen und die pflanzengesundheitlichen Anforderungen. Die Betriebe sind für die Kontrolle des Vermehrungsmaterials selbst verantwortlich. Sie sind zur Dokumentation dieser Kontrollen verpflichtet. Der Pflanzenschutzdienst überprüft regelmäßig die Einhaltung der Anforderungen in den Betrieben.

- Im Verdachtsfall auf *Verticillium* muss der Betrieb eine Untersuchung des Pflanzenmaterials kostenpflichtig veranlassen.
- Unabhängig vom Verdacht auf CBCVd müssen je Sorte pro angefangenem ha 30 Mutterpflanzen auf CBCVd untersucht werden. Die Kosten dafür trägt der Vermehrungsbetrieb.
- Bei einem positiven Untersuchungsergebnis auf *Verticillium* oder auf CBCVd ist eine Fechserentnahme zur Inverkehrbringung ausgeschlossen.
- Eine **Virus**untersuchung ist **nicht** Bestandteil des Pflanzenpasses.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Homepage der LfL Institut für Pflanzenschutz – Pflanzengesundheit und Quarantäne – Pflanzen-Handel im EU-Binnenmarkt.

<https://lfl.bayern.de/ips/pflanzengesundheit/024692/index.php>



### Vollzug in Baden-Württemberg

Betriebe, die sich registrieren lassen wollen, melden dies bis spätestens Mitte Mai beim Hopfenpflanzerverband Tettnang an. Von dort erfolgt die Weitergabe der Daten an das Regierungspräsidium Tübingen. Bis Ende Juni müssen die betrieblichen Flurstückslisten vorgelegt werden. Die Kontrolle der Bestände erfolgt durch den Pflanzengesundheitsdienst des Regierungspräsidiums Tübingen vor der Ernte im Zeitraum vom 05. – 20. August.



## Pflanzgutuntersuchung auf Virose (Ausstellung von Zertifikaten A u. B)

### Fechser mit Zertifikat A

Virusfreies Qualitätspflanzgut mit Zertifikat A bietet bei der Einführung neuer Sorten die besten Voraussetzungen für stabile und hohe Erträge. Aber auch zur langfristigen Erhaltung von positiven Sorteneigenschaften (Sortenreinheit, Gesundheit, Ertrag und Qualität) ist es immer wieder erforderlich Qualitätspflanzgut zuzukaufen. Bestes Beispiel hierfür sind die Sorten Perle und Hall. Tradition. Mit der Erhaltungszucht dieser Sorten konnten in der Praxis wieder höhere Erträge und Alphasäuregehalte erzielt werden. Dieses Fechsermaterial ist auch eine wichtige Grundlage zur innerbetrieblichen Vermehrung.

- Anforderungen bei Zertifikat A: Qualitätspflanzgut; frei von Apfel-Mosaik-Virus (ApMV) und Hopfen-Mosaik-Virus (HpMV); aus dem Gewächshaus; bewurzelt in hygienisierter Erde.

Diese Fechser weisen eine gute Wüchsigkeit auf. Sie können nur über die lizenzierten Vermehrungsbetriebe (Eickelmann, Geisenfeld, Tel. 08452/8851, Landwirtschaftsbetrieb Grosser, Coswig OT Neusörnwitz, Tel. 01775628506, Elsner pac Vertriebsgesellschaft mbH, Dresden, Tel. 035248/39910 und AG Naundorf-Niedergoseln, Tel. 03435/920194) bezogen werden. Es ist eine Frühjahrs- oder Herbstlieferung möglich, wobei nur bei rechtzeitiger Bestellung eine termingerechte Lieferung garantiert werden kann.

### Fechser mit Zertifikat B

Für Landwirte besteht die Möglichkeit, für neu mit Zertifikat A bepflanzte Flächen ein Zertifikat B zu beantragen.

- Anforderungen bei Zertifikat B: Qualitätspflanzgut als Schnitffechser; 10 % der Stöcke virusgetestet auf Apfel-Mosaik-Virus (ApMV); Bestandkontrolle durch den Hopfenring auf Anzeichen von Welke, Virus und Hopfendurchwuchs; Peronospora Primärinfektion unter 1 %.

## Pflanzgutuntersuchung auf Viroide (CBCVd und HSVd)

Mit der Aufnahme von CBCVd in die EU-Verordnung 2019/2072 Ende des Jahres 2021 sind nur noch Auflagen zur Verbreitung über Pflanzgut gesetzlich geregelt. Von CBCVd betroffene Betriebe dürfen kein Pflanzgut erzeugen. Zur Vermehrung angemeldete Flächen müssen aufgrund der Verordnung 2019/2072 auf CBCVd untersucht werden.

Die Mutterpflanzen des Vermehrungsbetriebs Eickelmann werden regelmäßig hinsichtlich ihrer CBCVd-Freiheit untersucht. Wie die Pflanzgutuntersuchung auf Vermehrungsflächen im Jahr 2022 durchgeführt wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt. Es folgen ergänzende Informationen im Beratungsfax. Aktuell ist kein Fall von HSVd im deutschen Hopfenbau bekannt.

## Arten der Fechsererzeugung

### Schnitffechser

- müssen einen glatten Schnitt aufweisen
- Knospenansätze (Augen) sollten noch klein sein
- sollten zwei gesunde Augenkränze aufweisen
- Fechser von Junghopfenbeständen sind wegen der besseren Wüchsigkeit zu bevorzugen
- müssen möglichst sofort nach dem Schneiden gepflanzt werden
- sind bei Zwischenlagerung mit feinkrümeliger Erde oder Sand-Torf-Gemisch (1:1) abzudecken
- dürfen ohne Erdatdeckung nicht gewässert werden

### Topffechser

sind eingetopfte Schnitt- oder Wurzelfechser.

- ermöglichen die größte Fechserausbeute
- Augenansätze sollten noch klein sein
- Fechser müssen sofort verarbeitet werden

- Fehser nicht zu groß schneiden, da die Augenansätze unter die Erde müssen
- ausreichende Topfgröße beachten
- mit Langzeitdünger versetzte Pflanzern verwenden, da der Düngervorrat bis zur Auspflanzung ausreicht
- auf geschützter Fläche im Freien aufstellen
- Vliesabdeckung reicht als Schutz bei kühlen Witterungsphasen
- zu lange Triebe über dem zweiten oder dritten Blattpaar einkürzen, da das Wurzelwachstum angeregt wird
- feuchtes Mikroklima und langsamer Austrieb fördern Peronospora Primärbefall
- mehrmalige Spritzung mit systemischen Peronospora Präparaten ist notwendig
- zusätzlich ist mindestens eine Spinnmilbenbehandlung einzuplanen
- bei ausreichender Durchwurzelung des Topfes (Anfang – Mitte Mai) ins Freiland auspflanzen

Es ist darauf zu achten, dass sie vor dem Auspflanzen ordentlich befeuchtet (gewässert) werden und bei Verwendung von Torftöpfen diese aufgerissen werden. Topf-fehser eignen sich gleichermaßen für die Bestandsgründung als auch für die Erzeugung von Wurzelfechsern.

### **Wurzelfechser**

sind Schnittfehser oder Topffehser, die auf einem Ackergrundstück über eine Vegetationsperiode vorgeschult werden.

- leichte Böden sind am besten geeignet
- die bewurzelten zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, die verbraucht werden sollen, wurden von Hopfenbeständen zur Hopfenerzeugung unter Einhaltung eines Abstandes von mindestens 20 m isoliert.
- Schnittfehser sofort nach dem Schnitt auspflanzen
- nicht zu eng pflanzen (mind. 15-20 cm Abstand)

- ordnungsgemäßer Pflanzenschutz bis zum Herbst notwendig
- Auspflanzung der Wurzelfechser im Herbst ist möglich
- garantieren den besten Anwuchserfolg
- nur ausreichend große Fehser sollten geteilt werden
- hohe Ausbeute für die Erzeugung von Topffehsern

Die Erzeugung von Wurzelfechsern bedeutet zwar Mehrarbeit, bringt aber bereits im ersten Jahr der Anpflanzung einen Teilertrag und einen gleichmäßigen Bestand. Bei zu früher Beerntung sind deutlich negative Auswirkungen auf die Bestandsentwicklung und den Ertrag im Folgejahr zu erwarten.

### **Pflege**

- Abdeckung der Pflanzstellen mit Mulchmaterial oder Kompost (ca. 1-2 cm Schichtdicke)
  - Schutz vor Frost, Austrocknung oder Verschlammung
- Schutz der Jungpflanzen vor Verbiss durch Wildtiere mit Wuchs- und Verbissschutzhüllen oder durch den Einsatz eines Vergrämungsmittels (z. B. Trico, Aminosol). (siehe auch Kapitel Pflanzenschutz -> Wildverbiss)
- Aufleitung von mind. 1,50 m Höhe mit Draht oder (Akazien-) Pflöcken
  - erhöht die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmaßnahmen
- Freihalten von Unkräutern und Ungräsern durch Kreiseln und Anackern
- Bewässerung fördert die Entwicklung und Ertragsbildung
  - Tröpfchenbewässerung verringert die Verschlammung
- Anackern
  - erleichtert Schnitt im Folgejahr
- Schneiden
  - im 1. Ertragsjahr nicht zu tief schneiden. Die endgültige Schnitttiefe wird im 2. Ertragsjahr festgelegt

## Düngung

Zu frühe oder zu hohe Düngergaben können bei Neuanpflanzungen zu Schäden führen. In der Regel enthalten die Pikierenden von Topfpflanzen Langzeitdünger und brauchen somit vorerst nicht gedüngt werden.

Bei sichtbarem Nährstoffmangel ist eine Flüssigdüngergabe mit einem wasserlöslichen Mehrnährstoffdünger möglich (z.B. Hakaphos blau 15/11/15/2; 0,5-1,0 l/Stock mit 0,5-1 %iger Düngerlösung).

Ansonsten ist die erste Düngung des Junghopfens bei Beginn des Wachstums (bei Schnitffechsern meist Ende Juni) erforderlich. Dazu werden 5-7 kg N pro 1000 Stöcke (z. B. 0,25 dt Kalkammonsalpeter) auf ein ca. 1 m breites Band gestreut. Zur Vermeidung von Ätzschäden ist ein Ankreiseln oder Anackern vor der Düngergabe notwendig, damit die Pflanzmulde eingeebnet ist und der Dünger in der Mulde nicht zusammenlaufen kann.

Eine weitere Düngergabe kann bei kräftiger Entwicklung des Junghopfens (z. B. bei Verwendung von Wurzelfechsern) Ende Juli in gleicher Höhe ausgebracht werden. Eine Phosphat- bzw. Kalidüngung ist nur bei geringer bis mittlerer Versorgung des Bodens erforderlich.

## Pflanzenschutz

Bodenschädlinge stellen eine große Gefahr für den Junghopfen dar und sollten bei Befall bekämpft werden. Drahtwurm, Liebstockelrüssler und Erdfloh können ab Ende März auftreten. Vorsicht mit Anwendungen bei Nachtfrostgefahr!

## 3.4 Frühjahrsarbeiten

### Schneiden

Das Hopfenschneiden im Frühjahr erfüllt folgende Funktionen:

- Bekämpfung von Schaderregern (Peronospora, E. Mehltau, Spinnmilbe)
- Verjüngung des Stockes
- Steuerung des Austriebs
- Mechanische Unkrautbekämpfung
- Fehsergewinnung

Besonders wichtig ist auch eine regelmäßige Kontrolle und gezielte Bekämpfung von **Peronospora, Echten Mehltau, Blattläusen und Spinnmilben**. Systemische Mittel sind hier zu bevorzugen! Nicht abgeernteter Junghopfen bleibt im Herbst meist bis Ende Oktober stehen. In dieser Zeit kann der Junghopfen noch von Krankheiten und Schädlingen befallen werden, die im Stock oder auf Pflanzenresten überwintern und im Frühjahr bereits Schäden am Neuaustrieb verursachen. Bestandskontrollen und chemische Bekämpfungsmaßnahmen bis in den Herbst hinein werden daher dringend empfohlen.

### Ernte

Zur Einlagerung von genügend Reservestoffen soll Junghopfen im Herbst lange stehen bleiben. Junghopfen aus Schnitffechsern soll deshalb möglichst gar nicht und Junghopfen aus Wurzelfechsern spät geerntet und dabei hoch abgeschnitten werden, damit zur Reservestoffeinlagerung noch aktive Blattetagen verbleiben.

**Weitere Hinweise finden Sie in dem LfL-Kompendium zur Vermehrung von Hopfenfechsern und Kultivierung von Junghopfen auf der Internetseite des Hopfenrings**

<https://www.hopfenring.de/aktuelles/fehserboerse/>



Der Schnitt sollte glatt sein, um den Wundverschluss zu beschleunigen. Gesunde Schnittflächen sind weiß. Verbräunungen der Schnittflächen deuten auf Stockfäule hin.

Herbstschnitt ist nicht zu empfehlen. Ein vorzeitiger Schnitt im Frühjahr kann insbesondere bei den Sorten Hallertauer Mfr. und Magnum zu einer vorgezogenen Blüte mit niedrigeren Erträgen führen.

Neue Kombigeräte ermöglichen das Wegackern und Schneiden in einem Arbeitsgang.

Vorteile:

- Arbeitszeiterparnis
- weniger Bodenverdichtung

- bessere Bodenstruktur
- gute Befahrbarkeit im Herbst u. Winter
- bessere Überwinterung des Stockes
- Erosionsschutz

Tab.: Schneidzeitpunkt


bis Mitte März	Ende März	Ende März bis Anfang April	Anfang bis Mitte April
Hall. Tradition Hall. Taurus Northern Brewer Opal Perle Polaris Saphir	Ariana Aurum Brewers Gold Cascade Diamant Hall. Magnum Herkules Hersbrucker Spät Huell Melon Mandarina Bavaria Smaragd Tango	Callista Hallertau Blanc Nugget Spalter Select	Hallertauer Mfr. Saazer Spalter Tettnanger

Tab.: Reaktion auf tiefes Schneiden

keine Reaktion	mittel	empfindlich
Brewers Gold Hersbrucker Spät Saazer Spalter Spalter Select Tettnanger	Ariana Aurum Callista Cascade Diamant Hallertauer Blanc Hall. Magnum Hallertauer Mfr.	Huell Melon Mandarina Bavaria Nugget Opal Polaris Saphir Smaragd Tango

**Schnitttiefe**

Zur günstigeren Entwicklung des Stockes ist auch die richtige Schnitttiefe wichtig. In Abhängigkeit von der Bodenart sollten alle Sorten gleich tief eingelegt werden. Beim jährlichen Schnitt ist die optimale Schnitttiefe beizubehalten. Wird zu hoch geschnitten, wächst der Stock mit der Zeit nach oben. Bei zu tiefem Schnitt reagiert die Pflanze je nach Sorte mit unzureichendem Austrieb und schlechtem Wachstum. Die unterschiedliche Reaktion der verschiedenen Sorten auf zu tiefes Schneiden ist in der vorangegangenen Tabelle dargestellt.



zu hoch  
optimal  
zu tief

Abb.: Optimale Schnitttiefe

**Aufleitwinkel**

Versuche haben gezeigt, dass ein schräger Aufleitwinkel meist nur Mehrarbeit beim Nachleiten, aber keinen Mehrertrag bringt.

**Ausputzen und Anleiten**

Das Kreiseln, zur Erleichterung des Ausputzens, sollte möglichst flach erfolgen,

**3.5 Hopfenputzen**

Aus dem Hopfenstock treiben immer wieder neue Triebe aus. An diesen Bodentrieben und den bodennahen Blättern und Seitentrieben entsteht ein günstiges Mikroklima für Krankheiten und Schädlinge. Zum Teil sind die Bodentriebe bereits mit *Peronospora* (Bubiköpfe) und Echten Mehltau infiziert. Das Entfernen der Bodentriebe, der unteren Blätter und Seitentriebe ist deshalb eine wichtige Maßnahme zur Verringerung des Befallsdruckes mit *Peronospora*, Echten Mehltau und Spinnmilben und kann manche Pflanzenschutzmaßnahme einsparen.

**Hopfenputzen mit Nährlösungen**

In der Praxis hat sich zum 1. Hopfenputzen das Bespritzen der bodennahen Blätter und Triebe mit **Nährstofflösungen** bewährt. Diese können solo oder in Kombination mit Herbiziden oder organischen Säuren ausgebracht werden. Sonnenschein und trockene Witterungsbedingungen fördern die Wirkung. Die Behandlung kann ab 2 m Wuchshöhe der angeleiteten Reben durchgeführt werden.

Pro Hektar werden mit den verschiedenen Spritzlösungen folgende Nährstoffmengen ausgebracht:

**Nährstoffgehalt:**

100 kg AHL	= 28 kg N
100 l AHL	= 36 kg N
100 kg InnoFert Hopfen	= 15 kg N
100 l InnoFert Hopfen	= 18 kg N
100 kg MgCl <sub>2</sub> -Lös. (30 %ig)	= 13 kg MgO
100 l MgCl <sub>2</sub> -Lös. (30 %ig)	= 16 kg MgO
100 kg schwefels. Ammoniak	= 21 kg N

damit eine Beschädigung der Wurzelsysteme vermieden wird.

Versuche bei den Sorten Hersbrucker Spät, Spalter Select und Hall. Magnum haben ergeben, dass mehr als 2 Triebe pro Aufleitdraht keinen Mehrertrag brachten, wohl aber die Mehltauanfälligkeit durch die dichtere Belaubung erhöht wird.

Die in den Spritzlösungen enthaltenen Nährstoffe sind i. d. R. weniger düngewirksam als gestreute Mineraldünger, müssen aber **bei der Düngung zu 100 % angerechnet werden**.

**Empfohlene Nährlösungen****AHL**

Dichte: 1280 kg/m<sup>3</sup>

Das Ackern sollte erst nach 8-10 Tagen nach der Anwendung erfolgen. Stickstoff greift Metall an. Deshalb sollte die Spritze sofort nach der Arbeit gereinigt werden!

**Schwefelsaures Ammoniak (SSA)**

SSA muss vor dem Befüllen des Spritzfasses in Wasser aufgelöst werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Vorgang mind. 30 min dauert und die Lösung sich dabei abkühlt.

**InnoFert Hopfen**

Dichte: 1195 kg/m<sup>3</sup>

Die von der Firma AlzChem hergestellte Ammonium-Nitrat-Lösung wird von der BayWa unter dem Handelsnamen „InnoFert Hopfen“ als EG-Düngemittel vertrieben. Die Stickstofflösung hat im Vergleich zu AHL einen niedrigeren Stickstoffanteil.

**Magnesiumchlorid-Lösung (MgCl<sub>2</sub>-Lös. 30 %)**

Dichte: 1330 kg/m<sup>3</sup>

MgCl<sub>2</sub>-Lösung ist ebenfalls als EU-Düngemittel gelistet und kann somit zu diesem Zweck eingesetzt werden. Da die Salzlösung extrem hygroskopisch wirkt, entzieht sie den Pflanzenzellen Wasser und führt zu einem „Verbrennen“ des Gewebes. Diese Eigenschaft ist beim

Hopfenputzen erwünscht und wurde 2011 erstmals im Versuch und in der Praxis erprobt. MgCl<sub>2</sub>-Lösung hat in etwa die gleiche Dichte wie AHL und lässt sich somit gut mischen. Allerdings kann es bei Mischungen mit sulfathaltigen N-Düngern (z. B. Ammoniumsulfat) zu Ausfällungen kommen.

Aufgrund des höheren Gewichts der Spritzbrühe sollten aus Sicherheitsgründen die Spritzbehälter nicht randvoll befüllt werden.

Das beim Hopfenputzen abtropfende Magnesiumchlorid liefert dem Boden als kostengünstigen Nebeneffekt sofort düngewirksames Magnesium.

Das hierbei mitgelieferte Chlorid hat keine Schadwirkung. Der Umrechnungsfaktor von MgCl<sub>2</sub> zu MgO ist 0,432. Restmengen von der Magnesiumchloridlösung können problemlos bis zur nächsten Saison überlagert werden.

Tab.: Empfohlene Mischungen für Nährstofflösungen

	Komponentenanteil in der Gesamtlösung (%)	Absolute Mengen in 500 l Gesamtlösung	in 500 l enthaltene Reinnährstoffmengen (kg)
<b>28 % N-Lös. (AHL)</b>			
N-Komponente	35 %	175 l	63 kg N
MgCl-Lösung	35 %	175 l	30 kg MgO
Wasser	30 %	150 l	-
<b>15 % N-Lös. (InnoFert Hopfen)</b>			
N-Komponente	50 %	250 l	45 kg N
MgCl-Lösung	35 %	175 l	30 kg MgO
Wasser	15 %	75 l	-

Je nach Stickstoffgehalt der verwendeten Stickstoffdüngerlösung ergeben sich beispielhaft unterschiedliche Mischungsverhältnisse.

### Anwendungshinweise für Nährstofflösungen

Je nach Stickstoffbedarf können die Komponentenanteile in der Gesamtlösung variiert werden. Die Spritzlösung sollte aber immer ca. 15-20 % Wasser beinhalten, damit zusätzliche Spurennährstoffdünger gelöst werden können. Bei der Zugabe von Bor und Zink zur Verstärkung der Wirkung sollte die Konzentration von 0,2 % Borsalz (200 g/100 l Wasser) bzw. 0,3 % Zinksulfat (300 g/100 l) aber nicht überschritten werden. Da das Wasser leichter als die Nährstofflösungen ist, muss es als 1. Komponente ins Spritzfass gegeben und die Spurennährstoffdünger Zink und Bor zuerst darin gelöst werden. Die gesamte Aufwandmenge je ha richtet sich nach der zu benetzenden Blattmasse und der Wüchsigkeit der Sorte. Erfahrungs-

gemäß zeigen höhere Aufwandmengen von 500 bis max. 600 l Spritzlösung/ha mit einer gleichmäßigen und feinen Benetzung eine bessere Wirkung. Der Stickstoffbedarf der Pflanze sollte dabei aber beachtet werden.

### Witterungsbedingungen

Um einen optimalen Wirkungserfolg zu erzielen, ist der Witterungsverlauf vor und nach der Applikation sehr entscheidend. Die Anwendung erfolgt am besten nach Niederschlägen, wenn die Wachsschicht abgewaschen und die Blätter „weich“ sind. Anschließend sonnige und mindestens zwei niederschlagsfreie Tage lassen die Salze lange wirken und begünstigen den Wasserentzug. Wird dagegen die Spritzlösung unmittelbar nach der Applikation abgewaschen, ist die Ätzwirkung deutlich reduziert.

### Applikationstechnik

Eine gleichmäßige und vollständige Benetzung wird erreicht, wenn je Spritzseite mindestens zwei Düsen angebracht

werden, wobei eine in Fahrtrichtung und eine entgegen der Fahrtrichtung eingestellt wird. Bei der Ausbringung von Nährlösungen muss keine verlustmindernde Technik eingesetzt werden. Bewährt haben sich kleintropfige TurboDrop-Düsen oder Flachstrahldüsen. Die zwei Standard Düsen TD 80-08 je Seite sollten z. B. mit Hilfe eines Doppeldüsenhalters gegen jeweils zwei Düsen TD 80-04 getauscht werden. Dies ergibt 4 Düsen je Seite mit einem kleineren Tropfenspektrum, wobei die Ausstoßmenge gleichbleibt. Das Abspritzen mit Handverstäubern ist arbeitsintensiv, wird aber durch die gezielte Benetzung ein besseres Wirkungsergebnis zeigen.

### Netzmittel

Der Zusatz von Superspritzern ist zwingend erforderlich. Bewährt hat sich z. B. das Produkt Break-Thru S 301, das die Oberflächenspannung reduziert und damit eine gleichmäßige und großflächige Benetzung bewirkt.

## Mechanische Verfahren zum Hopfenputzen

Das klassische Verfahren ist das **Entlauben von Hand**, das ab einer Wuchshöhe von 3 m durchgeführt werden kann. Dabei werden die Blätter und Seitentriebe im unteren Rebenbereich durch Abstreifen entfernt. Da das Verfahren sehr zeitaufwändig ist, hängt es von der Verfügbarkeit von Arbeitskräften ab.

Vergleichbare Effekte können auch mit dem Einsatz **mechanischer Entlaubungs- bzw. Laubsaugergeräte** erzielt werden.

Seitlich am Schlepper angebaute **Geräte mit flexiblen Kunststoffschnüren** bestückten, rotierenden Walzen schlagen Blätter und Seitentriebe von den Reben ab oder bekämpfen bei seitlicher Führung entlang des Bifangs das aufgelaufene Unkraut und Bodentriebe. Hierbei ist auf den optimalen Zeitpunkt und eine optimale Einstellung zu achten, um Rebenverletzungen zu vermeiden. Ein Nachteil ist die

enorme Staubentwicklung bei Trockenheit und die Steinschlaggefahr.

**Laubsaugergeräte** werden seitlich im unteren Rebenbereich vorbeigeführt. Gebläsevorrichtungen, wie sie auch an den Sprüngeräten für Raumkulturen verwendet werden, saugen dabei Blätter und Seitentriebe durch ein Gitter an. Dahinter befindliche rotierende Messer schlagen diese ab, ohne die außen am Gitter vorbeigeleitete Rebe zu beschädigen. Durch den Front- und Heckanbau ist eine beidseitige Behandlung möglich. Eine Bekämpfung von Unkräutern und Bodentrieben im Bifangbereich ist bei diesem Verfahren allerdings nicht möglich.

Nachteil aller mechanischen Verfahren ist, dass es durch das Abtrennen der Blätter und Seitentriebe zu Verletzungen an der Rebe und somit zu Eintrittspforten für Krankheiten oder mechanischen Übertragungen von Virose und Viroiden kommen kann.

## Thermisches Verfahren zum Hopfenputzen

Eine andere Alternative zum Hopfenputzen ist das thermische Verfahren, das häufig in Kombination mit chemischen oder mechanischen Verfahren angewandt wird. So werden die Blätter und Seitentriebe an den Reben häufig von Hand oder mit einem Entlaubungs- oder Laubsaugergerät entfernt. Die Bodentriebe, Unkräuter und Ungräser auf dem Bifang werden anschließend mit einem Abflamngerät beseitigt. Das Abflamngerät ist dabei meist an der Fronthydraulik des Traktors montiert, während der Gastank an der Heckhydraulik mitgeführt wird. Laut Herstellerangaben wird bevorzugt Propangas eingesetzt, da es gegenüber Butangas rascher eine stärkere Hitze entwickelt. Die Verdampfung des Flüssiggases aus dem Gastank erfolgt in den Gasbrennern. Die starke Erhitzung der behandelten Pflanzenteile führt zur Denaturierung des Eiweißes und Schädigung der Pflanzenzellen, die rasch welken und in der Folge vertrocknen.

Um eine Schädigung der Rebe zu vermeiden, muss die Hitzeeinwirkung (Gaszufuhr, seitlicher Abstand und Vorfahrt-

geschwindigkeit) an das Entwicklungsstadium (Verholzungsgrad der Rebe) sorgsam angepasst werden.

### 3.6 Bodenbearbeitung

Versuche haben gezeigt, dass häufige Bodenbearbeitung zwar eine billige Unkrautbekämpfung bedeutet, aber den Humusabbau und die Erosion fördert. Ziel der Bodenbearbeitung soll deshalb sein, die Humusvorräte zu schonen und dabei Unkraut zu bekämpfen. Dies bedeutet, so wenig Bodenbearbeitung wie möglich, aber trotzdem so viel wie nötig durchzuführen. Bodenfruchtbarkeitserhaltende Bodenbearbeitung in Großraumanlagen kann folgendermaßen aussehen:

- Wegackern und Schneiden mit Kombigeräten im Frühjahr
- Gründüngung flach einarbeiten und zwar erst nach dem Anleiten. Zum Schutz der Bienen blühende Zwischenfrüchte vor der Blüte einarbeiten.
- Einmal ackern und anschließend grubbern ist meist ausreichend, da durch die Möglichkeiten des chemischen Hopfenputzens die Lücke zur Nachschosser- und Unkrautbehandlung im Juni und Juli geschlossen ist. Wenn ein zweites Mal geackert wird,

sollte dies möglichst früh erfolgen.

Eine weitere Lockerung ist nur bei stark verschlämmtem Boden notwendig.

- Grubbern und Zwischenfrucht einsäen möglichst früh im Zusammenhang mit der Bodenbearbeitung zum 1. Ackern oder unmittelbar nach dem frühen 2. Ackern.
- Bei zu üppiger Entwicklung kann aus arbeitswirtschaftlichen Gründen ein Abschlegeln der Zwischenfrucht vor der Ernte über der untersten Blattebene notwendig sein.
- Vorteilhaft ist es, regelmäßig jede zweite Reihe als Spritzgasse zu benutzen und diese baldmöglichst nicht mehr zu bearbeiten.
- Keine weitere Bodenbearbeitung mehr während der Vegetationszeit.

Im Herbst nur bei verdichteten Fahrspuren eine Auflockerung mit dem Schwergrubber (mittlere Zinken entfernen) oder Untergrundlockerer auf eine Tiefe von höchstens 25 cm durchführen. Bewuchs soll erhalten bleiben.

### 3.7 Bewässerung und Fertigation

Der Hopfen stellt für eine optimale Pflanzenentwicklung und ein stabiles Ertrags- und Qualitätsniveau hohe Ansprüche an die Wasserversorgung. Im Boden gespeichertes Wasser verdunstet über die Prozesse „Evaporation“ (Verdunstung von der Bodenoberfläche) und „Transpiration“ (Verdunstung über den Pflanzenbestand). In der Regel wird der Bodenwasservorrat durch Niederschläge wiederaufgefüllt. Bleiben diese jedoch aus, sinkt der Wassergehalt im Boden, wodurch die Wasseraufnahme zunehmend erschwert und die Pflanzenentwicklung eingeschränkt wird. Solche Situationen können nicht nur

in extremen Trockenjahren, sondern auch bei ungleichmäßiger Verteilung der Niederschläge auftreten. Bewässerung kann dann einen Beitrag zur Stabilisierung des Ertrags und Alphasäuregehalts leisten.

Maßgebend für den Wasserverbrauch des Hopfens ist der Entwicklungszustand der Pflanzen. Als Bewässerungsperiode kann unter den aktuellen klimatischen Bedingungen in der Hallertau der Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte September angegeben werden. Während dieser kritischen Phase erreicht der Hopfen den höchsten Wasserverbrauch und reagiert am empfindlichsten auf Trockenheit.






Abb.: Optimale Bewässerungsperiode des Hopfens

Neben der Sicherstellung der Wasserversorgung von Pflanzen bieten Bewässerungssysteme zudem die Möglichkeit, zusammen mit dem Wasser bedarfsgerecht und gezielt Pflanzennährstoffe, wie z. B. Stickstoff auszubringen. Diese als Fertigation bezeichnete Form der Düngung kann zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der N-Düngung und Verringerung von Nährstoffausträgen in andere Ökosysteme leisten. Im Rahmen eines 4-jährigen Forschungsprojekts wurden an unterschiedlichen Standorten in der Hallertau umfangreiche Feldversuche zu den Auswirkungen von Tropfbewässerung und Fertigation durchgeführt.

Folgende Versuchsergebnisse zeigen exemplarisch, welche Effekte durch Bewässerung und Fertigation erzielt werden können:

### Relative Ertragseffekte in %




Abb.: Effekte auf den Ertrag (Sorte Perle, Bodenart 03 und 04, Zeitraum 2017 bis 2019)

### Relative Alphasäureeffekte in %




Abb.: Effekte auf den Alphasäuregehalt (Sorte Perle, Bodenart 03 und 04, Zeitraum 2017 bis 2019)

- **Bewässerung:** Stabilisierung von Ertrag und Qualität
- **Fertigation:** Steigerung der Effizienz der Bewässerung und Verbesserung der N-Ausnutzung

### Bewässerungstechnik

In Feldversuchen sowie in der Praxis haben sich wassersparende Tropfbewässerungssysteme bewährt. Da bei Tropfbewässerung nur ein geringer Anteil der gesamten Bodenoberfläche befeuchtet wird, liegt die Wasserausnutzung auf einem sehr hohen Niveau. Ein weiterer Vorteil der Tropfbewässerung ist die Möglichkeit der gezielten Ausbringung von Düngemitteln zusammen mit dem Wasser. Die Pflanzennährstoffe werden dabei direkt in die aktive Wurzelzone appliziert. Dadurch wird die Effizienz von Düngemitteln optimiert, verbesserte Wachstumsbedingungen geschaffen und zugleich das Risiko für Auswaschungsverluste minimiert.

## Tropfschlauchpositionierung




Abb.: Tropfschlauch oberirdisch, auf dem Bifang (AB)

Bei **oberirdischer Bewässerung auf dem Bifang (AB)** wird der Tropfschlauch jährlich nach dem letzten Ackern auf den Bifang ausgelegt. Eine Führungsfurche, in die der Schlauch dabei eingelegt wird, verhindert ein Abrutschen in die Fahrspuren. Die im Bifang gebildeten Sommerwurzeln garantieren auf den unterschiedlichsten Böden eine effektive Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. Im Herbst müssen die ausgelegten Tropfschläuche wieder aufgerollt werden. Je nach Mechanisierung und Schlaggröße liegt der Arbeitszeitbedarf für beide Arbeitsschritte zusammen bei 3 bis 4 Akh und 2 Schlepperstunden je Hektar.




Abb.: Tropfschlauch unterirdisch, neben dem Bifang (NB)

Bei **unterirdischer Bewässerung (NB)** werden in jeder zweiten Fahrspur neben den Pflanzreihen zwei Tropfschläuche dauerhaft in eine Tiefe von 30 cm und ca. 30 cm von Bifangmitte eingezogen. Im Rahmen mehrjähriger Feldversuche zeigte sich, dass dieses System nur auf Böden funktioniert, die entweder eine optimale Wasserverteilung oder intensive Durchwurzelung im Bereich des

Tropfschlauchs ermöglichen. Bei dieser Form der Bewässerung ist zwingend darauf zu achten, dass die Fahrspuren mit Tropfschläuchen ab dem Beginn von Bewässerungsmaßnahmen nicht mehr befahren werden, da ansonsten schädliche Bodenverdichtungen entstehen können.




Abb.: Tropfschlauch unterirdisch, in der Fahrgassenmitte

Bei der dauerhaften **unterirdischen Positionierung des Tropfschlauches in der Fahrgassenmitte** besteht die Problematik, dass der Schlauch weit von der eigentlichen Pflanzreihe und somit dem Hauptwurzelbereich des Hopfens entfernt ist.




Abb.: Tropfschlauch oben am Drahtgerüst

Bei der **Installation des Tropfschlauches oben am Drahtgerüst** steigt aufgrund der Blattbenetzung zum einen das Risiko für Infektionen mit Peronospora, insbesondere wenn am Tag bewässert wird. Zum anderen nehmen Verdunstungsverluste zu. Außerdem besteht die Problematik, dass die Tropfen je nach Windverhältnissen sowohl links als auch rechts vom Bifang auf dem Boden aufkommen können. Ist im Anschluss ein Befahren jeder zweiten Fahrspur z. B. für Pflanzenschutzmaßnahmen notwendig, können schädliche Bodenverdichtungen entstehen. Außerdem erfolgt keine intensive Durchfeuchtung des Hauptwurzelbereichs.

## Bemessung der Wassergaben

Einflussfaktoren:

- Witterungsverlauf (Verdunstung, Niederschläge)
- Bodeneigenschaften (Bodenart, Durchwurzelungstiefe, Wasserspeichervermögen)
- Kulturzustand (Sorte, Entwicklungsstadium, Habitus)
- Bewässerungssystem (Positionierung, Tropfabstand)
- Wasserverfügbarkeit

Zur Planung, Berechnung und Dokumentation von Bewässerungsmaßnahmen kann die Bewässerungs-App der Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen (ALB) genutzt werden.

[www.alb-bayern.de/app](http://www.alb-bayern.de/app)



Das Berechnungsmodell der Online-Anwendung nutzt dabei die tägliche Verdunstung, den Niederschlag sowie den Verlauf des Bodenwasservorrats. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen und der Nutzung ist auf der ALB-Website unter „Infos und Erläuterungen zur Handhabung“ zu finden. Bei der Anwendung muss folgendes beachtet werden:

Ist während der Hauptwachstumsphase des Hopfens eine längere Trockenperiode mit hohen Verdunstungsraten absehbar, darf der Bodenwassergehalt (nFK) nicht zu stark absinken (nFK > 70 %), um einen rechtzeitigen Beginn von Bewässerungsmaßnahmen zu ermöglichen. Wird mit der Bewässerung zu spät begonnen, können Ertrag und Qualität häufig nicht mehr rechtzeitig stabilisiert werden.

### Bewässerungsintervalle

Auf sehr leichten Böden mit hohen Sand- oder Kiesanteilen ist darauf zu achten, dass das Wasser bei hohen Einzelgaben

nicht zu tief und damit außerhalb des effektiven Wurzelraums versickert, weshalb häufiger bewässert werden muss. Auf mittleren und schwereren Böden sind hingegen höhere Einzelgaben und größere Intervalle möglich, da sich das Wasser verstärkt horizontal verteilt.

Aus Feldversuchen und Praxiserfahrungen der vergangenen Jahre ist bekannt, dass längere Intervalle und höhere Einzelgaben bei unterirdischer Tropfschlauchverlegung zu einer Verbesserung der Systeme führen, da ein größeres Bodenvolumen durchfeuchtet wird. Auf stark sandigen oder kiesigen Böden sind hohe Einzelgaben und längere Intervalle jedoch vor allem bei unterirdischer Bewässerung keine Option. Auch auf tonigen Böden ist die maximale Höhe einzelner Bewässerungsgaben bei unterirdischer Tropfschlauchverlegung häufig limitiert, da sich das Wasser nicht ausreichend schnell verteilt und an der Oberfläche ansammelt.

Maximale Wassergaben:

- Leichte Standorte: bis zu  $31 \text{ m}^3/\text{ha} = 3,1 \text{ mm}$  pro Gabe
- Mittlere und schwere Standorte: bis zu  $75 \text{ m}^3/\text{ha} = 7,5 \text{ mm}$  pro Gabe

### Fertigation

Grundsätzlich kann jeder Pflanzennährstoff über das Bewässerungswasser ausgebracht werden. Der mengenmäßig wichtigste Nährstoff ist jedoch der Stickstoff (N). Dieser ist aber am stärksten ertragslimitierend und am ehesten verlustgefährdet. Untersucht wurde in den vergangenen Jahren deshalb vor allem die Ausbringung von Stickstoff über sogenannte N-Düngesysteme mit Fertigation. Ist am Betrieb eine Bewässerungsanlage mit oberirdischer Tropfschlauchverlegung auf dem Bifang (AB) vorhanden, ist es grundsätzlich sinnvoll, einen Teil der N-Menge über Fertigation auszubringen. Bei unterirdischer Bewässerung eignen sich zur Düngereinspeisung nur Böden mit ausreichend guter horizontaler Wasser-Verteilung.

Wichtig ist, bereits bei der N-Düngeplanung im Frühjahr zu berücksichtigen, dass ein Teil des Stickstoffs über Fertigation ausgebracht werden soll. Außerdem ist der im Bewässerungswasser in Form von Nitrat ( $\text{NO}_3^-$ ) enthaltene Stickstoff anzurechnen. Hierfür sollte das Wasser auf Nitrat untersucht werden.

Beispiel:

- Nitratgehalt ( $\text{NO}_3^-$ ) = **40 mg/Liter**
- Bewässerungsmenge = **800 m<sup>3</sup>/ha u. Jahr**
- Umrechnung ( $\text{NO}_3^-$ ) auf N =  $\text{NO}_3^- \times 0,2259$
- Rechenbeispiel:  
 $40 \text{ mg NO}_3/\text{l} \times 0,2259 = 9 \text{ mg N/l}$   
 $9 \text{ mg N/l} = 9 \text{ g N/m}^3$   
 $9 \text{ g N/m}^3 \times 800 \text{ m}^3/\text{ha u. Jahr} / 1000 \text{ g/kg}$   
**= 7,2 kg N/ha u. Jahr**

**Festlegung des Düngemittels**

Als N-Düngemittel hat sich auf unterschiedlichen Standorten der Einsatz von Ammoniumnitratharnstoff-Lösung (AHL) mit 28 % N bewährt. Der im AHL enthaltene Harnstoff-Anteil wird bei hohen Bodentemperaturen im Sommer innerhalb weniger Tage zu Ammonium und anschließend zu Nitrat umgewandelt und steht der Pflanze somit voll zur Verfügung. Ein wesentlicher Vorteil von AHL ist, dass

das Handling im Vergleich zu Spezialnährsalzen, die zunächst in Wasser gelöst werden müssen, deutlich einfacher ist.

**Düngesysteme mit Fertigation**

Die Ausbringung des N-Anteils über das Bewässerungswasser muss während der Hauptwachstumsphase im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Anfang August erfolgen. Ab Anfang August sollten keine nennenswerten N-Mengen mehr ausgebracht werden. In Versuchen zeigte sich, dass ein hohes N-Versorgungsniveau im Zeitraum der Alphasäurebildung zu reduzierten Gehalten führen kann. Über eine einzelne Wassergabe sollten maximal 20 kg N/ha ausgebracht werden.

Bei frühreiferen Sorten wie Perle und Halbertauer Tradition besteht, im Gegensatz zu spätreiferen Sorten wie Herkules, grundsätzlich ein höheres Risiko für eine zu späte N-Ausbringung. Für frühreifere Sorten wird deshalb empfohlen, nur 1/3 der gesamten N-Menge über Fertigation auszubringen.

Die Abläufe am Betrieb sollten danach ausgerichtet werden, dass die Düngereinspeisung spätestens Ende Juni (ab Kalenderwoche 25-26) möglich ist. Nachfolgend werden Beispiele für mögliche N-Düngesysteme in der Praxis dargestellt:

Tab.: Beispiel für N-Düngesystem mit 50 % Fertigation

Monat	April				Mai				Juni				Juli				August				Gesamt [kg N/ha]	Fertigation Anteil			
Kalenderwoche	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			34	35	
N-Menge [kg N/ha]				50					40			15	15	15	15	15	15							<b>180</b>	50%

Monat	April				Mai				Juni				Juli				August				Gesamt [kg N/ha]	Fertigation Anteil		
Kalenderwoche	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			34	35
N-Menge [kg N/ha]				50					40			18	18	18	18	18							<b>180</b>	50%

↓ Gestreut

↓ Hopfenputzen oder Gestreut

└───┬───┘ Fertigation

Tab.: Beispiel für N-Düngesystem mit 33 % Fertigation

Monat Kalenderwoche	April				Mai					Juni				Juli				August					Gesamt [kg N/ha]	Fertigation Anteil
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
N-Menge [kg N/ha]			60					60				12	12	12	12	12						180	33%	

↓ Gestreut                      ↓ Hopfenputzen oder Gestreut                      Fertigation

### Einspeisung – Vorgehensweise

Bei der Ausbringung des N-Anteils über Fertigation stellt sich die Frage, ob jede Bewässerungsgabe eine geringe Menge an Stickstoff enthalten soll oder ob die Dosierung nur zu einzelnen Wassergaben erfolgt. Enthalten nur einzelne Wassergaben Stickstoff, ist es auch in Jahren mit geringem oder keinem Bewässerungsbedarf einfach möglich, durch wenige kleine Wassergaben den im Frühjahr festgelegten N-Anteil über Fertigation auszubringen. Systeme mit **einer Düngergabe pro Woche** erwiesen sich als effektiv und praxistauglich.

Damit über das Bewässerungswasser ausgebrachter Dünger bzw. Stickstoff nicht außerhalb der intensiv durchwurzelten Zone verlagert wird, sollte die Höhe der Wassergabe begrenzt werden. Jedoch sollte auch eine bestimmte Mindesthöhe eingehalten werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen.

- Sandboden: mindestens 3 bis maximal 4 Stunden Wasserlaufzeit (= 19 – 25 m<sup>3</sup>)
- Lehmboden: mindestens 3 bis maximal 6 Stunden Wasserlaufzeit (= 19 – 38 m<sup>3</sup>)

### 3.8 Zwischenfruchteinsaat

Die Zwischenfruchteinsaat in Hopfen kann in erosionsgefährdeten Lagen die Bodenabschwemmung erheblich vermindern.

### Gleichmäßige Düngerverteilung

Sowohl am Anfang als auch am Ende eines jeden Tropfschlauches muss dieselbe Nährstoffmenge ausgebracht werden. Um dies zu garantieren sind folgende Aspekte zu beachten:

- keine Leckagen an den Tropfschläuchen, so dass an bestimmten Punkten eine höhere Wassermenge austritt.
- vor Beginn eines Einspeisevorgangs müssen alle Tropfschläuche der zu bewässernden Schläge vollständig gefüllt sein
- nach Abschluss des Einspeisevorgangs muss eine ausreichende Nachlaufzeit mit reinem Wasser eingehalten werden.




Abb.: Beispiel eines Einspeisevorgangs

Gleichzeitig verringert eine über den Winter stehende Zwischenfrucht die Nitratauswaschung.

Tab.: Gebräuchliche Arten und pflanzenbauliche Merkmale

Art	Wirtspflanze f. Verticillium	Nachsaat Ende Sept. möglich	Winterhärte	Massenbildung in TS	Wiederaustrieb nach Abschlegeln	Sämaschienen-einstellung kg/ha	Saatgutmenge kg/ha <sup>1)</sup>
Winterraps	ja	-	++	+++	++	15	10
Winterrübsen	ja	-	++	+++	++	13	9
Ölrettich	ja	-	-	+++	+	28	19
Senf	ja	-	-	++	-	20-24	15
Triticale	nein	+++	+++	+++	+++	210	140
Winterroggen	nein	+++	+++	+++	+++	150-180	110
Grünroggen	nein	+++	+++	+++	+++	160	100
Buchweizen	nein	-	-	++	+	30-35	22
Ramptillkraut	ja	-	--	++	-		
Phazelia	ja	-	-	++	++		
Alexandrinerklee	ja	-	+	+	+	nicht für Reinsaat geeignet	
Kresse	ja	-	-	+	-		
Winterwicken	ja	++	++	++	++		

Legende: + + + sehr gut; + + gut bis sehr gut; + gut; o mittel; - gering; -- gering bis sehr gering; - - - sehr gering

<sup>1)</sup> Aussaat zwischen den Reihen = 2/3 der Fläche

**Saatzeit:** Ende Mai bis Ende Juni und/oder im Herbst bis Ende September. Bei früher Saat kann die empfohlene Saatgutmenge reduziert werden.

**Grünroggen, Winterroggen und Triticale** laufen schnell auf, haben eine intensive Bestockung und bleiben, da der Kältereiz zum Schossen fehlt, niedrig und dicht. Winterroggen und Triticale schützen den Boden während der Sommermonate Juli und August sehr gut vor Erosion. Gräser und Getreidearten werden vom Verticilliumpilz nicht infiziert und sollten deshalb in Hopfengärten mit Welkebefall bevorzugt eingesetzt werden. Grünroggen bildet im Vergleich zum Winterroggen noch mehr organische Masse.

**Hinweis: Bei zugekauftem Getreide muss zertifiziertes Saatgut verwendet werden. Bei der Zwischenfruchteinsaat mit eigenerzeugtem Getreide ist die Nachbauregelung zu beachten!**

**Winterraps oder Winterrübsen** (z. B. Perko) werden gerne als Zwischenfrüchte angebaut, weil durch die Frosthärte und durch das Wachstum in den frostfreien

Perioden Stickstoff entzogen, in der Pflanzenmasse gebunden und dadurch vor Auswaschung geschützt wird. Raps oder Rübsen gehen nach der Saat schnell auf und entwickeln sich vor der Hopfenernte so weit, dass sie den Boden bedecken. Bei üppiger Entwicklung wird empfohlen, die Untersaat so hoch abzuschlegeln, dass ein Wiederaustrieb möglich ist. Nach der Hopfenernte kann die Untersaat ohne die Beschattung des Hopfens ein kräftiges Wachstum entwickeln und den Boden vor Erosion und Nitratauswaschung schützen.

**Ölrettich** oder **Senf** kommen bei früher Aussaat zur Blüte und sind nicht winterhart. Sie eignen sich daher für Mischsaaten von abfrierenden mit winterharten Arten.

Zum Risikoausgleich werden **Saatgutmischungen** vermehrt eingesät und bieten gegenüber Reinsaaten viele Vorteile. So ist das Auflaufisiko bei ungünstigen Witterungs- und Saatbettbedingungen vermindert. Durch das unterschiedliche Wuchsverhalten von Wurzeln und oberirdischen Aufwuchs der einzelnen Mischpartner

kommt es zu einer besseren Unkrautunterdrückung. Auch wurzeln die verschiedenen Pflanzenarten unterschiedlich tief und können dadurch Bodenverdichtungen besser lockern und Nährstoffe und Wasser effizienter ausnutzen. Standortnachteile können somit besser ausgeglichen werden. Die vielfältigen Wurzelausscheidungen gewährleisten zudem ein vielseitigeres Nahrungsangebot für das Bodenleben.

Zur Aussaat von winterharten Zwischenfrüchten nach der Hopfenernte haben sich Mischungen mit Getreide und Wicken bewährt. Für abfrierende Komponenten in Sommerzwischenfruchtmischungen stellen neben Ölrettich und Senf der Buchweizen, Ramptillkraut, Phazelia, Kresse und Sommerklearten geeignete Mischpartner dar.

#### **Beachte:**

- Für alle Kreuzblütler gilt, dass sie Zwischenwirte für die Verticilliumwelke und andere bodenbürtige Krankheiten sind und deshalb nicht in welkebefallenen Hopfengärten angebaut werden sollten.
- Bei Schneckenproblemen ist eine Zuzusatzung von Getreide sinnvoll. Die Saatgutmengen sind dabei anteilig zu reduzieren.
- Zur Vermeidung von Fruchtfolgekrankheiten wird ein Wechsel der Zwischenfruchtarten empfohlen.
- Wenn bienengefährliche Pflanzenschutzmittel (z. B. Insektizide und Akarizide) ausgebracht werden, dürfen keine blühenden Zwischenfruchtarten im Hopfen vorhanden sein.

## **Förderung der Zwischenfruchteinsaat in Bayern**

### **Gewässerrandstreifen (GWR) (nach Wasserhaushaltsgesetz und Bayerischem Naturschutzgesetz)**

Der Bund hat aufgrund der Verpflichtungen infolge der EU-Nitratrichtlinie im Sommer 2020 ein eigenes Gesetz zum Anlegen von Gewässerrandstreifen erlassen. Deshalb gibt es nun in Bayern zwei

verschiedene gesetzliche Regelungen zur Erstellung von Gewässerrandstreifen (Wasserhaushaltsgesetz und Bayer. Naturschutzgesetz). Die gesetzlichen Vorgaben bei den „Bundesgewässerrandstreifen“ sind (leider) nicht identisch mit den Vorgaben nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz. Bitte besprechen Sie die Anlage noch nicht erfasster Gewässerrandstreifen mit Ihrem Sachbearbeiter.

Bei der Mehrfachantragstellung 2022 gilt, dass, sofern noch nicht geschehen, für Ackerflächen, Dauergrünland und Dauerkulturen jeweils eigene Feldstücke angelegt werden müssen. Diese Vorgabe führt im Hopfenbau dazu, dass die erfassten Gewässerrandstreifen mit ihrem im Regelfall sehr kleinen Flächenumfang vom bisherigen Feldstück getrennt und als eigene Feldstücke erfasst werden müssen. Bitte beachten Sie dies bei der Mehrfachantragstellung.

Die Antragstellung „Gewässerrandstreifen“ erfolgt heuer, abweichend zum Vorjahr, unter dem Reiter „Beantragung“. Durch Setzen des Hackens bei „Ausgleichszahlungen für Gewässerrandstreifen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie“ wird die Zahlung beantragt. Des Weiteren müssen im Feld „Zahlungen Gewässerrandstreifen“ die Erklärungen zum Unternehmen abgegeben werden. Die Prämienhöhe liegt wie in den beiden Vorjahren bei 500 €/ha.

### **B35- Winterbegrünung bzw.**

### **B36- Winterbegrünung mit Wildsaaten (wildtiergerechter Zwischenfruchtanbau)**

Bei der Winterbegrünung 2022, also Flächen, die im Herbst 2022 eingesät werden, ist im Rahmen der Erfassung des MFA für jedes einbezogene Feldstück bzw. für jeden einbezogenen Schlag unter dem grünen Reiter „AUM“ der Schlag, die Maßnahme B35/B36 – Winterbegrünung (2022) und die Fläche einzutragen bzw. anzuklicken.

Alternativ kann die Meldung auch, jedoch bis spätestens zum 01.10.2022 in iBALIS unter dem Menüpunkt „Meldungen/Er-

---

fassung AUM-Winterbegrünung“ erfolgen. Dabei können nur Flächen (Feldstücke oder Teile von diesen) einbezogen werden, die im FNN 2022 bereits angegeben wurden.

Für alle Winterbegrünungsmaßnahmen gilt, dass bis Vegetationsende ein für eine erosions- und nitratmindernde Wirkung ausreichender Pflanzenbestand vorhanden sein muss. Die Einarbeitung der Zwischenfrucht und Bodenbearbeitung ist nach dem 15. Februar des Folgejahres zulässig.

### **B37- Mulchsaatverfahren bei Reinkulturen**

Im Rahmen der Erfassung des Mehrfachantrages 2022 ist bei laufenden B37 – Maßnahmen bei den Hopfengärten, bei denen im Vorjahr eine Einsaat erfolgt ist,

in iBALIS unter Anträge => Mehrfachantrag => Flächen- und Nutzungsnachweis => (nochmals) unter Flächen- und Nutzungsnachweis => nach „anklicken“ des (entsprechenden) Feldstücknamens unter dem grünen Reiter „AUM“, der Schlag (i. d. Regel Schlag 1), die Maßnahme B37 - Mulchsaatverfahren (2022) und die Fläche einzutragen und abzuspeichern. Hierbei ist zu beachten, dass beim „Verlassen“ des Feldstückes der Vorgang noch abgespeichert werden muss.

Neben den allgemeinen Auflagen und Verpflichtungen ist es bei der Maßnahme B37 bzgl. der Zwischenfruchtaussaat erforderlich, dass sich bis zur Einarbeitung im Frühjahr so viel Pflanzenmasse entwickelt hat, dass im gesamten Frühjahr (bis 21.06.) eine erosionsmindernde Mulchabdeckung von mind. 10 % vorhanden ist.

## **4 Sorten**

### **4.1 Sortenwahl**

Bei der Auswahl der Sorten sind wichtige Kriterien: Die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge, die Stickstoffeffizienz, die Stresstoleranz, das Ertragspotential, die Reifezeit und die Qualität mit ihrem Einfluss auf ihre Absatzmöglichkeiten.

Die Anbauggebiete Tettang, Spalt und Elbe-Saale haben jeweils unterschiedliche Sortenschwerpunkte.

Der Anbau mehrerer Sorten in einem Betrieb bietet eine Reihe von Vorteilen:

- Arbeitsverteilung durch verschiedene Reifezeiten und auch eine gewisse Verteilung der Pflegearbeiten im Frühjahr
- Ausgleich des Jahresrisikos durch unterschiedliche Reaktion der einzelnen Sorten auf die Jahreswitterung
- Ausgleich des Marktrisikos durch den Anbau von Sorten Aroma- und Bittersorten.

### **4.2 Gute Klimaresilienz der neuen Hüller Zuchtsorten**

Im Zuge des Klimawandels hat sich die Durchschnittstemperatur in der Hauptvegetationszeit von April bis August in der Hallertau um rund 2 °C erhöht. Im Trockenjahr 2018 lag am Standort Hüll die Durchschnittstemperatur während der Hauptvegetationszeit sogar um 4 °C über dem langjährigen Mittelwert. Auch unter diesen sehr stressigen Klimabedingungen mit extremer Hitze, Sonneneinstrahlung und Trockenheit zeigten die neuen Aroma-

sorten stabile und zugleich hohe Ernterträge. In der Grafik dargestellt ist der durchschnittliche Alphasäurenertrag/ha in den Jahren 2016-2020. Die roten Säulen zeigen den prozentualen Minderertrag im Trockenjahr 2018. Während ältere Land- und Zuchtsorten im Alphasäurenertrag um teilweise über 50% einbrachen, zeigten sich die neueren Hüller Zuchtsorten relativ stabil. Hier reduzierte sich der Alphasäurenertrag nur um rund 20%.






Abb.: Temperaturverlauf April - August am Standort Hüll im Vergleich zu langjährigen Mittelwerten

## Klimaresilienz der neuen Hüller Sorten(2016 - 2020)

**Ertragsstabilität**  
Erträge in kg Alpha / ha

**Stressjahr 2018**

Abweichung in % zum Mittelwert der Jahre 2016- 2020

**offizielle Ertrags- und Alphanaten:**

- Hopfenring & Dt. Hopfenpflanzerverband
- AHA (Arbeitsgruppe Hopfenanalytik)




Abb.: Klimaresilienz der neuen Hüller Sorten (2016 - 2020)

## 4.3 Sorteneigenschaften auf einen Blick – Aromasorten

	Hallertauer Mittelfrüher HAL	Hersbrucker Spät HEB	Spalter/Tettlinger/Saazer			Saphir	Diamant	Aurum
			SPA	TET	SAZ	SIR	DNT	AUR
<b>Sortentyp</b>	traditionelle hochfeine Landsorte	traditionelle hochfeine Landsorte	traditionelle hochfeine Landsorten			hochfeine Zuchtsorte	hochfeine Zuchtsorte, vom Typ Spalter	hochfeine Zuchtsorte, vom Typ Tettlinger
<b>Ertrag (kg/ha)</b>	1300	1800	1200 - 1300			2100	2000	2000
<b>Aroma</b>	sehr gut	sehr gut	sehr gut			sehr gut	sehr gut	sehr gut
<b>Ölgehalt (ml/100 g)</b>	0,85	0,75	0,55 - 0,60			1,10	1,70	1,50
<b>Alphasäuren (%)</b>	3,9	2,7	3,5 - 4,2			3,7	7,0	4,7
<b>Ansprüche an Boden und Lage</b>	mittel	mittel	gering			gute Standorte	mittel	mittel
<b>Widerstandsfähigkeit:</b>								
- Welke mild	---	o		++		+	+	+
letal	---	--		-		---	--	--
- Peronospora								
Sekundärinfektion	---	---		-		--	++	++
- Echter Mehltau	+	-		+		+	o	o
- Botrytis	o	++		-		++	++	++
- Gemeine Spinnmilbe	-	o		-		+	o	o
- Blattlaus	-	o		--		+	+	+
<b>Wuchs</b>	zylindrisch, mittel-lange Seitenarme, locker	Kopfbildung, lange Seitenarme, locker	zylindrisch, mittel - lange Seitenarme, große Blätter			zylindrisch bis leicht kopfbetont	zylindrisch bis kopf-betont	zylindrisch, gleichmäßig
<b>Doldenbeschaffenheit und -behang</b>	schöne Dolden, geringer Behang	mittelgroße Dolden, guter Behang	große Dolden, geringer Behang			kleine Dolden, sehr guter Behang	kleine Dolden, sehr guter Behang	große Dolden, gleichmäßiger Behang
<b>Reifezeit</b>	früh	spät	früh			mittelspät	mittelspät - spät	mittelfrüh
<b>Klimaresilienz</b>	gering	gering	gering			mittel	mittel	mittel

Legende: + + + sehr gut; + + gut bis sehr gut; + gut; o mittel; - gering; -- gering bis sehr gering; --- sehr gering

	<b>Perle</b> <b>PER</b>	<b>Hallertauer Tradition</b> <b>HTR</b>	<b>Spalter Select</b> <b>SSE</b>	<b>Opal</b> <b>OPL</b>	<b>Smaragd</b> <b>SGD</b>	<b>Northern Brewer</b> <b>NBR</b>	<b>Tango</b> <b>TGO</b>
<b>Sortentyp</b>	feine Zuchtsorte mit verbessertem Bitterwert	hochfeine Zuchtsorte vom Typ Hallertauer	hochfeine Zuchtsorte vom Typ Spalter	feine Zuchtsorte mit verbessertem Bitterwert	feine Zuchtsorte	bewährte Sorte mit guter Bitterqualität	stresstolerant, mit vielseitigem Braupotential
<b>Ertrag (kg/ha)</b>	1950	1950	2000	1900	1900	1600	2600
<b>Aroma</b>	gut	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut	sehr gut
<b>Ölgehalt (ml/100 g)</b>	1,30	0,70	0,70	0,95	0,90	1,5	3,0
<b>Alphasäuren (%)</b>	7,0	5,8	4,6	7,5	5,5	8,6	9,0
<b>Ansprüche an Boden und Lage</b>	gute Standorte	warme Lagen	mittel	mittel	mittel	warme, wüchsige Lage	mittel
<b>Widerstandsfähigk.:</b>							
- Welke mild	++	+	++	+	+	++	++
letal	--	---	--	--	--	--	o
- Peronospora							
Sek.infektion	+++	+++	++	++	+	-	++
- Echter Mehltau	-	+	-	+	-	--	++
- Botrytis	+	++	++	+	++	+	+
- Gem. Spinnmilbe	-	-	+	o	o	-	o
- Blattlaus	-	+	++	-	o	--	o
<b>Wuchs</b>	zylindrisch, kurze Seitenarme	zylindrisch, mittellange Seitenarme	Kopfbildung, sehr wüchsig, lange Seitenarme	zylindrisch, mittellange Seitenarme	zylindrisch, mittellange Seitenarme	spitz, kurze Seitenarme, dichte Belaubung	zylindrisch, wüchsig, mittellange Seitenarme
<b>Doldenbeschaffenheit und -behang</b>	schöne Dolden, gleichmäßiger Behang	schöne Dolden, gleichmäßiger Behang	kleine Dolden, sehr guter Behang	schöne Dolden, mittlerer Behang, Doldenverlaubung	schöne Dolden, guter Behang	große Dolden, mittlerer Behang, Doldenverlaubung	kompakte Dolden, dunkelgrüne Farbe, guter Behang
<b>Reifezeit</b>	mittelspät	mittelfrüh	mittelspät	mittelfrüh	spät	mittelfrüh	mittelspät - spät
<b>Klimaresilienz</b>	gering	mittel	mittel	mittel	mittel	gering	gut

Legende: + + + sehr gut; + + gut bis sehr gut; + gut; o mittel; - gering; -- gering bis sehr gering; --- sehr gering

## Sorten

	<b>Mandarina Bavaria MBA</b>	<b>Hallertau Blanc HBC</b>	<b>Huell Melon HMN</b>	<b>Callista CAL</b>	<b>Ariana ANA</b>	<b>Cascade CAS</b>
<b>Sortentyp</b>	stresstolerant, mit vielseitigem Braupotential	stresstolerant, mit vielseitigem Braupotential	mit vielseitigem Braupotential	stresstolerant, mit vielseitigem Braupotential	stresstolerant, mit vielseitigem Braupotential	US-Sorte
<b>Ertrag (kg/ha)</b>	2600	2550	2300	2500	2400	2400
<b>Aroma</b>	hopfiges Grundaroma, Mandarine, Grapefruit	hopfiges Grundaroma, Mango, Stachelbeere, Weißwein	hopfiges Grundaroma, Honigmelone, Aprikose, Erdbeere	hopfiges Grundaroma, Aprikose, Maracuja, rote Beeren	hopfiges Grundaroma, Johannisbeere, Cassis, leicht harzig	hopfiges Grundaroma, blumig, zitrusartig
<b>Ölgehalt (ml/100 g)</b>	1,2	1,1	1,1	1,3	1,5	1,0
<b>Alphasäuren (%)</b>	7,7	8,9	6,2	3,3	9,5	6,0
<b>Ansprüche an Boden und Lage</b>	hoch	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel
<b>Widerstandsfähigkeit:</b>						
- Welke mild	-	-	+	+	+++	--
letal	--	--	-	--	++	--
- Peronospora Sekundärinfektion	++	+++	++	+	+	++
- Echter Mehltau	++	+++	++	++	+++	+
- Botrytis	+	o / +	+	--	o	+
- Gemeine Spinnmilbe	o	o	o	o	+	o
- Blattlaus	o	o	o	o	-	o
<b>Wuchs</b>	zylindrisch, kurze bis mittellange Seitenarme	zylindrisch bis kopfbetont, lange Seitenarme	zylindrisch bis kopfbetont, lange Seitenarme	zylindrisch bis kopfbetont, lange Seitenarme	zylindrisch, kürzere Internodien, mittellange Seitenarme	wüchsig, kopfbetont, offene Rebe, lange Seitenarme
<b>Doldenbeschaffenheit und -behang</b>	sehr schöne kompakte Dolden, dunkelgrüne Farbe, mittlerer Behang	schöne kompakte Dolden, blasse Farbe, guter - sehr guter Behang	längliche kompakte Dolden, geringer - mittlerer Behang	große kompakte Dolden, mittlerer Behang	sehr kompakte Dolden, guter Behang	schöne kompakte Dolden, mittlerer - guter Behang
<b>Reifezeit</b>	sehr spät	spät	mittelspät - spät	mittelspät - spät	sehr spät	spät
<b>Klimaresilienz</b>	gut	gut	gut	gut	gut	gut



Legende: + + + sehr gut; + + gut bis sehr gut; + gut; o mittel; - gering; -- gering bis sehr gering; --- sehr gering

## 4.4 Sorteneigenschaften auf einen Blick – Bitter- und Hochalphasorten

	Hallertauer Magnum HMG	Hallertauer Taurus HTU	Hallertauer Mercur HMR	Herkules HKS	Nugget NUG	Polaris PLA
<b>Sortentyp</b>	Hochalphasorte mit sehr hohem Bitterwert und guter Bitterqualität	Hochalphasorte mit sehr hohem Bitterwert und guter Bitterqualität	Hochalphasorte mit hohem Bitterwert und guter Bitterqualität	Hochalphasorte mit sehr hohem Bitterwert und guter Bitterqualität	Bitterhopfen mit hohem Bitterwert	Hochalphasorte mit sehr hohem Bitterwert und guter Bitterqualität
<b>Ertrag (kg/ha)</b>	2000	2000	2000	3000	2400	2300
<b>Ölgehalt (ml/100 g)</b>	2,4	2,0	2,2	1,7	1,7	3,2
<b>Alphasäuren (%)</b>	13,2	16,0	13,3	16,3	11,0	19,3
<b>α-Ertrag (kg/ha)</b>	280	320	270	500	270	430
<b>Ansprüche an Boden und Lage</b>	gering, keine Staunässe	hoch, warme, wüchsige Lagen	gering, nicht in Windlagen	hoch, warme, wüchsige Lagen, keine Staunässe	gering, alle Böden und Lagen	bevorzugt mittlere bis schwere Böden
<b>Widerstandsfähigkeit:</b>						
- Welke mild	++	+	o	+++	-	+++
letal	o	o	---	+	--	+
- Peronospora						
Sekundärinfektion	+	o	o	-	---	-
- Echter Mehltau	---	---	+++	---	---	---
- Botrytis	--	-	---	-	-	--
- Gemeine Spinnmilbe	-	--	-	-	-	-
- Blattlaus	---	--	-	--	-	--
<b>Wuchs</b>	schnelle Jugendentwicklung, zylindrisch, dichte Belaubung, große Blätter	zylindrisch, kurze Seitenarme, dichte Belaubung	schnelle Jugendentwicklung, zylindrisch, mittelhoher Ansatz der Seitenarme	zylindrisch, mittellange Seitenarme	zylindrisch bis kopfbetont, wuchtig, lange Seitenarme	bauchig bis zylindrisch, kürzere Internodien
<b>Doldenbeschaffenheit und -behang</b>	sehr große Dolden, geringer Behang, Doldenverlaubung	sehr schöne, feste Dolden, mittlerer Behang	mittelgroße, feste Dolden, mittlerer Behang	kleine - mittelgroße, feste Dolden, sehr guter Behang	mittelgroße Dolden, guter Behang	schöne, kompakte Dolden, mittlerer Behang
<b>Reifezeit</b>	spät	spät	spät	sehr spät	sehr spät	spät
<b>Klimaresilienz</b>	mittel	mittel	mittel	gut	gut	gut

Legende: +++ sehr gut; ++ gut bis sehr gut; + gut; o mittel; - gering; -- gering bis sehr gering; --- sehr gering

## 4.5 Sorten privater Züchter

	<b>Amarillo VG1</b>	<b>Akoya AKO</b>	<b>Solero SOL</b>
<b>Sortentyp</b>	Aromasorte	Aromasorte	Aromasorte
<b>Züchter</b>	US-Patent	Hopsteiner	Hopsteiner
<b>Informationen zu Sorteneigenschaften, Anbau und Braueignung</b>	HVG	<a href="https://www.hopsteiner.com/de/variety-data-sheets/Akoya/">https://www.hopsteiner.com/de/variety-data-sheets/Akoya/</a>	<a href="https://www.hopsteiner.com/de/variety-data-sheets/Solero/">https://www.hopsteiner.com/de/variety-data-sheets/Solero/</a>
<b>QR-Code zur Sortenbeschreibung</b>			

## 5 Düngung

Der bedarfsgerechte Einsatz von Makro- und Mikronährstoffen ist Grundlage für eine ausgewogene Pflanzenernährung zur Erzielung optimaler Hopfenerträge und -qualitäten und gleichzeitig von großer Relevanz für die Umwelt.

Die Düngeverordnung (DüV), die Ausführungsverordnung Düngeverordnung

(AVDüV), die Wirtschaftsdüngerverbringungsverordnung (WDüngV) und auch die Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) regeln die Anwendung und den Umgang von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

### 5.1 Rechtliche Vorgaben bei der Düngung

#### 5.1.1 Vor der Düngung

##### Berechnung der N-Obergrenze für org. Dünger (170 kg N/ha)

Mit organischen Düngern darf im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutzten Flächen eines Betriebes nur so viel Stickstoff ausgebracht werden, dass 170 kg N/ha und Jahr nicht überschritten werden. Auch Hopfenrebenhäcksel müssen in dieser Rechnung berücksichtigt werden. Hopfenbaubetriebe, die zusätzlich zum Rebhäcksel keine weiteren organischen Dünger im Betrieb haben oder aufnehmen, geraten nicht an die „170 kg Grenze“. Betriebe, die Rebhäcksel und weitere organische Dünger auf den Flächen ausbringen, sollten kontrollieren, ob die N-Obergrenze von 170 kg N/ha eingehalten wird.

Dafür steht in **Bayern** ein Excel-Berechnungsprogramm der LfL zur Verfügung.

<https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/032256/>



##### Aufzeichnungs- und Meldepflicht bei Inverkehrbringen, Befördern und Aufnehmen von Wirtschaftsdüngern:

Beim Inverkehrbringen, Befördern und Aufnehmen von **Wirtschaftsdüngern** (Mist, Gülle und Gärreste) oder **Rebhäcksel** müssen Betriebe, die von den genannten Düngern **mehr als 200 t**

**Frischmasse** abgeben oder aufnehmen, innerhalb von 1 Monat folgende Angaben dokumentieren (Lieferscheinverfahren):

- Name und Anschrift des Abgebers/ Beförderers/ Übernehmers
- Datum der Abgabe/ des Beförderns/ der Übernahme
- Wirtschaftsdüngerart bzw. Name des sonstigen Stoffes
- Menge der Frischmasse (FM) in t
- Gehalte an Stickstoff und Phosphat in kg/t FM
- Menge Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft in kg

Entsprechend § 5 der Verbringungsverordnung ist das **erstmalige** gewerbsmäßige Inverkehrbringen von **> 200 t** Wirtschaftsdüngern (**Hopfenhäcksel**) sowie von Stoffen, die als Ausgangsstoff oder Bestandteil Wirtschaftsdünger enthalten, bei der zuständigen Landwirtschaftsbehörde anzuzeigen.

Achtung! Betriebe, die Rebhäcksel an die Bioerdgasanlage liefern, können unter diese Regelung fallen.

Hopfenbaubetriebe in **Bayern** finden Informationen und Formulare zur Aufzeichnungs-, Melde- und Mitteilungspflicht unter

<https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/032104/>



Hopfenbaubetriebe in **Baden-Württemberg** finden Informationen und Formulare zur Aufzeichnungs-, Melde- und Mitteilungspflicht unter

<https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/landwirtschaft/fachinformationen/ackerbau-und-duengung/>



### **Berechnung Lagerkapazität organischer Dünger**

Damit Wirtschaftsdünger und Gärreste über die festgesetzten Zeiten gelagert werden können, müssen ausreichende Lagerkapazitäten zur Verfügung stehen. Mit dem LfL-Lagerraumprogramm kann beurteilt werden, ob der gesetzlich vorgeschriebene Lagerraum vorhanden ist. Für Hopfenrebenhäcksel, die im Herbst nach der Ernte ausgebracht werden, ist kein Lagerraum notwendig.

Weitere Informationen und Excel-Berechnungsprogramm der LfL:

<https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/032182/>



### **Zusätzliche Auflagen für den Hopfenanbau in den „Roten und Gelben Gebieten“**

Gemäß Düngeverordnung sind die Landesregierungen verpflichtet, Gebiete mit einer hohen Stickstoffbelastung des Grundwassers (sogenannte „Rote Gebiete“) oder einer Eutrophierung von Oberflächengewässern mit Phosphat (sogenannte „Gelbe Gebiete“) per Landesverordnung auszuweisen und für diese Gebiete zusätzliche Auflagen bei der Landbewirtschaftung und Düngung zu erlassen. Ob sich Flächen im „Roten oder Gelben Gebiet“ befinden, kann in iBALIS geprüft werden.

### Auflagen für Hopfen im „Roten Gebiet“:

- Reduzierung der Gesamtsumme des ermittelten Stickstoffdüngedarfs im Betriebsdurchschnitt der roten Flächen um 20 %
- die 170 kg /ha N-Obergrenze aus organischen Düngern muss schlagbezogen eingehalten werden
- Sperrfristverlängerung für Festmist von Huf- und Klautieren oder Kompost von 1. November bis 31. Januar
- Verbot der Düngung von Zwischenfrüchten ohne Futternutzung (Ausnahme für Rebenhäcksel mit Auflagen)
- Max. 120 kg N/ha über Festmist von Huf- und Klautieren oder Kompost auf Zwischenfrucht ohne Futternutzung
- Min. 3 N<sub>min</sub>-Untersuchungen im Hopfen. Für weitere Hopfenschläge oder Bewirtschaftungseinheiten muss der Mittelwert der 3 Untersuchungen verwendet werden. Wenn im Betrieb weitere Ackerkulturen angebaut werden, müssen je weiterer Kultur eine und für den Hopfen lediglich zwei N<sub>min</sub>-Untersuchungen erfolgen
- Untersuchung des im Betrieb bedeutendsten (BY) Wirtschaftsdüngers (BW: alle über 500 kg N-Anfall je Jahr) auf Gesamtstickstoff, verfügbaren Stickstoff und Phosphat

### Auflagen für Hopfen im „Gelben Gebiet“:

- Einhaltung größere Gewässerabstände bei der Ausbringung phosphathaltiger Düngemittel:  
Über die bestehenden Auflagen der DüV und der gesetzlichen Gewässerabstände hinaus ist bei einer Hangneigung von 10-15 % anstatt 5 m ein 10 m breiten Streifen ohne jegliche Phosphatdüngung einzuhalten. Im Bereich von 10 bis 30 m muss bei unbestelltem Ackerland eine sofortige Einarbeitung des P-Düngers erfolgen, wenn keine ausreichende Untersaat vorhanden ist.



### Düngebedarfsermittlung für N und P:

Vor der ersten Düngergabe muss der Düngebedarf für Stickstoff (N) und Phosphat (P) für jeden Schlag bzw. Bewirtschaftungseinheit ermittelt und schriftlich dokumentiert werden. Der berechnete Stickstoffdüngbedarf ist die standortbezogene Obergrenze, die für die Kultur während der gesamten Vegetation gilt.

Für die Berechnung notwendig sowie für den berechneten Düngebedarf entscheidend sind folgende Faktoren:

- $N_{min}$ -Wert:
  - „Grünes Gebiet“: regionale oder übergebietsliche Durchschnittswerte oder eigene Untersuchungen
  - „Rotes Gebiet“: eigene Untersuchungen
- P-Gehaltsklasse (Standardbodenuntersuchung → min. alle 6 Jahre)
- Vorfrucht, Hauptfrucht, Sortengruppe
- Zwischenfruchtanbau (Anteil Leguminosen, Winterhärte)
- org. Düngung Vorjahr (z. B. Rebenhäcksel)

- Bodenart (Humusgehalt)
- 5-jähriger Durchschnittsertrag (der Durchschnitt darf aus den besten 5 der vergangenen 6 Jahre gebildet werden)
- Strohbergung (=Rebenhäckselabfuhr)

Zur Berechnung stehen in **Bayern** ein Excel- und ein Online-Programm der LfL zur Verfügung:


<https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/027122/>



Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit wird für Hopfen das Excelprogramm empfohlen.

Bei Betrieben mit sonstigen Ackerflächen im roten Gebiet, für die kein  $N_{min}$ -Ergebnis vorliegt, muss in Bayern eine  $N_{min}$ -Simulation erfolgen, die nur im Online-Programm möglich ist.

### 5.1.2 Bei der Düngung



Hangneigung (%)	Gewässerabstand		
	keine Düngung (m)	Düngung mit Auflagen (m)	zusätzliche Anforderungen/Auflagen bei Hopfen
< 5	1 *	4	* 4 m Abstand, wenn Streubreite ≠ Arbeitsbreite
5 bis < 10 innerhalb 20 m	3 *	20	Hopfen (ohne Zwischenfrucht) = unbestellter Acker bei Düngung: entwickelte Zwischenfrucht oder sofortige Einarbeitung
10 bis < 15 innerhalb 20 m	5	20	
≥ 15 innerhalb 30 m	10	30	

Abb.: Gewässerabstände nach Düngeverordnung (§ 5)

Bei der Düngung sind folgende Ausbringungsbeschränkungen zu beachten:

- **Bodenzustand:**  
Das Aufbringen von stickstoff- oder phosphathaltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln darf nicht erfolgen, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist.
- **Gerätetechnik und Einarbeitung**  
Auf unbestelltem Ackerland (= Hopfen ohne Zwischenfrucht) sind organische Dünger innerhalb 4 h nach Beginn des Aufbringens einzuarbeiten (Hopfen ohne ausreichende Zwischenfrucht ist unbestellt!
- **Gewässerabstände** in Abhängigkeit der Hangneigung gemäß vorheriger Grafik
- **Sperrfristen** für N- und P-Dünger beachten

### **Regelung zur Ausbringung von Rebenhäcksel im Herbst:**

Eine **Ausbringung** von Hopfenrebenhäcksel im Herbst ist **bis 31. Oktober** auf allen Flächen (mit und ohne Hopfenbau, auch in den „Roten Gebieten“) möglich, **wenn**

- die mit den Rebenhäckseln ausgebrachte N-Menge maximal 120 kg/ha Gesamt-N beträgt (bei 6 kg N/t = max. 20 t/ha)
- und auf der Ausbringfläche folgender Anbau vorliegt:

### **Hopfenflächen:**

- Zwischenfrucht und natürlicher Unterbewuchs, abfrierend mit Aussaat bzw. Auflaufen bis 15.09 und Umbruch nach 15.01. oder
- Zwischenfrucht winterhart mit Aussaat bis 30.09. und Umbruch nach 15.01. (Eine Nachsaat winterharder Zwischenfrüchte nach dem 30.09. ist möglich, soweit die Sommerzwischenfrucht weitgehend erhalten bleibt.)

In Hopfenflächen muss die Zwischenfrucht zwischen zwei Hopfenreihen mindestens 1 Meter breit sein.

### **Sonstige Ackerflächen:**

- Winterraps oder Wintergetreide (z. B. WW, WG ...) mit Aussaat bis 30.09. oder
- Zwischenfrucht abfrierend mit Aussaat bis 15.09 und Umbruch nach 15.01. oder  
Zwischenfrucht winterhart mit Aussaat bis 30.09. und Umbruch nach 15.01.

### 5.1.3 Nach der Düngung

#### **Dokumentation**

Eine Düngemaßnahme muss innerhalb von zwei Tagen aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung muss folgende Informationen umfassen:

- Schlagbezeichnung
- Schlaggröße
- Düngerart
- Ausbringmenge
- Gesamtmenge des ausgebrachten N, NH<sub>4</sub>-N und P

Zur einfachen Dokumentation steht ein Erfassungsbogen von der LfL zur Verfügung:

[https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ipz/dateien/erfassungsbogen\\_duengung\\_formular.pdf](https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ipz/dateien/erfassungsbogen_duengung_formular.pdf)




Die ausgebrachten und dokumentierten Düngermengen müssen einer **jährlichen betrieblichen Gesamtsumme** aufsummiert und dem ermitteltem Düngbedarf gegenübergestellt werden.

### Bilanzierung

Seit dem Düngjahr 2020 besteht **keine Verpflichtung** mehr zur Erstellung des betrieblichen **Nährstoffvergleichs**. Die Aufbewahrungsfrist für die bereits berechneten Nährstoffbilanzen beträgt 7 Jahre.

Derzeit müssen nur bestimmte Betriebe eine **Stoffstrombilanz** erstellen. Ob aktuell schon eine Stoffstrombilanz erforderlich ist, kann dem Schema rechts entnommen werden, das bis max. 31.12.2022 gültig ist.



## 5.2 Besondere Regelungen in Baden-Württemberg

### Nitrat-Informationsdienst Baden-Württemberg

Mit Inkrafttreten der novellierten Düngerverordnung (DüV) am 02.06.2017 haben sich die Vorgaben für die N-Düngemittelbedarfsermittlung geändert. Dies wurde zum Anlass genommen, den Nitratinformationdienst (NID) in Baden-Württemberg neu zu konzipieren. Die Teilnahme ist online über die Web-Anwendung „**Düngung-BW**“

[www.duengung-bw.de](http://www.duengung-bw.de)



oder mit dem Papier-Erhebungsformular möglich. Um sich online anzumelden, werden analog zu FIONA die Registriernummer (die ersten 12 Zeichen der Unternehmensnummer) und das persönliche

Kennwort (PIN) benötigt. Papier-Erhebungsformulare inkl. der separaten Barstrichcode-Etiketten für den NID liegen bei den Landwirtschaftsämtern aus. Auf dem Erhebungsformular ist die 12-stellige Betriebsnummer anzugeben. Für die Hopfensortengruppen sowie die Düngemittel sind auf dem NID-Erhebungsformular vorgegebene Codes zu verwenden. Näheres ist unter:

<https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Nitratinformationdienst>



In **Düngung-BW** selbst ist nicht nur die Teilnahme am NID möglich. Es wird auch ein Programmmodul zur **N- bzw. P-Düngemittelbedarfsermittlung** und zur Berechnung der **Stoffstrombilanz** angeboten. Parallel zur N-Bedarfsberechnung nach

DüV wird weiterhin die bisher gebräuchliche Empfehlungsrechnung erstellt. Weiterhin können unter **Düngung BW** laufend aktualisierte Informationen abgerufen werden.

### **Einschränkungen in Wasserschutzgebieten in Baden-Württemberg**

Rechtsgrundlage: Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) vom 01.03.2001. In Baden-Württemberg werden Wasserschutzgebiete in Abhängigkeit der Nitratwerte im geförderten Wasser entweder als Normalgebiet, Problemgebiet oder Sanierungsgebiet eingruppiert. Folgende Beschränkungen und Verbote sind einzuhalten:

- **Normalgebiet**
  - Gülleausbringungsverbot in Zone II
  - Verbot von Pflanzenschutzmitteln mit W-Auflage (inkl. Terbutylazin)

- Generelles Grünlandumbruchverbot
- In **Problemgebieten** speziell für die Kultur Hopfen zusätzlich:
  - Nmin Probenahme frühestens ab 1. April
  - Als 1. Stickstoffgabe dürfen nur langsam wirkende N-Dünger (Ammoniumdünger) verwendet werden
  - Mineralische Stickstoffdüngung nur als Streifendüngung ausbringen
  - Organische Düngung nur mit Hopfenhäcksel frühestens 6 Wochen vor dem Schneiden
  - Einarbeitung der Begrünung frühestens 6 Wochen vor dem Schneiden
  - Einsaat einer winterharten Begrünung mit dem letzten Anackern

Im **Sanierungsgebiet** zusätzlich: Verbot jeglicher organischer Düngung

### **5.3 Besondere Regelungen im Anbaugebiet Elbe-Saale (TH, SN, ST)**

#### Bodenuntersuchung:

Zu Beginn der Vegetation, spätestens Mitte März, wird von jeder Hopfenanlage und jeder Sorte vom Hopfenpflanzler eine repräsentative Bodenprobe von mindestens 500 g frischem Boden aus den Schichten 0-30 cm und 30-60 cm entnommen, luftdicht in Folienbeutel verpackt, gekühlt und mit Auftrag an ein akkreditiertes Bodenuntersuchungslabor zur Nmin-Untersuchung gebracht. (Angabe: Betrieb, Kultur, Schlag, Schichttiefe). Vom Labor erhält der Landwirt den ermittelten Nmin-Gehalt in 0-90 cm Tiefe. Bei der Bodenuntersuchung bis 60 cm Tiefe (Regelfall) erfolgt eine Berechnung des Nmin-Gehaltes für 60-90 cm aus den Werten für 0-30 cm und 30-60 cm. Die Nmin-Gehaltsbestimmung sollte für jede Sorte getrennt erfolgen. Flächen mit bzw. ohne Rebenhäckselrückführung sind extra zu beproben.

#### N-Düngebedarfsermittlung:

Der N-Bedarfswert wird bei allen Sorten auf 200 kg N/ha begrenzt, bezogen auf 19 dt/ha Doldenertrag. Die N-Bedarfsermittlung berechnet sich auf der Grundlage des

Ertragsdurchschnittes der letzten drei Jahre nach folgender Formel:

200 kg N/ha Bedarf

- Nmin in 0-90 cm
- N-Nachlieferung aus dem Bodenvorrat (Humusgehalt)
- N-Nachlieferung aus organischer Düngung im Vorjahr (z. B. werden Rebenhäcksel mit 10 kg/ha berücksichtigt)
- N-Nachlieferung aus organischer Düngung laufendes Jahr
- Zwischenfruchtwirkung

= **Stickstoffdüngbedarf**

Um den unterschiedlichen Erträgen der Hopfensorten gerecht zu werden, ist eine Staffelung von 15 bis 27 dt/ha möglich. Berechnungsgrundlage für den Stickstoffbedarf ist der Ertragsdurchschnitt der letzten drei Jahre. Liegt dieser über 19 dt/ha, können je dt Mehrertrag zusätzlich 5 kg N/ha aufgebracht werden. Daraus ergibt sich ein standortbezogeneaximaler N-Bedarfswert von 240 kg N/ha. Entsprechend sind bei geringeren Erträgen 6 kg N je dt Trockenhopfenertrag abzuziehen.

Seit 2018 besteht die Möglichkeit die Düngebedarfsermittlung als standortbezogene Obergrenze für N und P im Programm BE-SyD berechnen zu lassen. Das Programm kann im Internet unter folgender Adresse heruntergeladen werden.

<https://tllr.thueringen.de/wir/software/besyd>



## 5.4 Stickstoffdüngung im Hopfen

Von den Hauptnährstoffen weist der Stickstoff auch im Hopfen den größten Einfluss auf das Wachstum, die Entwicklung und somit auf den Doldenertrag aus.

Da der Hopfen einen hohen Anspruch an die

Stickstoffversorgung hat und dieser jedoch gleichzeitig im Boden sehr verlustgefährdet ist, ist eine bedarfsgerechte und an den Aufnahmeverlauf der Hopfenpflanze angepasste Stickstoffdüngung sehr wichtig.




Abb.: Biomasseentwicklung und Stickstoffaufnahme im Vegetationsverlauf von Hopfen

Eine bedarfsgerechte Stickstoffdüngung stellt mit zunehmenden Wetterextremen eine große Herausforderung dar. Durch teilweise ausbleibende Niederschlagsereignisse ist die unmittelbare Verfügbarkeit von applizierten Nährstoffen nicht immer gewährleistet. Daher ist bei gestreuten Düngergaben immer mehr auf eine geeignete Folgewitterung zu achten.

Der Hopfen ernährt sich im Frühjahr zunächst aus dem Wurzelstock, so dass er noch keinen Stickstoffdüngungsbedarf hat. Eine Stickstoffdüngung ist also im März noch nicht notwendig und auch nicht effektiv. Die Hauptstickstoffaufnahme der Hopfenpflanze erfolgt im Juni und Juli.

N-Düngemaßnahmen sollten darauf abzielen, dass in diesem Zeitraum ausreichend Stickstoff zur Aufnahme zur Verfügung steht. Untersuchungen zeigten, dass die Ausbildung der Seitentriebe in den oberen 2/3 der Rebe einen erheblichen Einfluss auf die Ertragsbildung haben. Daher sollte zum Zeitpunkt des Seitentriebwachstums keinesfalls ein Stickstoffmangel vorliegen.

Die Aufteilung von N-Gaben mindert einerseits das Risiko von Stickstoffschüben. Andererseits ermöglicht die Aufteilung eine bedarfsgerechte und an den Aufnahmeverlauf angepasste Stickstoffdüngung.

Eine zu späte N-Düngung oder witterungsbedingt zu späte N-Verfügbarkeit kann negative Auswirkungen auf die Alphasäurebildung haben.




Abb.: Mögliche Aufteilung der Stickstoffgaben in Abhängigkeit des Entwicklungsstadiums

### Sortenunterschiede

Der Stickstoffbedarf der verschiedenen Sorten kann sowohl im zeitlichen Verlauf als auch in der absoluten Menge variieren. Der Bedarf ist stark abhängig vom standortspezifischen Ertragspotenzial einer Sorte. Der zeitliche Aufnahmeverlauf einer Sorte ist sehr eng mit ihrer Biomassebildung verknüpft. Bei Sorten mit frühem bis mittlerem Reifezeitpunkt sollte die Gabe zum Seitentriebwachstum keinesfalls zu spät erfolgen. Sorten mit später Erntereife können eine spätere 2. Gabe besser kompensieren.

### Kalkstickstoff wirkt alkalisch

Kalkstickstoff wirkt durch seinen hohen Kalkgehalt physiologisch alkalisch. Wird er nach dem Aufdecken und Schneiden ausgebracht, sind Gelbverfärbungen bzw. Schäden des Austriebes möglich. Sonderwirkungen von Kalkstickstoff auf Bodenschädlinge, Stockgesundheit und Welke konnten im Hopfen in Versuchen bisher nicht nachgewiesen werden.

### Sauer wirkende Stickstoffdünger verbessern die Verfügbarkeit der Spurenelemente

Für das Wachstum des Hopfens ist auch die Form des Stickstoffdüngers wichtig. Auf Böden mit hoher Kalkversorgung (also

hohem pH-Wert) sowie hoher Phosphatversorgung, kommt es häufig zu Spurenelementmangel (vor allem Zink), weil diese im Boden festgelegt werden. In all diesen Fällen sollen für die Stickstoffdüngung physiologisch sauer wirkende Dünger, wie z. B. schwefelsaures Ammoniak oder Ammonsulfatsalpeter verwendet werden. Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL), das beim Hopfenputzen verwendet wird, hat neben der Stickstoffdüngewirkung ebenfalls eine saure Reaktion. Ansonsten wird verbreitet Kalkammonsalpeter verwendet, der nur eine schwach saure Wirkung hat.

### Stabilisierter Ammoniumdünger

An zwei Standorten mit den Sorten Hersbrucker Spät und Hallertauer Mfr. wurde in 4 bzw. 5 Versuchsjahren die Wirkung auf Ertrag und Alphasäuren untersucht. Entec wurde in zwei Gaben, Anfang April und in der 2. Juniwoche ausgebracht, während Ammonsulfatsalpeter als Vergleichsdünger zu den 3 Zeitpunkten gemäß Empfehlung ausgebracht wurde. Die Ertrags- und Alphasäurenunterschiede waren statistisch nicht absicherbar.

Tab.: Kalkwirkung (Verlust (-) oder Gewinn (+)) in kg CaO je 100 kg Dünger bzw. Stickstoff

Dünger	Nährstoffgehalt (kg/dt)						Kalkwirkung (CaO) je 100 kg	
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	S	Dünger	Stickstoff	
	SSA	21				24	- 63	- 300
KAS	27					- 15	- 56	
ASS	26				13	- 49	- 188	
Perlka	19,8					+ 31	+ 157	
Harnstoff	46					- 46	- 100	
AHL	28					- 28	- 100	
InnoFert Hopfen	15					- 15	- 100	
Entec 26	26				13	- 48	- 185	
NP (18/46)	18	46				- 34	- 189	
NPK (13/13/21)	13	13	21		2	-12	- 92	
NPK (15/5/20)	15	5	20	2	8	-14	- 93	

Tab.: AHL und schwefelsaures Ammoniak zum Hopfenputzen sind düngewirksam und müssen bei der Bemessung der Stickstoffdüngung voll angerechnet werden

Düngermenge für 100 Liter Spritzlösung	100 Liter Spritz- lösung kg N	400 l/ha Spritz- lösung kg N/ha	600 l/ha Spritz- lösung kg N/ha	800 l/ha Spritz- lösung kg N/ha
25 kg schwefelsaures Ammoniak	5,2	21	31	42
33 kg schwefelsaures Ammoniak	6,9	28	42	56
25 l (= 32,0 kg) AHL	9,0	36	54	72
35 l (= 44,8 kg) AHL	13,0	50	75	100
50 l (= 59,8 kg) InnoFert Hopfen	9,0	36	54	72

## 5.5 Düngung mit Phosphat, Kali und Magnesium

Die Höhe der Phosphat-, Kali und Magnesiumdüngung ergibt sich aus dem

Nährstoffentzug und der Gehaltsstufe des jeweiligen Nährstoffes im Boden.

Tab.: Durchschnittlicher Nährstoffentzug des Hopfens (bei 17,5 dt/ha Basisertrag):

Nährstoff	Nährstoffgehalt in kg/100 kg Hopfen		
	Dolden	Restpflanze	Gesamt
Stickstoff (N)	3,0	4,8	7,8
Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	1,0	1,0	2,0
Kali (K <sub>2</sub> O)	2,6	4,7	7,3
Magnesium (MgO)	0,5	1,7	2,2
Calcium (CaO)	1,0	9,0	10,0

## Düngung

Für Düngemittel, die **Phosphonate** enthalten ist zu beachten, dass sich mit Inkrafttreten der EU-Düngemittelverordnung zum 16. Juli 2022 etwas ändert. Neu ist, dass Phosphonate einem EU-

Düngeprodukt nicht absichtlich zugesetzt werden dürfen und unbeabsichtigt enthaltene Phosphonate einen Massenanteil von 0,5 % nicht überschreiten dürfen.

### Hinweise für Bayern:

Tab.: Gehaltsstufen für Phosphat, Kali und Magnesium in Bayern P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und K<sub>2</sub>O nach CAL-Methode, Mg nach CaCl<sub>2</sub>-Methode

Gehaltsstufe	mg je 100 g Boden					
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> für alle Böden	leichte Böden *) 01 - 02	mittlere Böden **) 03 - 05	schwere Böden **) 06 - 08	leichte Böden 01 - 02	Mg mittlere und schwere Böden 03 - 08 ***)
A sehr niedrig	< 5	< 4	< 5	< 7	< 3	< 5
B niedrig	5 - 9	4 - 7	5 - 9	7 - 14	3 - 6	5 - 9
<b>C optimal</b>	<b>10 - 20</b>	<b>8 - 15</b>	<b>10 - 20</b>	<b>15 - 25</b>	<b>7 - 10</b>	<b>10 - 20</b>
D hoch	21 - 30	16 - 25	21 - 30	26 - 35	11 - 30	21 - 30
E sehr hoch	> 30	> 25	> 30	> 35	> 30	> 30

\*) untere Werte für Sand; obere Werte für lehmigen Sand

\*\*) untere Werte für gut strukturierte, tiefgründige, obere Werte für schlechtere Böden

\*\*\*) Bodenartenschlüssel

Tab.: Empfohlene Düngermenge in kg/ha Reinnährstoffe in Abhängigkeit von Bodengehaltsstufen, Ertragswartung und Rückführung der Rebenhäcksel in Bayern

Gehaltsstufe	1500 kg Hopfen/ha				2000 kg Hopfen/ha				3000 kg Hopfen/ha			
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O		MgO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O		MgO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O		MgO
	alle*)	leichter Boden 01 - 02	mittlerer+ schwerer Boden 03 - 08	alle*)	alle*)	leichter Boden 01 - 02	mittlerer+ schwerer Boden 03 - 08	alle*)	alle*)	leichter Boden 01 - 02	mittlerer+ schwerer Boden 03 - 08	alle*)
<b>Bedarf der Gesamtpflanze <sup>1)</sup></b>												
A sehr niedrig <sup>2)</sup>	90	150	185	93	100	186	221	104	120	259	294	126
B niedrig <sup>2)</sup>	90	150	185	63	100	186	221	74	120	259	294	96
<b>C optimal</b>	<b>30</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>66</b>
D hoch <sup>3)</sup>	15	55	55	0	20	73	73	0	30	110	110	0
E sehr hoch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bedarf der Dolden bei Rückführung der Rebenhäcksel <sup>1)</sup></b>												
A sehr niedrig <sup>2)</sup>	75	79	114	68	80	92	127	70	90	118	153	75
B niedrig <sup>2)</sup>	75	79	114	38	80	92	127	40	90	118	153	45
<b>C optimal</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>15</b>
D hoch <sup>3)</sup>	7	19	19	0	10	26	26	0	15	39	39	0
E sehr hoch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) nach Bodenartenschlüssel

<sup>1)</sup> Grundlage der Düngempfehlung ab Herbst 2008

<sup>2)</sup> Entzug (C) + Zuschläge

<sup>3)</sup> ½ Entzug (C)



## Hinweise für Baden-Württemberg:

Tab.: Gehaltsstufen für Phosphat (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), Kalium (K<sub>2</sub>O) und Magnesium (Mg) von Mineralböden in Baden-Württemberg

Gehaltsstufe	mg je 100 g Boden						
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O Böden			Mg Böden		
		leicht	mittel	schwer	leicht	mittel	schwer
A sehr gering	< 6	< 8	< 8	< 10	< 3	< 6	< 8
B niedrig	6 - 9	8 - 14	8 - 4	10 - 19	3 - 6	6 - 12	8 - 14
<b>C optimal</b>	<b>10 - 20</b>	<b>15 - 20</b>	<b>15 - 30</b>	<b>20 - 35</b>	<b>7 - 10</b>	<b>13 - 20</b>	<b>15 - 25</b>
D hoch	21 - 34	21 - 30	31 - 40	36 - 50	11 - 15	21 - 30	26 - 40
E sehr hoch	> 34	> 30	> 40	> 50	> 15	> 30	> 40

Tab.: Empfohlene Düngermenge für Phosphat, Kalium und Magnesium in Abhängigkeit von Bodengehaltsstufe und Ertragserwartung in Baden-Württemberg

Gehaltsstufe	1500 kg Hopfen/ha			2000 kg Hopfen/ha			2500 kg Hopfen/ha		
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO
A sehr niedrig	120	210	93	130	246	104	140	283	115
B niedrig	70	160	63	80	196	74	90	233	85
<b>C optimal</b>	<b>30</b>	<b>110</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>146</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>183</b>	<b>55</b>
D hoch	15	55	17	20	73	22	25	92	28
E sehr hoch	Keine Düngung								

## Hinweise für Elbe-Saale:

Tab.: Gehaltsstufen zur Einstufung von Hopfenböden für Phosphor, Kalium, Magnesium in mg je 100 g Boden und pH-Wert im Anbaubereich Elbe-Saale

Gehaltsstufen	CAL-Methode				CaCl <sub>2</sub> -Methode	pH-Wert
	P	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K	K <sub>2</sub> O	Mg	
A sehr niedrig	< 2,5	< 6	< 6	< 7	< 4,1	< 5,3
B niedrig	2,5 - 4,8	6 - 10	6 - 10	7 - 12	4,1 - 7,5	5,3 - 6,2
<b>C optimal</b>	<b>4,9 - 7,2</b>	<b>11 - 16</b>	<b>11 - 16</b>	<b>13 - 20</b>	<b>7,6 - 11,0</b>	<b>6,3 - 7,0</b>
D hoch	7,3 - 10,4	17 - 23	17 - 25	21 - 30	11,1 - 14,5	7,1 - 7,4
E sehr hoch	> 10,4	> 23	> 25	> 30	> 14,5	> 7,4

Tab.: Empfohlene Düngermenge an Phosphor, Kalium und Magnesium in kg/ha u. Jahr (Element- bzw. Oxidwert) bei unterschiedlicher Ertragserwartung nach Richtwerten (Entzug der Gesamtpflanze) des TLLR und der LLG

Gehaltsstufe	Ertragserwartung																	
	1500 kg Hopfen/ha						2000 kg Hopfen/ha						2500 kg Hopfen/ha					
	P	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K	K <sub>2</sub> O	Mg	MgO	P	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K	K <sub>2</sub> O	Mg	MgO	P	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K	K <sub>2</sub> O	Mg	MgO
A sehr niedrig	63	145	191	230	50	83	68	155	221	266	57	94	72	165	252	303	63	105
B niedrig	38	87	141	170	35	58	43	97	171	206	42	69	47	107	202	243	48	80
<b>C optimal</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>91</b>	<b>110</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>121</b>	<b>146</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>152</b>	<b>183</b>	<b>37</b>	<b>62</b>
D hoch	9	21	56	68	-	-	14	31	86	104	-	-	18	41	117	141	-	-
E sehr hoch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.6 Kalkdüngung

Eine geringe Kalkversorgung hat eine schlechtere Bodenstruktur, eine verminderte Nährstoffwirkung der mineralischen und organischen Dünger und eine Versauerung des Bodens zur Folge. Die Höhe der Kalkgaben ist in der Düngeempfehlung zur Bodenuntersuchung angegeben. Sie richtet sich nach dem Humusgehalt, der Bodenart und dem pH-Wert aus der Bodenuntersuchung. Bei hoher Kalkversorgung wird empfohlen, keine kalkhaltigen Dünger einzusetzen, um eine pH-Anhebung, verbunden mit einer Festlegung von Spurenelementen, zu verhindern.

Bei einer Kalkversorgung unter dem optimalen pH-Bereich ist zusätzlich zur Erhaltungskalkung eine Gesundungskalkung erforderlich. Die Höhe ist dem BU-Ergebnis zu entnehmen. Die in der Tabelle angegebene jährliche Höchstgabe sollte dabei nicht überschritten werden, um eine zu rasche pH-Anhebung zu vermeiden. Die Erhaltungskalkung kann entfallen, wenn im optimalen pH-Bereich freier Kalk (Nachweis mit 10 %iger Salzsäure) vorhanden ist.

Die Kalkdüngung wird in dt CaO/ha angegeben. Im Hopfenbau soll bevorzugt Kohlensäurer Magnesiumkalk bzw. Kohlensäurer Kalk (47-53 % CaO) eingesetzt werden. Auf

schweren Böden kann auch Branntkalk ausgebracht werden.

Umrechnungsfaktoren:

$$\begin{aligned} \dots \% \text{CaCO}_3 & \times 0,56 & = & \dots \% \text{CaO} \\ \dots \% \text{MgCO}_3 & \times 0,478 & = & \dots \% \text{MgO} \end{aligned}$$

Die Wirkung von Kalkdüngern ist unterschiedlich:

- je feiner die Vermahlung, desto schneller ist die Wirkung
- bei gleichem Vermahlungsgrad wirkt Ca-Oxid (Branntkalk) schneller als Ca-Carbonat (z. B. Kohlensäurer Kalk) und dieses schneller als Ca-Silikat (Hüttenkalk)
- magnesiumhaltige Kohlensäure Kalke wirken in der Regel langsamer als Mg-freie Kalke

Im **Anbaugbiet Tettngang** werden auf allen Böden nicht Branntkalk, sondern Kohlensäure Kalke empfohlen.

Im **Anbaugbiet Elbe-Saale** liegen die meisten Hopfenböden Thüringens, Ost-sachsens und Sachsen-Anhalts im pH-Wert über 6,5, so dass auf diesen Böden nur eine Erhaltungskalkung notwendig ist oder die Kalkung ganz unterbleiben kann.

Tab.: Anzustrebender pH-Wert und Kalkdüngung bei Hopfen

Bodenart	Bodenarten-schlüssel	pH-Klasse C optimal (anzustreben)	Erhaltungskalkung für 3 Jahre dt CaO/ha	Gesundungskalkung	
				bei pH-Wert	jährliche Höchstgabe dt CaO/ha
Sand	01	5,0 - 5,4	7	< 5,0	10
schwach lehmiger Sand	02	5,5 - 5,9	12	< 5,5	15
stark lehmiger Sand sandiger Lehm schluffiger Lehm (Lößlehm)	03 - 05	6,0 - 6,4	17	< 6,0	25
toniger Lehm bis Ton	06 - 08	6,5 - 6,8	20	<6,5	30

## 5.7 Schwefeldüngung

Der Schwefelentzug einer durchschnittlichen Hopfenernte beträgt 12 kg S/ha. Die Verfügbarkeit von Schwefel ist für Kulturen günstig, die ihre Hauptwachstumsphase in der Zeit der größten Mineralisation (Mai bis August) haben, dazu gehört neben Mais und Rüben auch der Hopfen.

Aus diesen Erkenntnissen sowie den vorliegenden Versuchsergebnissen ist im Hopfen nur in den seltensten Fällen eine gezielte Schwefeldüngung notwendig.

## 5.8 Düngung mit Spurenelementen

Im Hopfen treten des Öfteren Wachstumsstörungen auf, die auf eine Unterversorgung mit bestimmten Spurenelementen zurückzuführen sind. Häufig betroffen sind sandige bzw. anmoorige Böden, insbesondere aber Böden, deren pH-Wert über 7,0 liegt. Bei sehr hohen Phosphat-Gehalten oder bei

### 5.8.1 Zink

Zinkmangel tritt v. a. bei hohem pH-Wert und bei Überversorgung mit Phosphat auf. Der Wuchs der Pflanze ist gestaucht, die Blätter werden hellgrün, wölben sich und drehen sich nach oben auf. Bekannt ist die Mangelerkrankung unter dem Namen „Kräuselkrankheit“.

Tab.: Richtwerte für Zinkgehalte (mg/kg Boden) und Düngeempfehlung (nach CAT)

Gehaltsstufe	mg Zn/kg Boden	Bodendüngung kg Zn/ha und Jahr
A	< 1,1	2,0 – 2,8 *)
C	1,1 - 3,0	1,4 – 2,0 *)
E	> 3,0	-

\*) die geringere Menge für leichte Böden, die höhere Menge für mittlere und schwere Böden

Der Schwefelbedarf wird im Allgemeinen mit den üblichen organischen und mineralischen Düngungsmaßnahmen gedeckt.

Tab: Beispiele:

Dünger	Nährstoffgehalt %	Düngung kg/ha	S kg/ha
SSA	21 % N, 24 % S	50 N	57
ASS	26 % N, 13 % S	50 N	25
NPKMgS	15-5-20-2-8 %	50 N	27
Kornkali	40 % K <sub>2</sub> O, 4 % S	146 K <sub>2</sub> O	15
Patentkali	30 % K <sub>2</sub> O, 17 % S	146 K <sub>2</sub> O	83

Trockenheit kann die Verfügbarkeit von Spurenelementen auch eingeschränkt sein. Bei diesen Bedingungen sind Untersuchungen auf Spurenelemente zu empfehlen. Zeigen die Bodenuntersuchungen einen ungenügenden Vorrat oder eine geringe Verfügbarkeit an, ist eine Düngung mit Spurennährstoffen erforderlich.

Akute Mangelerkrankungen sollten durch Blattbehandlungen mit Zinksulfat (0,1-0,15 %) oder Zinkchelat (z. B. 0,4 % Folicin Zink oder 0,5 % Librel Zink) behoben werden. Um eine Wirkung zu erzielen, müssen vom Anleiten bis zur Blüte 3-5 Spritzungen durchgeführt werden. Versuche haben gezeigt, dass vorbeugend eine ausreichende Zinkversorgung auch über eine Düngung des Bodens z. B. auch mit Excello 331 im 3-jährigen Turnus (nicht auf Böden mit extrem hohem pH-Wert) oder mit wasserlöslichen/teilwasserlöslichen Spurenelementmischungen möglich ist.

Langfristig ist es aber wichtig, dass der Phosphatgehalt und der pH-Wert auf die optimalen Bereiche zurückgeführt werden.

Tab.: Richtwerte für Zinkgehalte im Anbau-  
gebiet Elbe-Saale (nach TLLLR)

Gehalts- stufe	mg Zn/kg Boden	Düngeempfehlung kg Zn/ha	
		Blattdün- gung	Bodendüngung (3-jährig)
<b>A</b>	< 1,5	3	10
<b>C</b>	1,5 - 3,0	-	-
<b>E</b>	> 3,0	-	-

(nach Trierweiler/Lindsay oder CAT-Methode)

Bei Vorliegen der Gehaltsklasse C werden bei nachgewiesenem Düngebedarf (ungünstige Bedingungen für die Zn-Aufnahme, z. B. bei sehr hohem pH-Wert im Boden, laut Ergebnis der Pflanzenanalyse) dieselben Zn-Düngermengen wie bei Gehaltsklasse A empfohlen.

### 5.8.2 Bor

Bormangel tritt besonders in trockenen Jahren auf kalk-reichen (pH-Wert über 7,0), stark tonhaltigen oder auch sandigen Böden auf. Dabei werden die Triebspitzen stumpf, verfärben sich rötlich und wachsen nicht mehr weiter. Bei latentem Mangel sind die Blätter satt grün und wölben sich nach unten. Im späteren Verlauf treten gelbe Blattränder auf. Die Bordüngung

richtet sich nach dem Borgehalt des Bodens und der Bodenart. Die Gefahr der Überdüngung mit Bor ist groß und führt zu Gelbverfärbungen am Hopfen. Eine Düngung sollte daher nur bei Bedarf erfolgen. Neben borhaltigen Einzel- und Mehrnährstoffdüngern stehen spezielle Bordünger zur Bodendüngung als auch zur Blattapplikation zur Verfügung.

### Gehaltsstufen im Boden und empfohlene Düngung

Tab.: Richtwerte für Borgehalte (mg/kg Boden) in Mineralböden (nach CAT)

Gehalts- stufe	Bodenart/Bodenartenschlüssel				Düngeempfehlung g Bor/ha u. Jahr	
	S 01	I'S 02	IS 03	sL – T 04 bis 08	leichte Böden 01 + 02	mittlere und schwere Böden 03-06
<b>pH-Wert ≤ 6,0 *)</b>						
A	< 0,10	< 0,12	< 0,15	< 0,20	400	500
<b>C</b>	<b>0,10 bis 0,30</b>	<b>0,12 bis 0,40</b>	<b>0,15 bis 0,50</b>	<b>0,20 bis 0,60</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
E	> 0,30	> 0,40	> 0,50	> 0,60	-	-
<b>pH-Wert &gt; 6,0</b>						
A	< 0,15	< 0,20	< 0,25	< 0,35	400	500
<b>C</b>	<b>0,15 bis 0,40</b>	<b>0,20 bis 0,60</b>	<b>0,25 bis 0,80</b>	<b>0,35 bis 1,0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
E	> 0,40	> 0,60	> 0,80	> 1,0	-	-

\*) Die CAT-Methode ist für die Untersuchung von Böden mit einem pH-Wert < 5 auf den Borgehalt nicht geeignet. Es wird daher empfohlen, erst ein Jahr nach erfolgter Aufkalkung die Bodenuntersuchung nach der CAT-Methode durchzuführen.

Tab.: Richtwerte für Bor-Gehalte im Anbaugebiet Elbe-Saale (nach TLLLR) (Heißwasser- oder CAT-Methode):

Gehaltsklasse	mg B/kg Boden		Düngeempfehlung kg B/ha	
	BG 3	BG 4 + 5	Blattdüngung BG 3 – 5	Bodendüngung BG 3 – 5
A (sehr niedrig/niedrig)	< 0,25	< 0,35	0,4	2,3
C (mittel/optimal)	0,25 – 0,40	0,35 – 0,60	-	-
E (hoch/sehr hoch)	> 0,40	> 0,60	-	-

Die Richtwerte für Bor nach CAT-Methode gelten für Böden mit pH > 6,0.

Bei Vorliegen der Gehaltsklasse C werden bei nachgewiesenem Düngebedarf (ungünstige Bedingungen für die Bor-Aufnahme z.B. bei sehr hohem pH-Wert im Boden, laut Ergebnis der Pflanzenanalyse) dieselben Bor-Düngermengen wie bei Gehaltsklasse A empfohlen.

Die Düngermengen für die Bodendüngung beziehen sich auf eine Wirkungsdauer von 3 Jahren.

### 5.8.3 Bodendüngung von Spurenelementen

**Wenn im Vorjahr Spurenelementmangel aufgetreten ist, sollte eine Bodendüngung im April nach dem Schneiden vorgenommen werden.**

Vorsicht bei Frostgefahr: Bei Kombination dieser Maßnahme im April mit Pflanzenschutzmitteln sind Austriebverätzungen möglich.

**normale pH-Werte:**

- Excello 331 (Metalllegierung)

- Spurennährstoffmischung teilwasserlöslich bzw. wasserlöslich (z. B. Hopfenkraft Typ Boden oder Hopfenkraft Micromix)

**überhöhte pH-Werte:**

- grundsätzlich saure Stickstoffdünger
- Spurennährstoffmischung teilwasserlöslich bzw. wasserlöslich (z. B. Hopfenkraft Typ Boden oder Hopfenkraft Micromix)

### 5.8.4 Blattdüngung von Spurenelementen

- **Boden- bzw. erste Blattspritzung**  
Die erste Spurennährstoffdüngung im April erfolgt ausschließlich mit Unterstock-spritzeinrichtungen!

Mit Handabspritzrohren wird eine Überdosis in den Zentralbereich des Stockes abgegeben.

Vorsicht! Bei Benetzung des Austriebs in Verbindung mit Nachtfrost!

Tab.: Wassermenge und Konzentration bei der ersten Blattspritzung, z. B. 400 l/ha

Spurennährstoffdünger	Nährstoffgehalt %	Konzentration %	Reinnährstoffe g/ha	Düngermenge kg/ha
Zinksulfat oder Borsalz	22 17	0,15 0,1	132 68	0,6 0,4
<b>Ausbringung in Kombination</b>				
Zinksulfat + Borsalz	22 17	0,1 0,05	88 34	0,4 0,2

Eine Wiederholung der Spritzung Mitte Mai ist sinnvoll. Die Konzentration von Einzelnährstoffen bzw. Kombinationen soll 0,15 % nicht überschreiten.

• **Zumischung beim chemischen Hopfenputzen**

Beim chemischen Hopfenputzen ab 2 m Wuchshöhe des Hopfens können

Spurennährstoffe zugemischt werden. Nur mit Unterstockspritzeinrichtungen ausbringen! Mit Handabspritzrohren wird eine Überdosis in den Zentralbereich des Stockes abgegeben.

Tab.: Wassermenge und Konzentration beim chemischen Hopfenputzen, z. B. 500 l/ha

Spurennährstoffdünger	Nährstoffgehalt %	Konzentration %	Reinnährstoffe g/ha	Düngermenge kg/ha
Zinksulfat oder Borsalz	22 17	0,5 0,3	550 255	2,5 1,5
<b>Ausbringung in Kombination</b>				
Zinksulfat + Borsalz	22 17	0,3 0,2	330 170	1,5 1,0

**Anmerkung:** Die Nährsalze haben in dieser hohen Konzentration herbizide, also verätzende Wirkung!

• **Blattdüngung als Zusatz bei Pflanzenschutzspritzungen**

Konzentration 0,05–0,15 %; 3-5 Anwendungen bis zur Blüte sind notwendig. Keine Anwendung in Kombination mit

Aliette WG, Karate Zeon (siehe Gebrauchsanleitungen). Fortress im Eimer anrühren und als erstes ins Fass geben (Ausflockungsgefahr in Verbindung mit Metallen).

Tab.: Bedeutende Spurennährstoffdünger im Hopfenbau

Spurennährstoffdünger	Nährstoffgehalt in %						Bodendüngung kg/ha	Blattdüngung l/ha bzw. %	Bemerkungen
	MgO	Zn	B	Mn	Si	S			
Excello 331 (Metalllegierung)	11,8	3,0	1,0	3,0			200 <sup>1)</sup>		Ausbringung: Nach dem Schneiden in die Stockreihen streuen. Band ca. 2 m
Hopfenkraft Typ Boden <sup>3)</sup> (teilwasserlöslich)	8,8	3,5	1,0	1,0	10	3,0	150-200 <sup>2)</sup>		nach dem Schneiden breit streuen
Hopfenkraft Micromix <sup>3)</sup> (teilwasserlöslich)	14,4	7,0	1,5	2,0	6,6	11,7	60 <sup>1)</sup>		Ausbringung: Nach dem Schneiden zwischen den Stöcken auf die Stockreihen streuen. Band ca. 1 m breit.
Foliarel Bor flüssig			10,9					0,1 %	ab Ende April 3-4 Blattapplik. bis zur Blüte
Foriarel QS			21					0,05 %	ab Ende April 3-4 Blattapplik. bis zur Blüte
FOLIFLO BZn		18	9					0,6-0,7	ab Ende April 3-4 Blattapplik. bis zur Blüte
Folicin-Zn flüssig (Chelat)		9,0						max. 0,4 %	3-5 Anwendungen bis zur Blüte
Lebosol-Zink-Chelat		6,0						0,5 %	3-5 Anwendungen bis zur Blüte
Librel-Zink-Chelat		13,3						2-3 l	3-5 Anwendungen bis zur Blüte
Zinksulfat		35						0,15 %	2-3 Blattapplikationen bis zur Blüte
BVG Bordünger 17,4			17,4					0,1 %	bei Bedarf
DüKa-Bor 150 flüssig			11,0					0,1 %	3-5 Anwendungen bis zur Blüte
Folicin-Bor flüssig		0,25	10,5					0,1 %	3-5 Anwendungen bis zur Blüte
Librel Bor			10,0					1,5-2,25 l	3-5 Anwendungen bis zur Blüte
Lebosol Bor			11,0					0,1 %	3-5 Anwendungen bis zur Blüte
Solubor DF			17,4					0,1 %	2-3 Anwendungen bis Beginn Blüte
Fetrilon Combi	3,3	1,5	0,5	4,0				0,1 %	2-3 Anwendungen bis Beginn Blüte
EPSO Microtop	15,0		0,9	1,0		12,4		2 %	2-3 Anw. v. Beginn Blüte - Beg. Ausdoldung
EPSO TOP	16,0					13,0		2 %	2-3 Anw. v. Beginn Blüte - Beg. Ausdoldung
EPSO Combitop	13,0	1,0		4,0		13,6		2 %	2-3 Anw. v. Beginn Blüte - Beg. Ausdoldung

<sup>1)</sup> für 3 Jahre i.d.R. ausreichend

<sup>2)</sup> Ausbringung jedes 2. Jahr

<sup>3)</sup> davon 1 % wasserlösliches Zink.; davon 0,2 % wasserlösliches Bor

## 5.9 Organische Düngung

Organische Dünger kann man in flüssige (bis 15 % TS) und feste unterteilen. Alle organischen Dünger enthalten neben Pflanzennährstoffen auch einen hohen Anteil an org. Substanz. Diese dient als Nahrung für die Bodenlebewesen, erhöht

somit die biologische Aktivität der Böden und ist Ausgangsstoff für die Humusbildung. Der Humus verbessert die Bodenfruchtbarkeit, indem er das Wasser- und Nährstoffbindevermögen und die Bodenstruktur positiv beeinflusst.

Tab.: Nährstoffgehalte von ausgewählten organischen Düngern zum Zeitpunkt der Ausbringung (kg/m<sup>3</sup> oder t) inkl. der anrechenbaren gasförmigen N-Verluste im Stall und Lager

Organischer Dünger (Einheit)	TS %	Nährstoffgehalte in kg/t bzw. m <sup>3</sup> in der FM					
		N <sub>gesamt</sub>	NH <sub>4</sub> -N	% Mindest- wirksamkeit v. Gesamt-N <sup>4)</sup>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO
<b>Mist (t)</b>				gültig für Acker/Hopfen			
Rind (geringe Einstreu)	18,5	3,7	0,37	25	2,5	5,9	1,9
Rind (hohe Einstreu)	23	4,1	0,41	25	2,1	8,1	1,7
Hühnermist	50	20,3	9,14	45	16	18	6,9
Hühnerkot	50	22,1	9,95	60	17,5	18,9	7,5
Schwein (geringe Einstreu)	21	6,0	0,6	30	4,3	6,2	2,0
Schwein (hohe Einstreu)	25	5,2	0,52	30	2,9	7,0	1,5
Pferdemist	30	3,6	0,36	25	2,7	9,3	1,9
<b>Gülle (m<sup>3</sup>)</b>							
Milchvieh – Acker	7,5	3,9	1,95	60	1,7	4,7	1,2
Mastbullen	7,5	4,1	2,05	60	1,9	4,0	1,0
Mastschweine							
Standardfutter	5,0	5,7	3,42	70	3,0	3,5	1,3
N-, P-reduziert	5,0	5,5	3,30	70	2,6	3,4	1,2
Stark N-, P-reduziert	5,0	5,0	3,00	70	2,4	3,3	1,2
Zuchtsauen (mit Ferkel)							
Standardfutter	5,0	4,6	2,76	70	2,5	2,9	1,0
N-, P-reduziert	5,0	4,1	2,46	70	2,2	2,7	1,0
Stark N- P-reduziert	5,0	3,9	2,34	70	2,1	2,7	1,0
<b>Hopfenrestpflanze (t)</b>							
Rebenhäcksel <sup>5)</sup>	27	6,0	-	10	1,3	5,9	2,1
<b>Kompost (t)</b>							
Grüngut	60	6,6	0,7	11	3,9	5,1	8,2
Bioabfall <sup>3)</sup>	60	8,5	0,9	11	5,4	7,9	10,0
<b>Biogas-Gärrest (m<sup>3</sup> bzw. t) <sup>1)</sup></b>							
Biogerdgasanlage Hallertau <sup>2)</sup>							
flüssige Phase	8,6	6,8	3,1	60	1,1	5,1	0,9
feste Phase	24,8	6,1	2,5	30	1,2	4,7	3,2

1) Nach Düngeverordnung muss auch bei Eigenverwertung mindestens eine Gärrestuntersuchung vorliegen. Für die Düngebedarfsermittlung sind die Nährstoffgehalte aus eigenen Untersuchungsergebnissen oder bei Aufnahme betriebsfremder org. Dünger aus den Lieferscheinen zu entnehmen.

2) Ø Nährstoffgehalte der BEH (Bio-Erdgasanlage Hallertau) vom Frühjahr 2021

3) Wegen möglicher CBC-Viroid-Infektion wird von der Verwertung in Hopfengärten abgeraten.

4) Wenn der Prozentanteil des Ammoniums (NH<sub>4</sub>-N) am Gesamt-N-Gehalt höher ist als die Mindestwirksamkeit nach Anlage 3 DüV, ist der prozentuale Ammoniumanteil als Wirksamkeit anzusetzen.

5) In den roten Gebieten sind die Nährstoffgehalte aus der eignen Rebenhäckseluntersuchung zu verwenden, soweit Rebenhäcksel der bedeutendste Wirtschaftsdünger (in BW ab 500 kg N-Anfall) im Betrieb ist.



Auch die zurückgeführten Rebenhäcksel sind organische Dünger. Die darin enthaltenen Nährstoffe müssen wie bei allen anderen org. Düngern auch bei der Düngebedarfsermittlung, bei der betrieblichen Obergrenze (170 kg N/ha) und im Nährstoffvergleich angerechnet werden.

Von 1 ha Ertragshopfen mit  $\varnothing$  17,5 dt Ertrag fallen durchschnittlich 140 dt Rebenhäcksel mit einem Nährstoffgehalt von 84 kg Gesamt-N, 18 kg  $P_2O_5$ , 83 kg  $K_2O$  und 29 kg MgO an.

### Nährstoffwirkung:

Für die **Verfügbarkeit des Stickstoffs** im Anwendungsjahr gibt die Düngeverordnung Mindestwirksamkeiten (s. vorherige Tabelle) vor, mit denen auch in der Düngebedarfsermittlung gerechnet werden muss. Diese Werte entsprechen im Wesentlichen den Ammoniumgehalten der Düngemittel.

Die Verfügbarkeit des in der organischen Substanz gebundenen Stickstoffs ist unterschiedlich. Ein kleiner Teil wird relativ

schnell mineralisiert und steht den Kulturen noch im Ausbringungsjahr zur Verfügung. Dieser Stickstoff ist bereits in den Mindestwirksamkeiten berücksichtigt.

Der in der organischen Substanz gebundene Stickstoff wird sehr langsam mineralisiert, je nach Witterung und Bodenbearbeitungsintensität ist mit Freisetzungsraten von 1-3 % des Gesamtstickstoffs pro Jahr zu rechnen. Eine fortlaufende Zufuhr organischer Dünger führt zu einer Humusanreicherung im Boden, mit der Folge einer langsam ansteigenden N-Freisetzung. Bei der Düngebedarfsermittlung muss diese Nachlieferung mit 10 % des im Vorjahr ausgebrachten organischen Stickstoffs berücksichtigt werden.

Die in den organischen Düngern enthaltenen **Phosphat- und Kalimengen** sind in ihrer Wirkung langfristig denen der mineralischen Dünger gleichwertig und somit bei der Düngebedarfsermittlung zu 100 % anzusetzen.

## 5.10 Gesteinsmehle, Bodenhilfsstoffe

Ein hoher Anteil unserer Erdrinde besteht aus Silikaten. Aus der natürlichen Silikatverwitterung werden hohe Mengen Kieselsäure freigesetzt und von der Pflanze als Strukturelement ins Gewebe eingebaut. Mengenmäßig übertrifft das die Phosphataufnahme. Dauerkulturen mit einer guten Durchwurzelung, wie Hopfen, können immer ausreichende Mengen Kieselsäure aufnehmen, so dass eine zusätz-

liche Kieselsäuredüngung überflüssig ist.

Bei Bodenhilfsstoffen und Gesteinsmehlen wird der Siliziumgehalt in der Regel in Prozent  $SiO_2$  angegeben und irreführend als Kieselsäure bezeichnet. Dieses Silikat stammt zum größten Teil aus Quarz, Feldspat und Tonmineralen und kann erst nach Umwandlung in die wasserlösliche Form von den Pflanzen aufgenommen werden.

## 5.11 Bodenuntersuchungen

Kenntnisse über die Nährstoffdynamik und -gehalte im Boden sind unerlässlich für einen erfolgreichen Hopfenbau. Zur Untersuchung von Makro- und Mikronährstoffen sowie physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften stehen verschiedene Untersuchungsmethoden zur Verfügung.

Seitens der Düngeverordnung werden zur Ermittlung des mineralisch verfügbaren Stickstoffs im Boden lediglich die Nmin-

Untersuchung und die EUF-Methode anerkannt.

Alle 6 Jahre muss eine Untersuchung auf pflanzenverfügbares Phosphat erfolgen. Dabei empfiehlt es sich aus fachlicher Sicht bei der Bodenuntersuchung auch den pH-Wert, den Kaligehalt und den Magnesiumgehalt des Bodens bestimmen zu lassen (sog. Standardbodenuntersuchung).

### 5.11.1 N<sub>min</sub>-Untersuchung

Der **N<sub>min</sub>-Wert** ist der zu Vegetationsbeginn verfügbare mineralische Stickstoff im durchwurzelten Bereich des Bodens und wird vom Stickstoffbedarfswert abgezogen. Da der mineralisierte Stickstoff jährlich starken Schwankungen unterliegt, ist eine Bodenuntersuchung im Frühjahr unerlässlich.

In **Bayern** erfolgt die N<sub>min</sub>-Untersuchung im Hopfen auf 0-90 cm Tiefe und wird in der Zeit von Ende Februar bis Anfang April vom Hopfenring über die Ringwarte angeboten.

Für Flächen, von denen keine eigenen N<sub>min</sub>-Untersuchungen vorliegen, müssen für die N-Bedarfsermittlung vergleichbare N<sub>min</sub>-Werte herangezogen:

In den nicht nitratgefährdeten Gebieten hat der Landwirt die Wahl zwischen dem Durchschnitt aus den eigenen N<sub>min</sub>-Untersuchungen und den regionalen

Durchschnittswerten der aml. Beratung, die als vorläufige und endgültige regionalisierte N<sub>min</sub>-Werte über Ringfax bekannt gegeben werden. Wenn der endgültige N<sub>min</sub>-Wert um mehr als 10 kg N/ha höher als der vorläufige N<sub>min</sub>-Wert ist, muss die Düngebedarfsermittlung noch einmal angepasst werden.

Betriebe mit Hopfenanbau in den „**Roten Gebieten**“ müssen in Bayern mind. 3 Hopfenschläge auf N<sub>min</sub> untersuchen lassen und in Baden-Württemberg jede einheitliche Bewirtschaftungseinheit. Liegen weitere Hopfenflächen im roten Gebiet, muss der betriebliche N<sub>min</sub>-Durchschnittswert auf die anderen Flächen übertragen werden.

Der Probenahmezeitraum für die N<sub>min</sub>-Untersuchung im Hopfen liegt im Bereich von Anfang Februar bis Anfang April und wird jährlich bekannt gegeben.

#### Anleitung zur Bodenprobenahme für mineralischen Stickstoff (N<sub>min</sub>) im Hopfen




Abb.: Schema der N<sub>min</sub>-Einstiche

- bei einheitlichem Boden je Hopfengarten und Sorte eine Mischproben entnehmen
- mindestens 10 Einstiche bis 90 cm Tiefe (Bayern) im gedüngten Bereich, verteilt über die gesamte Fläche machen
- Bohrstock erst nach Erreichen der 90 cm drehen
- ungenügend gefüllte Bohrnut verwerfen
- organische Partikel in der Bodenprobe vermeiden
- Bodenprobe mischen und gesamte Menge in den Probenahmebeutel geben
- Bodenproben sofort kühlen und bei 2-3°C aufbewahren

### 5.11.2 Standardboden-Untersuchung

Günstig für die Probenahme sowohl auf Acker als auch auf Grünland ist der Zeitraum von Herbst bis zum zeitigen Frühjahr vor der Düngung. Darüber hinaus empfiehlt es sich, bei der Standardbodenuntersuchung stets etwa den gleichen Zeitpunkt im Jahr und möglichst gleiche Bedingungen (Bodenfeuchte, Witterung) zu wählen, um natürliche Schwankungen des pH-Werts, des P- und des K-Gehaltes

möglichst gering zu halten. Eine in mehrjährigem Abstand durchgeführte Bodenuntersuchung lässt erkennen, ob die Düngep Praxis zu einem Ansteigen oder Abfallen der Nährstoffversorgung der Böden führt. Dies ist besonders wichtig für Betriebe, die betriebsfremde organische Dünger, u. a. auch Kompost oder Gärprodukte verwenden.

### Anleitung zur Probenahme für die Standardbodenuntersuchung im Hopfen




Abb.: Schema der Probenahme

#### Erklärungen:

- bei einheitlichem Boden je Hopfengarten und Sorte eine Mischprobe entnehmen
- bei unterschiedlichem Boden mit Wachstumsunterschieden aus den Problembereichen separate Mischproben entnehmen
- Probenahme im Bifangbereich 15-20 cm tief bzw. nach dem Schneiden auch im Zwischenbereich
- je Mischprobe mindestens 15 Einstiche repräsentativ verteilt vornehmen
- Feldrandbereich nicht beproben
- Probe gut durchmischen und in Tüte geben

#### 5.11.3 EUF-Methode

Mit der Elektro-Ultrafiltrations-Methode werden neben den sofort verfügbaren auch die während der Vegetationsperiode nachlieferbaren Mengen an Stickstoff, Phosphat sowie weiterer Nährstoffe bestimmt. Die Probenahme erfolgt dabei im

Herbst des Vorjahres (Oktober bis November) auf einer Tiefe von 25-30 cm nach dem gleichen Schema wie bei der Nmin-Beprobung. Für die Probenlagerung und den -transport ist hierbei keine Kühlkette erforderlich.

#### 5.11.4 Ringwarte und Organisation der Probenahme

##### **Landkreis Pfaffenhofen**

Ostler Christian  
Kysostr. 30  
85301 Schweitenkirchen, OT Geisenhausen  
Tel. 08441/871417, Fax 871416  
Handy 0160/97507604  
E-Mail: costler@red-iq.de

##### **Landkreis Kelheim**

###### **Nmin-Untersuchungen (Hopfen und Acker) bei Hopfenbaubetrieben**

Huber Josef  
Oberwangenbach 18,  
84091 Attenhofen  
Tel. 08753/518, Fax 08753/910111  
Handy 0171/4741326  
E-Mail: huberj@hallertau.net

##### **Landkreis Landshut**

Schwojer Verena  
Landsbergerstr. 282  
80687 München

Handy 0175/9319639  
E-Mail: verena.schwojer@lkpbayern.de

##### **Landkreis Neuburg-Schrobenhausen**

Wolf Martin  
Stefanstr. 24,  
86666 Burgheim, OT Ortlfing  
Tel. 08432/1781, Fax 920946  
Handy 0160/95131917

##### **Landkreis Weißenburg/Gunzenhausen**

Börlein Erwin  
Stopfenheim, Römerweg 1  
91792 Ellingen  
Tel. 09141/71411, Fax 922914

##### **Landkreis Freising**

Loibl Veronika  
Brandstadlweg 31  
85399 Hallbergmoos  
Handy 0176/62629825  
E-Mail: veronika.loibl@outlook.com

##### **Landkreis Kelheim**

###### **Standard-Untersuchungen bei allen Betrieben und Nmin Acker bei Nicht-Hopfenbaubetrieben**

Paul Holzner  
Eggldorf 1a  
84076 Pfeffenhausen  
Tel. 08782/9787120  
Mobil 0171-7965472  
E-Mail: Ringwart.Kelh.Holzner@gmx.de

##### **Landkreis Eichstätt**

Hundsdorfer Georg  
St.-Sixtus-Weg 3,  
85095 Dörndorf  
Tel. + Fax 08466/1263  
Handy 0176/63747466  
E-Mail: georg-hundsdorfer@t-online.de

##### **Landkreis Roth**

Link Gerhard  
Fischhaus 9  
91183 Abenberg, OT Dürrenmungenau  
Tel. 09873/355, Fax 948962  
Handy 0170/4848227  
E-Mail: g\_link@t-online.de

##### **Landkreis Nürnberger Land**

Weiß Helmut  
Kneippstr. 9,  
91217 Hersbruck  
Tel. 09151/905760  
Handy 0171/7178643  
E-Mail: helmut-h.weiss@t-online.de

Die Bodenprobenahme wird **in Bayern** über die Ringwarte organisiert und kann durch die Mitgliedschaft bei einem Erzeuger-Verband verbilligt werden. Die Bodenproben werden nach Überbringung der Tüten und Stecher unter Anleitung des Ringwartes vom Landwirt selbst gezogen und anschließend vom Ringwart abgeholt. Leihgeräte zur maschinellen Probenahme bzw. die komplette Bodenprobenahme werden gegen Gebühr angeboten.

Für die eigenständige Bodenprobenahme stellen im **Anbaugebiet Tettang** die Landwirtschaftsämter der jeweiligen Landratsämter kostenlos Bohrstöcke zur Ausleihe bereit. Als privater Anbieter kann die Bodenprobenahme bei Herrn Gerhard Traub, Lindberghstr. 5 88074 Meckenbeuren (Tel. 0170/1806852) in Auftrag gegeben werden.

## 6 Pflanzenschutz

### 6.1 Gute fachliche Praxis und integrierter Pflanzenschutz

#### 6.1.1 Integrierter Pflanzenschutz im Hopfen

Pflanzenschutz darf nur nach guter fachlicher Praxis durchgeführt werden. Diese umfasst insbesondere die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes und ist seit 2014 für alle Mitgliedsstaaten der EU verpflichtend.

Definiert wird der integrierte Pflanzenschutz als „eine Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung **chemischer Pflanzenschutzmaßnahmen auf das notwendige Maß** beschränkt wird“.

Die **allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes** sind im Anhang III der EU-Richtlinie 2009/128 (Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden) beschrieben und umfassen **8 Punkte**:

1. Die Vorbeugung und/oder Bekämpfung von Schadorganismen sollte neben anderen Optionen insbesondere wie folgt erreicht oder unterstützt werden:
  - Fruchtfolge (z. B. Anbaupause nach Rodung, Zwischenfruchtanbau)
  - Anwendung geeigneter Kultivierungsverfahren (z. B. angepasste Bodenbearbeitung und Hopfenpflegemaßnahmen)
  - Verwendung von gesundem Pflanzgut resistenter bzw. toleranter Sorten
  - Anwendung ausgewogener Dünge-, Kalkungs- und Bewässerungs-/Drainageverfahren
  - Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Schadorganismen durch Hygienemaßnahmen (z. B. durch regelmäßiges Reinigen der Maschinen und Geräte)

- Schutz und Förderung wichtiger Nutzorganismen, z. B. durch geeignete Pflanzenschutzmaßnahmen oder Förderung der Biodiversität.

Zur Förderung natürlicher Regelmechanismen und mehr Artenvielfalt wurde letztes Jahr in **Baden-Württemberg** das sogenannte Biodiversitätsstärkungsgesetz verabschiedet:

<https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/biodiversitaet-und-landnutzung/biodiversitaetsgesetz/>



2. Schadorganismen müssen mit geeigneten Methoden und Instrumenten überwacht werden (z. B. regelmäßige Bestandkontrollen, Nutzung von Prognosemodellen und Beachtung von Warndiensthinweisen, Einholung von Ratschlägen beruflich qualifizierter Berater).
3. Bekämpfungsentscheidung auf der Grundlage der Schaderregerüberwachung und Schadschwellenüberschreitung
4. Bevorzugung nichtchemischer Pflanzenschutzmaßnahmen, wenn sich mit ihnen ein zufrieden stellendes Ergebnis bei der Bekämpfung von Schadorganismen erzielen lässt.
5. Die eingesetzten chemischen Pflanzenschutzmittel müssen so zielartenspezifisch wie möglich sein und die geringsten Nebenwirkungen auf die menschliche Gesundheit, Nichtzielorganismen und die Umwelt haben.
6. Die Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist auf das notwendige Maß zu begrenzen (z. B. durch Verringerung der Aufwand-

menge, verringerte Anwendungshäufigkeit oder Teilflächenanwendung).

7. Anwendung verfügbarer Resistenzvermeidungsstrategien, um die Wirksamkeit der Produkte zu erhalten (z. B. Wirkstoffwechsel)
8. Erfolgskontrolle und Dokumentation der angewandten Pflanzenschutzmaßnahmen

Zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2009/128 in Deutschland wurde 2013 ein **nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP)** beschlossen. Eine Maßnahme darin ist die Erarbeitung sogenannter kultur- oder sektorspezifischer Leitlinien für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, in denen die 8 allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes für einzelne Kulturen wie z. B. den Hopfen detailliert beschrieben werden sollen.

Seit Februar 2020 sind die **„Leitlinien zum integrierten Pflanzenschutz im Hopfenanbau“** in den Anhang 1 des NAP aufgenommen und bilden somit den Handlungsrahmen für den Pflanzenschutz im Hopfenanbau nach guter fachlicher Praxis für ganz Deutschland.

<https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien-ips/>



Um die Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes in den Betrieben einerseits voranzubringen und andererseits – wie von der EU gefordert – überprüfen zu können, wurde von den Bundesländern unter Federführung des Landes Baden-Württemberg die Broschüre **„Die allgemeinen Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes – Hilfe zur Umsetzung und Dokumentation“** erstellt.

Broschüre:

<https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/grundsätze-ips>



Diese Broschüre enthält einen einseitigen **Fragebogen**, der vom Betrieb auszufüllen und bei einer Überprüfung vorzulegen ist.

Fragebogen:

[www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ips/dateien/fragebogen\\_integrierter\\_pflanzenschutz\\_neu.pdf](http://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ips/dateien/fragebogen_integrierter_pflanzenschutz_neu.pdf)



### 6.1.2 Sachkundenachweis als Grundvoraussetzung

Wer Pflanzenschutzmittel anwendet, abgibt oder über die Anwendung berät, muss über die hierfür **erforderliche Sachkunde** verfügen. Personen, die entsprechende Ausbildungs- und Befähigungsnachweise erbringen können, wird auf Antrag ein Nachweis der Sachkunde von den zuständigen Behörden der Bundesländer in Form einer Kunststoffkarte ausgestellt.

Sachkundige Personen sind zudem verpflichtet, jeweils innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren eine anerkannte Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme wahrzunehmen. Für bereits vor dem 14.02.2012

Sachkundige („Altsachkundige“) erstreckt sich der erneute 3-Jahreszeitraum für eine Fortbildung vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2024. Wer nach dem 14.02.2012 die Sachkunde erlangt hat, orientiert sich am Beginn des Fortbildungszeitraumes, der auf der Rückseite des Sachkundenachweises angegeben ist.

Seit dem 26. November 2015 dürfen Pflanzenschutzmittel an berufliche Anwender nur gegen Vorlage des neuen Sachkundenachweises abgegeben werden.

### 6.1.3 Pflanzenschutzgerätekontrolle

**Ab 2021** müssen aufgebaute oder schleppergetragene **Granulatstreuer**, stationäre und mobile **Beizgeräte** (ab 5 kg Chargengröße oder mit kontinuierlicher Beizung) sowie schleppergetragene oder von einer Person geschobene oder gezogene **Streichgeräte** und **Bodenentseuchungsgeräte** ebenfalls im Rahmen der Pflanzenschutzgerätekontrolle geprüft werden. Im Hopfenbau betrifft dies vor allem die Ausbringung von Schneckenkorn. Soll beispielsweise Schneckenkorn mit einem geeigneten Düngerstreuer ausgebracht werden, so benötigt dieses Gerät für die Verwendung als Granulatstreuer eine gültige Prüfplakette.

Die Pflanzenschutzgerätekontrolle hat im Turnus von 3 Jahren stattzufinden. Sie beinhaltet alle Pflanzenschutzgeräte (Gebläsespritze, Abspritzgeräte, Granulatstreuer...) die im Hopfen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln verwendet werden. Davon ausgenommen sind lediglich tragbare Geräte (z. B. Rückenspritzen, Legeflinten...). Die Prüfung erfolgt in amtlich anerkannten Kontrollwerkstätten. Zur Pflichtkontrolle dürfen nur innen und außen gut gereinigte Geräte vorgefahren werden. Pflanzenschutzgeräte müssen mit Leitungswasser gefüllt und Granulatstreuer trocken zur Kontrolle erscheinen.

Auch alle verwendeten Düsensätze sind zu überprüfen! Falls die Gebläsespritze auch für Gießbehandlungen zum Hopfenputzen oder zur Unkrautbekämpfung eingesetzt wird, sind die dafür verwendeten Sprühlanzen und Unterstockspritzgestänge mit den dazugehörigen Anschlüssen, Leitungen und Düsen ebenfalls zu überprüfen (Dichtheit, voll ausgebildeter Spritzstrahl, gleicher Düsenausstoß rechts und links, kein Nachtropfen). Das Ergebnis der Prüfungen wird vom Prüfmonteur auf dem Kontrollbogen im Feld „Bemerkungen“ eingetragen und dient als Nachweis bei Anwendungskontrollen.

Geräte mit defekten Schutzeinrichtungen z. B. an der Gelenkwelle oder am Gebläseschutz dürfen erst nach Behebung der Mängel zur Prüfung angenommen werden.

Termine für die Prüfung der Pflanzenschutzgeräte sind bei den anerkannten Kontrollstellen (z. B. Landmaschinenwerkstätten) zu erfragen.

Nähere Informationen finden Sie auf folgender Webseite unter dem Punkt „Grundlagen“

<https://www.lfl.bayern.de/ips/geraete-technik/030128/index.php>



### 6.1.4 Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen

Für Anwender von Pflanzenschutzmitteln besteht eine Aufzeichnungspflicht zur Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen, die im Rahmen der CC-Kontrollen überprüft wird.

Folgende Punkte sind für jede Bewirtschaftungseinheit (Schlag) aufzuzeichnen:

- **Anwendungsdatum**
- **Anwendungsgebiet** (Kultur)

- **Jeweilige Anwendungsfläche** (Schlag, Feldstück oder Bewirtschaftungseinheit, Teilfläche)
- verwendete **Pflanzenschutzmittel** (vollständiger Name)
- **Aufwandmenge** (in kg/ha oder l/ha)
- **Name des Anwenders**

Der Erfassungsbogen Pflanzenschutz im Hopfen (s. Kapitel Dokumentationssysteme) deckt alle geforderten Punkte ab.

Die Aufzeichnungen sind **3 Jahre aufzubewahren**. Beginn der Frist ist immer der 1. Januar des auf die Anwendung

folgenden Jahres. Aufzeichnungen von 2021 müssen z. B. bis Ende 2024 aufbewahrt werden.

### 6.1.5 Zulassung und Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln

**Nur zugelassene bzw. genehmigte Pflanzenschutzmittel dürfen eingesetzt werden.**

Pflanzenschutzmittel dürfen nur in den ausgewiesenen Anwendungsgebieten (Kultur, Schaderreger) und unter Einhaltung der angegebenen Anwendungsbestimmungen eingesetzt werden. Anwendungen in anderen Gebieten sind verboten und Verstöße bußgeldbewehrt. Mittel, die in anderen Kulturen zugelassen sind, dürfen nicht im Hopfen eingesetzt werden, auch wenn sie den gleichen Wirkstoff wie ein für Hopfen zugelassenes Mittel haben. Zulassungsbehörde ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln soll für eine Harmonisierung der Bewertung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in der EU sorgen. Für die erleichterte gegenseitige Anerkennung von Zulassungen ist die EU in drei Zonen eingeteilt. Prüfung und Bewertung sollen in einem zonalen Verfahren innerhalb der gleichen Zone erfolgen. Die Zulassung selbst wird national erteilt. Die Umsetzung in das deutsche Pflanzenschutzgesetz erfolgt im § 28 PflSchG zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln.

Für die **Zulassungen nach Art. 51 EU-VO** (ehemals Genehmigungen nach § 18 a PflSchG) gilt weiterhin, dass ein

Pflanzenschutzmittel mit einer anderen Indikation für „eine geringfügige Anwendung“ (z. B. Hopfen) zugelassen werden kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- eine Hauptzulassung des Mittels ist in Deutschland vorhanden
- mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Pflanzenverträglichkeit liegen allein in der Verantwortung des Anwenders
- für die Aufbrauchfrist gilt dieselbe Regelung wie bei der Hauptzulassung
- die Zulassung kann auch gegen den Willen des Zulassungsinhabers erfolgen, aufgrund öffentlichen Interesses.

Beim Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln in besonderen Fällen nach § 29 PflSchG, auf der Grundlage des **Art. 53 EU-VO** „Notfallsituationen“, wird vom BVL auf Antrag ein Mittel zugelassen, wenn eine Notfallsituation für die Bekämpfung bestimmter Schadorganismen festgestellt wird und kein anderes ausreichend wirksames Mittel verfügbar ist. Diese Anwendung gilt für max. 120 Tage und es besteht keine Aufbrauchfrist. Auch hier gilt: Das Risiko bei möglichen Schäden trägt dabei der Anwender. Der Hersteller übernimmt in diesem Fall keine Haftung. In der Gebrauchsanleitung ist die Kultur Hopfen mit der entsprechenden Indikation in der Regel nicht zu finden und ist daher vom Abgeber beizufügen.

### 6.1.6 Einschränkungen seitens der Hopfenvermarkter

Trotz bestehender Zulassungen oder Genehmigungen kann die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der Hopfenhandelsfirma eingeschränkt sein. Beispiel

hierfür ist der Exporthopfen in die USA, nach Japan, Korea oder China.

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Bedeutung des Pflanzenschutzmittelbogens hingewiesen, der bei den Firmen



und in den Verarbeitungswerken die Grundlage für die Zusammenstellung größerer Hopfenpartien bildet. Nicht angegebene Pflanzenschutzmittel oder fehlerhafte Eintragungen können im Extremfall aufgrund unerlaubter Rückstände zur

Verunreinigung größerer Partien und enormen finanziellen Schäden führen.

**Korrekte Angaben im Pflanzenschutzmittelbogen sind daher unerlässlich!**

### 6.1.7 Sachgerechte Lagerung chemischer Pflanzenschutzmittel und Aufbrauchfrist

Nach den Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes ist die Lagerung von PSM zeitlich und mengenmäßig auf das notwendige Minimum zu begrenzen.

Die Aufbewahrung hat in einem absperrbaren Schrank oder Raum zu erfolgen.

Zum Schutz des Grundwassers sind Vorkehrungen zu treffen, dass eine direkte Ableitung von PSM aus dem Lager nicht stattfinden kann.

Nicht mehr zugelassene PSM sind spätestens nach Ende der Aufbrauchfrist einer fachgerechten Entsorgung (z. B. über die Problemmüllsammelstellen) zuzuführen.

Nach dem Ende der regulären Zulassung gilt für den Handel eine Abverkaufsfrist

von 6 Monaten und für den Anwender eine **Aufbrauchfrist** von maximal 18 Monate (inklusive der 6 Monate Abverkauf). Zum Beispiel: Systane 20 EW: Zulassungsende 31.05.21 bedeutet Abverkauf bis 30.11.21 und Aufbrauchfrist bis 30.11.22. Das BVL behält sich jedoch eine Einzelfallentscheidung für jedes auslaufende Pflanzenschutzmittel vor, weshalb nicht standardmäßig von einer 18monatigen Aufbrauchfrist ausgegangen werden kann. Zum Beispiel: Buctril: Zulassungsende 17.03.2021 und Ende Abverkaufs- u. Aufbrauchfrist 17.09.2021.

Seit 2012 besteht für viele Pflanzenschutzmittel, die nicht mehr angewendet werden dürfen, eine **Entsorgungspflicht!**

### 6.1.8 Import von Pflanzenschutzmitteln

Der gemeinsame Binnenmarkt schafft die Rahmenbedingungen für den freien Warenverkehr zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Speziell bei Pflanzenschutzmitteln ist aber zu beachten, dass weiterhin eine nationale Zulassung erforderlich ist. Dies ändert sich auch durch die Einführung der „zonalen Bewertung“ nicht.

Ein Pflanzenschutzmittel, das in einem Mitgliedstaat zugelassen ist, kann nach Deutschland eingeführt werden, wenn es mit einem in Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmittel übereinstimmt und eine Genehmigung zum Parallelhandel (GP) erteilt wurde. Diese Genehmigung ist beim BVL zu beantragen. Eine Liste der gültigen Genehmigungen für den Parallelhandel ist abrufbar unter folgenden Link:

[https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04\\_Pflanzenschutzmittel/genuehmigungen\\_parallelhandel.html?nn=11030674](https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/genuehmigungen_parallelhandel.html?nn=11030674)



Die Genehmigung wird nur dem Antragsteller für den Import des beantragten Pflanzenschutzmittels aus dem jeweiligen Mitgliedstaat erteilt.

Parallel gehandelte Pflanzenschutzmittel müssen mit dem GP-Namen, der GP-Nummer und sämtlichen Pflichtangaben des deutschen Referenzprodukts gekennzeichnet sein.

Voraussetzungen für Handel und Import von Pflanzenschutzmitteln sind die **Produkt- und Herstelleridentität.**

Nachgebaute Produkte (Generika), die keine eigene Zulassung aufweisen, dürfen auch bei identischem Wirkstoff gehandelt noch angewandt werden. Die Haftung bei Schäden nach Anwendung von Generika liegt beim Anwender.

Auch beim Import von Pflanzenschutzmitteln für die Anwendung im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb muss zuvor vom

### 6.1.9 Definition: Pflanzenschutzmittel

Zu den Pflanzenschutzmitteln zählen Mittel zur Unkrautbekämpfung (Herbizide), Mittel gegen Pilzkrankheiten (Fungizide) und Mittel gegen Schadinsekten (Insektizide). Darüber hinaus gibt es Pflanzenschutzmittel gegen Milben, Fadenwürmer, Schnecken und Nagetiere. Auch Keimhemmungsmittel und andere Wachstumsregler gelten rechtlich als Pflanzenschutzmittel.

Das Pflanzenschutzrecht macht keine grundsätzliche Unterscheidung zwischen synthetischen Pflanzenschutzmitteln,

### 6.1.10 Definition: Grundstoffe

Grundstoffe sind Stoffe oder Gemische, die nicht in erster Linie für den Pflanzenschutz verwendet werden, aber dennoch für den Pflanzenschutz von Nutzen sind. Der Einsatz erfordert keine Zulassung durch das BVL. Dennoch benötigen Grundstoffe eine Genehmigung. Diese erfolgt auf Grundlage des Beurteilungsberichts der Europäischen Kommission. Die zulässigen Anwendungen sind in diesem Beurteilungsbericht geregelt. Im Zweifelsfall sollte die Rückstandsrelevanz mit dem Handelspartner abgeklärt werden.

### 6.1.11 Definition: Pflanzenstärkungsmittel

Pflanzenstärkungsmittel sind Stoffe, Gemische oder Mikroorganismen, die ausschließlich dazu bestimmt sind, allgemein der Gesunderhaltung der Pflanzen zu dienen oder Pflanzen vor nichtparasitären Beeinträchtigungen zu schützen.

Landwirt eine Genehmigung für den Parallelhandel beantragt werden. Ein Sammelbezug für mehrere Betriebe ist dabei nicht zulässig.

Der Import von Pflanzenschutzmitteln aus einem Drittland (nicht EU-Land) durch Landwirte oder den Landhandel ist nicht möglich.

Naturstoffen und Mikroorganismen; denn auch Naturstoffe und Mikroorganismen können Risiken bergen. Die Besonderheiten dieser Gruppen werden aber im Zulassungsverfahren berücksichtigt. Schädlingsbekämpfungsmittel, die außerhalb der Landwirtschaft eingesetzt werden, z. B. Mittel gegen Hygieneschädlinge oder Holzschutzmittel gelten nicht als Pflanzenschutzmittel, sondern fallen in der EU als sogenannte Biozidprodukte in einen eigenen Rechtsbereich. Pflanzenschutzmittel benötigen eine Zulassung durch das BVL.

Die Liste der genehmigten Grundstoffe ist unter folgendem Link abrufbar:

[https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04\\_Pflanzenschutzmittel/04\\_Anwender/02\\_AnwendungGrundstoffe/psm\\_AnwendungGrundstoffe\\_node.html](https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/04_Anwender/02_AnwendungGrundstoffe/psm_AnwendungGrundstoffe_node.html)



Wachstums im Vordergrund stehen, sind eher als Pflanzenhilfsmittel oder Bodenhilfsstoffe einzuordnen. Diese Produktgruppen unterliegen dem Düngemittelrecht.

Das BVL führt die Pflanzenstärkungsmittel, deren Inverkehrbringen nicht untersagt wurde, in einer Liste. Diese Liste finden Sie unter folgenden Link:

[https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04\\_Pflanzenschutzmittel/PflStM\\_liste.html](https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/PflStM_liste.html)



Die Aufnahme eines Pflanzenstärkungsmittels in diese Liste erfolgt nach der Prüfung im BVL; die Verkehrsfähigkeit besteht aber schon mit dem Eingang der Mitteilung beim BVL. Es können also Pflanzenstärkungsmittel rechtmäßig in Verkehr sein,

#### 6.1.12 Biostimulanzien

Ein Pflanzen-Biostimulans ist ein EU-Düngerprodukt, das dazu dient, pflanzliche Ernährungsprozesse unabhängig vom Nährstoffgehalt des Produkts zu stimulieren, wobei ausschließlich auf die Verbesserung eines oder mehrerer der folgenden Merkmale der Pflanze oder der Rhizosphäre der Pflanze abgezielt wird: Effizienz der Nährstoffverwertung, Toleranz gegenüber abiotischem Stress, Qualitätsmerkmale oder Verfügbarkeit von im Boden oder in der Rhizosphäre enthaltenen

#### 6.1.13 FiBL – Betriebsmittelliste

Das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) ist Herausgeber der „Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland“. Die fachliche Kompetenz des FiBL wird in der EU und in der Schweiz von Fachgremien geschätzt.

In der „deutschen Betriebsmittelliste“ sind Handelsprodukte aufgeführt, die in der

die noch nicht in dieser Liste aufgeführt sind.

Damit das Inverkehrbringen vom BVL nicht untersagt wird, dürfen die Mittel keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier, das Grundwasser und den Naturhaushalt haben. Eine Prüfung der Wirkung ist nicht erforderlich. Im Zweifelsfall sollte die Rückstandsrelevanz mit dem Handelspartner abgeklärt werden.

Wird vom Hersteller eines Pflanzenstärkungsmittels eine Pflanzenschutzwirkung ausgelobt (direkte Wirkung des Produktes gegen einen Schaderreger oder Schädling), muss im Einzelfall geklärt werden, ob dieses Produkt nach Definition tatsächlich ein Pflanzenstärkungsmittel ist. Produkte mit direkter Wirkung gegen einen Schaderreger sind Pflanzenschutzmittel. Diese benötigen eine Zulassung.

Nährstoffen. Biostimulanzien müssen die auf dem Etikett angegebenen Wirkungen für die dort genannten Pflanzen besitzen.

Das Spektrum der Biostimulanzien besteht aus verschiedenen Verbindungen und Stoffen (z. B. Aminosäuren, Humin- und Fulvosäuren, naturchemische Verbindungen und Pflanzen- und Seetang-Extrakte) sowie Mikroorganismen.

ökologischen Landwirtschaft (Düngung, Pflanzenschutz und Pflanzenstärkung, Reinigung und Desinfektion, Parasitenbekämpfung und Fütterung von Nutztieren) eingesetzt werden. Der FiBL Deutschland e.V., mit Sitz in Frankfurt, ist ein gemeinnütziger Verein. **Die Betriebsmittelliste stellt kein amtliches Dokument dar.**

Die Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland finden Sie unter folgenden Link:

<https://www.betriebsmittelliste.de/bml-startseite.html>



### 6.1.14 Offizielle Liste für PSM im ökologischen Landbau

Damit Produkte aus dem Segment Pflanzenschutzmittel in Deutschland im ökologischen Hopfenbau eingesetzt werden dürfen, müssen Sie vom BVL in der Liste „Zugelassene Pflanzenschutzmittel - Auswahl für den ökologischen Landbau nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007“ geführt werden.

Die offizielle Liste für Pflanzenschutzmittel

für den ökologischen Landbau finden Sie unter folgenden Link:

[https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04\\_Pflanzenschutzmittel/psm\\_oekoliste-DE.html?nn=11031326](https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/psm_oekoliste-DE.html?nn=11031326)



### 6.1.15 Vermeidung von Gewässerverunreinigung beim Befüllen und Reinigen von Pflanzenschutzgeräten

#### **Befüllen von Pflanzenschutzgeräten**

Bei der Wasserentnahme aus Gewässern oder aus der Wasserleitung für das Befüllen der Spritzgeräte ist darauf zu achten, dass der Füllschlauch keine direkte Verbindung mit der Spritzbrühe hat. Durch einen entstehenden Unterdruck im Saugschlauch oder Leitungsnetz könnte ansonsten Spritzbrühe aus dem Behälter zurück in das Gewässer oder in die Wasserleitung gelangen.

Weiterführende Informationen finden Sie im LfL Merkblatt „Sachgerechte Befüllung und Reinigung von Pflanzenschutzgeräten“ unter folgendem Link:

<https://www.lfl.bayern.de/ips/geraetetechnik/175675/index.ph>



#### **Entleeren und Reinigen nicht auf dem befestigten Hofplatz!**

Das Öffnen, Entleeren und Reinigen der Pflanzenschutzmittelbehälter, sowie das Reinigen kontaminierter Geräte und Fahrzeuge, darf nicht auf befestigten Plätzen mit Abflussmöglichkeiten in die

Kanalisation oder in Oberflächengewässer stattfinden. Auch die Öl- und Schmutzabscheider an der Tankstelle oder am Waschplatz können Sie nicht verwenden, weil hier die Mittel nicht zurückgehalten werden. Auch kleinste Verschmutzungen dürfen Sie nur dort säubern, wo die Mittel bestimmungsgemäß hingehören: auf den Acker.

**Eine Belastung des Abwassers muss unbedingt verhindert werden, es dürfen keine Pflanzenschutzmittelreste in die Kanalisation gelangen!**

Die Nachrüstung des Pflanzenschutzgerätes mit einer „**Kontinuierlichen Innenreinigung**“ erhöht den Reinigungskomfort und verbessert die Reinigungsleistung bei erheblich geringerem Zeit- und Wasseraufwand!

**Weitere Vorsichtsmaßnahmen und Reinigungshinweise:**

- **Umweltgefährdung bei der Dosierung der PSM vermeiden**
  - Einspülschleuse verringert Gefahr des Verschüttens von PSM
  - Leere Gebinde sofort spülen

- Systeme zur Gebindereinigung oder Kanisterspülung anschaffen / nachrüsten
- **Täglich nach Beendigung der Spritzarbeiten**
  - Sprühgerät im Hopfengarten leer sprühen
  - zur Hälfte mit Wasser füllen
  - mit Rührwerk durchspülen
  - im Hopfengarten mit Frischwasser alle Spritzleitungen, Düsen und Filter spülen
  - Sprühgerät mit Restwasser stehen lassen
- **Innenreinigung während der Saison nur, wenn**
  - Sprühgerät vorher zum Hopfenputzen (Herbizideinsatz) verwendet wurde
  - Einschränkungen hinsichtlich der Vermarktung bestehen (Einhaltung von Exportnormen)
  - Pflanzenschutzgerät auch in anderen Kulturen (z. B. Obstbau) eingesetzt wird

- **Pflanzenschutzgeräte nicht im Freien stehen lassen**
- **Außen- und Innenreinigung nur am Ende der Saison**

#### **Außenreinigung im Hopfengarten**

- Sprühgerät mit 300 l Wasser befüllen
- Reinigung mittels Schlauchanschluss mit Waschbürste oder Hochdruckreiniger im Hopfengarten oder bewachsener Fläche.

#### **Innenreinigung**

- Sprühgerät im Hopfengarten leer sprühen und mit 300 l Wasser befüllen
- Für die gründliche Reinigung der Behälterinnenwand sind Reinigungsmittel zu empfehlen
- Rührwerk mindestens 5 Minuten laufen lassen (spülen)
- im Hopfengarten leer sprühen
- Innenreinigungsdüsen mit Frischwasser ausspülen und im Hopfengarten leer sprühen

#### 6.1.16 Überbetrieblicher Einsatz von Pflanzenschutzgeräten (privat oder über Maschinenring)

Werden Pflanzenschutzmaßnahmen regelmäßig für andere Betriebe (außer gelegentlicher Nachbarschaftshilfe) durchgeführt, so ist diese Tätigkeit nach § 10 Pflanzenschutzgesetz bei der jeweiligen Landesstelle anzuzeigen.

Für **Bayern** LfL-Institut für Pflanzenschutz (IPS), Lange Point 10, 85354 Freising

Das **Meldeformular** finden Sie unter folgenden Link:

<https://www.formularserver.bayern.de/inteliform/forms/rzsued/stmelf/stmelf/Pflanzenschutz/index>



Für **Baden-Württemberg**: Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen

#### 6.1.17 Ausbringung nur auf Nutzflächen (z. B. Hopfengärten) erlaubt

Pflanzenschutzmittel dürfen nur auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen ausgebracht werden. Das Abspritzen von z. B.

Wegrainen, Uferrandstreifen und Ähnlichem ist verboten. Ebenso ist die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in oder unmittelbar an Gewässern verboten.

### 6.1.18 Reihen-/Bandbehandlung

Bei Pflanzenschutzmitteln beziehen sich die in der Zulassung bzw. Genehmigung festgelegten Aufwandmengen auf die zu behandelnde Fläche. Wenn nur eine Teilfläche (z. B. bei Reihen- oder Bandbehandlung) gespritzt/behandelt wird, darf nur die jeweilige zugelassene bzw. genehmigte Aufwandmenge pro Hektar behandelter Fläche verbraucht werden.

Wird z. B. beim Hopfenputzen nur der Bifang (ca. ein Drittel der Gesamtfläche) besprüht, darf deshalb nur ein Drittel der Hektaraufwandmenge je Hektar Hopfengarten ausgebracht werden.

#### Beispiel:

Quickdown	Produktmenge (l/ha)	Wasseraufwand (l/ha)
Zugelassene Aufwandmenge	0,3	1200
Tatsächl. Aufwandmenge (1/3 bei Reihenbehandlung)	0,1	400

### 6.1.19 Anwendungsbestimmungen/Auflagen

Anwendungsbestimmungen und weitere Auflagen werden bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durch das BVL festgelegt oder ergeben sich aus der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung.

Zugelassene Pflanzenschutzmittel dürfen zum Zeitpunkt der Ausbringung nur in den in der Zulassung festgesetzten, jeweils gültigen Anwendungsgebieten sowie gemäß der in der Zulassung festgesetzten, jeweils aktuell gültigen Anwendungsbestimmungen eingesetzt werden! Maßgeblich ist also die zum Ausbringungszeitpunkt gültige Gebrauchsanleitung. Sie informiert u. a. über alle zu beachtenden

Auflagen und Anwendungsbestimmungen. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die zum Anwendungszeitpunkt geltende Gebrauchsanweisung verwendet. Das ist besonders bei Mitteln, die bereits im Vorjahr gekauft wurden, von Bedeutung. Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die Bestimmungen der aktuellen Gebrauchsanleitung unbedingt zu beachten. Verstöße gegen die Anwendungsbestimmungen sind bußgeldbewehrt!

Verstöße gegen Auflagen können bußgeldbewehrt sein!

#### 6.1.19.1 Auflagen zum Schutz von Gewässern

##### Gewässerrandstreifen

Aufgrund der Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes und des Bundes-Wasserhaushaltsgesetzes gilt in einer Breite von mindestens 5 m von der Böschungsoberkante (bzw. Uferlinie) das Verbot der garten- oder ackerbaulichen Nutzung entlang fließender oder stehender Gewässer. Auf Flächen, die zu diesen Gewässern auf den ersten 20 m eine Hangneigung über 5 % aufweisen, ist innerhalb eines Abstandes von 5 Metern ab der Böschungsoberkante eine

geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke zu erhalten oder herzustellen.

##### Anwendungsbestimmungen beim Pflanzenschutz

Auch bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln werden bestimmte Abstände zum Gewässer als Anwendungsbestimmungen festgelegt, damit eine Abdrift in Oberflächengewässer verhindert wird und so der Schutz der Wasserorganismen sichergestellt ist. Im Wesentlichen kann

man vier Gruppen von Abstandsauflagen zu Gewässern unterscheiden:

- **Feste Abstände** laut Gebrauchsanleitung sind einzuhalten, wenn keine abdriftmindernde Technik eingesetzt wird.
- **Anwendung nur mit verlustmindernder Technik und Einhaltung bestimmter Abstände** möglich.

Gebläsespritzen: Mit TurboDrop-Düsen und Abdeckblech sowie 2x einseitiges Sprühen am Feldrand wird im Hopfen eine Abdriftminderung von 90 % erreicht.

Abspritzdüsen: Auf Seite 114 ist eine Übersicht von geeigneten Düsen dargestellt, die mit 90 % Verlustminderung zur Anwendung im Hopfen anerkannt sind.

- **Landesspezifische Mindestabstände zu Oberflächengewässern**

Bundesland	Mindestabstand (ab Böschungsoberkante)
Bayern	5 m zur Uferlinie

Baden-Württemberg	5 m zu Gewässern von wasserwirtschaftlicher Bedeutung
Sachsen	5 m
Sachsen-Anhalt	1 m
Thüringen	5 (10) m

Die Abstandsauflagen der zugelassenen Pflanzenschutzmittel sind in der jeweiligen Gebrauchsanleitung und in der nachfolgenden Tabelle zu finden.

- **Zusätzlich erforderlicher bewachsener Randstreifen** zw. Hopfengarten und Gewässer bei einer Hangneigung > 2 %. (siehe Tabelle Abstandsauflagen)

Gelegentlich wasserführende Gräben sind von den Abstandsauflagen ausgenommen. Zu periodisch wasserführenden Gräben sind die Abstände einzuhalten.

Zur Unterscheidung von gelegentlich und periodisch wasserführenden Oberflächengewässern dient die nachfolgende Tabelle:

Tab.: Unterscheidung zwischen einem gelegentlich und einem periodisch wasserführenden Oberflächengewässer

gelegentlich wasserführend	periodisch wasserführend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• überwiegend ohne Wasser</li> <li>• kein typisches Gewässerbett</li> <li>• Landpflanzen wie Gräser und/oder Brennesseln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Sommer evtl. austrocknend</li> <li>• Gewässerbett erkennbar</li> <li>• Wasserpflanzen vorhanden</li> <li>• keine Landpflanzen in der Grabensohle</li> </ul>
→ <b>keine Abstände</b>	→ <b>Abstände einhalten</b>

Tab.: Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern und Nicht-Zielflächen (Stand: 01.03.2022)

Indikation	Produkt	Gewässerabstand [m]			Nicht-Zielflächenabstand [m] <sup>2)</sup>				
		NW-Auflage	Abdriftminderungsklasse		Hangneig. >2% Randsteifen [m]	NT-Auflage	Abdriftminderungsklasse		
			0%	90%			0%	90%	
Erdflöh, Markeule, Schattenwickler	Karate Zeon (G)	607-1	-	5 <sup>1)</sup>		108	25	5	
Hopfenblattlaus	Kantaro/Eradicoat	642-1	*	*	20	109	25	5	
	Movento SC 100	642-1	*	*					
	Neudosan Neu (Art. 51)	607-1/706	-	20 <sup>1)</sup>					
	Teppeki/AFINTO	642-1	*	*					
Gem. Spinnmilbe	Kanemite SC	605-1/606	20	*	20	109	25	5	
	Kantaro/Eradicoat	642-1	*	*					
	Milbeknock (Top)	607	-	20 <sup>1)</sup>					
	Movento SC 100	642-1	*	*					
	Neudosan Neu (Art. 51)	607-1/706	-	20 <sup>1)</sup>					
	Ordoval	607-1	-	5 <sup>1)</sup>					
Peronospora Primärinfektion	Aliette WG	609	5	*		103	20	0	
	Profiler (Art. 51)	605-1/606	10	*		101	20	0	
Peronospora Sekundärinfektion	Aktuan	607	-	20 <sup>1)</sup>	20	101	20	0	
	Aliette WG	609	5	*		103	20	0	
	Bellis	607	-	15 <sup>1)</sup>		101	20	0	
	Delan WG	607	-	20 <sup>1)</sup>		10	107	25	5
	Dimethofin	605-1/606	15	*					
	Forum	605/606	15	*					
	Folpan 80 WDG	607-1/706	-	20 <sup>1)</sup>					
	Ortiva	607-1/701	-	10 <sup>1)</sup>					
	Orvego	607-1	-	5 <sup>1)</sup>		101	20	0	
	Revus	605-1/606	15	*		102	102	5	0
	Kupfer-Präp.	Airone SC	607-1	-					
Coprantol Duo		607-1	-	15 <sup>1)</sup>					
Cuprozin progress		607-1	-	15 <sup>1)</sup>					
Funguran progress		607-1	-	15 <sup>1)</sup>					
Echter Mehltau	Bellis	607	-	15 <sup>1)</sup>	20	101	20	0	
	Flint	607-1/706	-	20 <sup>1)</sup>		103	20	0	
	Kumar (Art. 51)	642-1	*	*		101	20	0	
	Sythane 20 EW	605-1/606	20	5		102	20	0	
	Vivando (Art. 51)	605-1/606	10	*		102	20	0	
	Schwefel-Präp.	Kumulus WG	605-1/606	20		*		103	20
Microthiol Hopfen		605-1/606	20	*	103	20		0	
Thiopron		605-1/606	15	*	103	20		0	
Thiovit Jet		605-1/606	20	*	103	20		0	
Hopfenputzen	Beloukha (Art. 51)	642-1	*	*	10	101	20	0	
	Quickdown (G)	605/606	5	*		101	20	0	
	Vorox F (Art. 51)	609-1/701	5	*		103	20	0	
Ungräser, Quecke	Fusilade Max (G)	642-1	*	*		103	20	0	
Unkräuter	U 46 M-Fluid (G)	642-1	*	*		108	25	5	
Nagetiere	Ratron Gift-Linsen	704	10			680/820-2/820-3			
Nacktschnecken	Eisen-III-Phosphat-P.	642-1	*			116			
Rehwild	Trico	642-1	*						

\* Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

<sup>1)</sup> Ausbringung nur mit eingetragener verlustmindernder Technik erlaubt

<sup>2)</sup> siehe Tabelle NT-Auflagen auf nachfolgender Seite

Angaben ohne Gewähr. Es gilt die aktuelle Gebrauchsanleitung.



Ziel dieser Auflage ist es, auf angrenzenden Flächen (z. B. Böschungen, Feldraine, Hecken und Gehölzinseln) die Tiere und Pflanzen vor Beeinträchtigungen durch Pflanzenschutzmittel zu schützen. Die Abstände der einzelnen Präparate sind der vorherigen Tabelle „Abstandsauflagen“ zu entnehmen. Dabei ist unbedingt auch die folgende Tabelle „NT-Auflagen“ zu beachten, die die verschiedenen Anwendungsbestimmungen im Detail erklärt. Um bspw. Abdrift in die schützenswerten Flächen zu verhindern, muss der Feldrand mit einer Spritzbreite von 20 m mit

abdriftmindernden Düsen behandelt (NT 101 - 106) bzw. ein 5 m unbehandelter Streifen zusätzlich belassen werden (NT 107 - 109). Auch brauchen bestimmte Auflagen nicht in Gemeinden eingehalten werden, die ausreichende Anteile an Kleinstrukturen aufweisen. Siehe dazu:

<https://www.julius-kuehn.de/sf/ab/raeumliche-analysen-und-modellierung/verzeichnis-der-regionalisierten-kleinstrukturanteile/>



Tab.: NT-Auflagen zum Schutz von Randstrukturen

Anwendungsbestimmung	NT			NT			NT		
	101	102	103	104	105	106	107	108	109
20 m Breite mit ... % abdriftmindernder Technik:	50%	75%	90%	50%	75%	90%	50%	75%	90%
Zusätzlich:							5 m Abstand		
sofern abdriftmindernde Technik nicht einsetzbar:				5 m Abstand					
Befreiung der NT-Auflagen, sofern:									
Anwendung mit tragbarem Gerät	+			+			+		
Saumstruktur < 3 m Breite	+			+			+		
Fläche in kleinstrukturiertem Gebiet	+			+			keine 5 m Abstand, aber abdriftmindernde Technik nötig		
Saumstruktur auf ehem. landw./gärtnerisch genutzter Fläche				+					

### 6.1.19.3 Auflagen zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern

Zum Schutz von Personen, die sich temporär in der Umgebung von der zu behandelnden Fläche aufhalten (Umstehende) oder dort arbeiten bzw. wohnen (Anwohner) sind folgende Mindestabstände (z. B.

zu Wegen, priv. Grundstücken, Gärten) bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln einzuhalten:

**Hopfen                      5 m**

### 6.1.19.4 Anwendungsbestimmungen zum Gesundheitsschutz

In dieser Tabelle werden nur SE, SS, SF Anwendungsbestimmungen berücksichtigt. Es gelten die Gebrauchsanleitungen. Weitere Auflagen entnehmen Sie der Gebrauchsanleitung oder [www.bvl.bund.de](http://www.bvl.bund.de) Datenbank (Stand 15.03.2021)

Tab.: Anwendungsbestimmungen zum Gesundheitsschutz (Stand 15.03.2022)

Indikation	Produkt	Unverdünntes Produkt		Anwendungsfertiges Produkt	Nachfolgearbeiten
		SE	SS		
Hopfenblattlaus	Kantaro/Eradicoat	SE110	SS110-1, SS2101, SS530, SS610		SF275-EEHO
	Movento SC 100				
	Neudosan Neu (Art. 51)		SS110-1, SS2101		

## Pflanzenschutz

Indikation	Produkt	Unverdünntes Produkt		Anwendungsfertiges Produkt	Nachfolgearbeiten
		SE	SS	SS	SF
	Teppeki/AFINTO		SS110-1, SS2101		
Gem. Spinnmilbe	Kantaro/Eradicoat Milbeknock (Top) Movento SC 100	SE110	SS110-1, SS2102 SS110-1, SS2101, SS530, SS610 SS110-1, SS2101		SF275-EEHO
	Neudosan Neu (Art. 51) Ordoval	SE110	SS110-1, SS2101	SS2202	SF276-EEHO
Peronospora Sek.  Kupfer-Präp.	Dimethofin Folpan 80 WDG	SE110	SS110-1, SS120-1 SS110, SS2101	SS120, SS2202	SF277-VEHO, SF279-HO SF276-28HO
	Airone SC, Funguran pro. Coprantol Duo, Cupr. pro.		SS110-1, SS120-1 SS110-1, SS120-1	SS2202 SS2202	SF276-28HO SF276-28HO
Echter Mehltau  Schwefel-Präp.	Vivando (Art. 51)		SS110-1, SS2101		
	Microthiol Hopfen Thioproton		SS110-1, SS2101 SS110-1, SS2101, SS530, SS610		SF275-EEHO SF275-14HO
Hopfenputzen	Beloukha (Art. 51)	SE110	SS110-1, SS2101		
Nagetiere	Ratron Gift-Linsen		SS1201		
Nacktschnecken	Eisen-III-Phosphat-Präp.		SS2204		

Produkt	Code	Text
Unverdünnt	SE110	Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
	SS110-1	Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
	SS120-1	Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
	SS530	Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
	SS610	Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
	SS1201	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels.
	SS2101	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
	SS2204	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
Anwendungsfertig	SS2202	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels
Nachfolgearbeiten	SF275-EEHO	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Hopfen bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
	SF275-14HO	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Hopfen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
	SF276-28HO	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Hopfen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
	SF276-EEHO	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Hopfen bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
	SF277-VEHO	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen nach der Anwendung in Hopfen bis unmittelbar vor der Ernte auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen.
	SF279-HO	Es ist sicherzustellen, dass bei Erntearbeiten mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Hopfen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

## 6.1.20 Leergutentsorgung 2022 (PAMIRA)

PAMIRA ist eine Aktion der Pflanzenschutzmittelindustrie zur kostenlosen Rücknahme von Pflanzenschutzmittel- und Flüssigdüngerverpackungen.

**Vorgehen:**

- Verpackungen restentleert, gespült und trocken bei den Sammelstellen anliefern.
- Behälter offen anliefern und Verschlüsse separat abgeben.
- Behälter über 60 l müssen durchtrennt werden.
- Sortiert nach Kunststoff, Metall und Beuteln abgeben.

- Sauberkeit wird bei der Anlieferung kontrolliert.
- Produktreste und ungespülte Verpackungen werden zurückgewiesen. Sie müssen vom Landwirt als Sondermüll (kostenpflichtig) entsorgt werden.
- Zurückgenommen werden nur Kanister aus Kunststoff und Metall, Beutel, Säcke und Flüssigdüngerverpackungen mit PAMIRA-Zeichen.

**Weitere Informationen im Internet unter [www.pamira.de](http://www.pamira.de)**



Tab.: Sammelstellen und Termine in den deutschen Hopfenanbaugebieten:

<b>Bayern:</b>		
Moosburg	BayWa	29.06.2022 - 30.06.2022
Wolnzach-Bruckbach	BayWa Agrar	04.08.2022 - 05.08.2022
Großmehring	BayWa Interpark	26.09.2022 - 27.09.2022
Fürth	BayWa	09.09.2022
Lobsing	BayWa	04.10.2022 - 05.10.2022
Abensberg	Krämer	28.09.2022 - 29.09.2022
Brunnen	Wenger	22.09.2022
Mainburg	BayWa	21.11.2022 - 23.11.2022
Schweitenkirchen	Moser	13.10.2022 - 14.10.2022
Dietfurt	BayWa	11.10.2022
Schrobenhausen	BayWa	12.10.2022 - 13.10.2022
<b>Baden-Württemberg:</b>		
Tettnang	BayWa Agrar	28.06.2022 - 29.06.2022
Friedrichshafen-Hirschlatt	Beiselen GmbH	12.07.2022 u. 03.11.2022
Ravensburg	BayWa Agrar	26.10.2022
Altshausen	Landhandel Stauß GmbH	04.11.2022
<b>Thüringen:</b>		
Straußfurt	Raiffeisen Waren GmbH	23.05.2022 - 25.05.2022
Bad Tennstedt	BayWa AG	07.06.2022 - 10.06.2022
Weimar	Raiffeisen Waren GmbH	14.06.2022 - 17.06.2022
Schmölln	Roth Agrarhandel	20.06.2022 - 23.06.2022
<b>Sachsen:</b>		
Kamenz	KAT Agro-Trans GmbH	09.08.2022 - 10.08.2022 04.11.2022
Reichenbach	BayWa	15.08.2022 - 17.08.2022 03.11.2022
Groitzsch	Raiffeisen-Warenzentrale	23.08.2022 - 24.08.2022
Döbeln	Dehner Agrar GmbH	30.08.2022 - 01.09.2022
Großsteinberg	Roth Agrarhandel	20.10.2022
<b>Sachsen-Anhalt:</b>		
Aschersleben	Fehr Umwelt Ost GmbH	07.06.2022 - 10.06.2022
Köthen	PreZero Service Köthen GmbH	21.09.2022 - 22.09.2022
Querfurt	Baro Lagerhaus GmbH	10.10.2022 - 12.10.2022
Teuchern	Roth Agrarhandel	20.09.2022 - 21.09.2022

## 6.1.21 Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel

Tab.: Auswahl in Deutschland zugelassener oder genehmigter Pflanzenschutzmittel im Hopfen für das Vegetationsjahr 2022 (Stand: 25.03.2022)

Angaben ohne Gewähr

Indikation	Produkt	Wartezeit	Höchstmenge [ppm]			Zulassung bis	
			EU	US	JP		
Erdfloh, Markeule, Schattenwickler	Karate Zeon (G)	14	10	10	10	31.12.22	
Hopfenblattlaus	Kantaro/Eradicoat	F	ja	ja	-	30.09.24	
	Movento SC 100	14	15	10	15	30.04.25	
	Neudosan Neu (Art. 51)	F	ja	ja	-	31.08.23	
	Tepeki/AFINTO	21	3	20	20	31.12.22	
Gem. Spinnmilbe	Kanemite SC	21	15	15	15	31.12.24	
	Kantaro/Eradicoat	F	ja	ja	-	30.09.24	
	Milbeknock (Top)	21	0,2	-	0,1	31.07.23	
	Movento SC 100	14	15	10	15	30.04.25	
	Neudosan Neu (Art. 51)	F	ja	ja	-	31.08.23	
	Ordoval	28	20 <sup>1)</sup>	20	25	31.05.22	
Peronospora Primärfektion	Aliette WG	14	2000	45	1440	30.04.23	
	Profiler (Art. 51)	F	2000+0,15	45+15	1440+0,7	31.12.24	
Peronospora Sekundärfektion	Aktuan	14	100+0,1	100+7	300+7	31.08.22	
	Aliette WG	14	2000	45	1440	30.04.23	
	Bellis	28	15+80	23+35	15+60	31.07.23	
	Delan WG	14	100	100	300	31.01.24	
	Dimethofin	10	80	60	80	31.07.23	
	Forum	10	80	60	80	31.07.23	
	Folpan 80 WDG	21	400	120	120	31.12.22	
	Ortiva	28	30	20	30	31.12.22	
	Orvego	10	80+90	60+100	80+100	31.12.24	
	Revus	14	90	50	90	31.12.24	
	Kupfer-Präparate	Airone SC	14	1000	ja	ja	31.03.23
Coprantol Duo		14	1000	ja	ja	31.03.23	
Cuprozin progress		7	1000	ja	ja	30.09.23	
Funguran progress		7	1000	ja	ja	30.09.23	
Echter Mehltau	Bellis	28	15+80	23+35	15+60	31.07.23	
	Flint	14	40	11	40	30.06.22	
	Kumar (Art. 51)	1	ja	ja	ja	31.08.22	
	<del>Systane 20 EW<sup>2)</sup></del>	<del>14</del>	<del>6</del>	<del>40</del>	<del>40</del>	<del>31.05.21</del>	
	Vivando (Art. 51)	3	80	70	70	30.04.23	
	Schwefel-Präparate	Kumulus WG	8	ja	ja	ja	31.12.22
		Microthiol Hopfen	7	ja	ja	ja	31.12.22
		Thiopron	1	ja	ja	ja	31.12.23
Thiovit Jet		8	ja	ja	ja	31.12.22	
Hopfenputzen	Beloukha (Art. 51)	F	ja	ja	-	31.08.23	
	Quickdown (G)	F	0,1	0,02 <sup>3)</sup>	0,05	31.01.23	
	Vorox F (Art. 51)	F	0,1	0,05	0,05	30.06.23	
Ungräser, Quecke	Fusilade Max (G)	28	0,05	-	-	31.12.22	
Unkräuter	U 46 M-Fluid (G)	35	0,1	-	-	31.10.22	
Nagetiere	Ratron Gift-Linsen	F	0,05	-	-	30.04.22	
Nacktschnecken	Eisen-III-Phosphat-Präp.	F	ja	ja	ja	31.12.31	
Rehwild	Trico	F	ja	ja	ja	31.08.22	

<sup>1)</sup> Zum 09.08.2022 wird der EU MRL auf 3 ppm abgesenkt, d. h. gültig für Ernte 2022

<sup>2)</sup> ~~Systane 20 EW~~: Wirkstoffzulassung endete am 31.05.2021. Abverkauf bis 30.11.2021. Aufbrauchfrist bis 30.11.2022

<sup>3)</sup> Quickdown: US-Höchstmenge 0,02 ppm: Es ist aktuell nicht bekannt, ob dieser Wert ausreichend ist

## 6.1.22 Klassifikation der Wirkstoffe im Hopfen

Wirkstoffe werden je nach Indikation (Insektizide, Fungizide, Herbizide etc.) und Wirkungsweise in Gruppen eingeteilt. Diese Einstufung dient als Grundlage für ein funktionierendes Resistenzmanagement. Um einen Wirkstoffwechsel vorzunehmen, genügt es also nicht von z. B. Forum auf Revus zu wechseln, da beide der Gruppe H5 angehören, sondern es sollte ein Wirkstoff aus einer anderen Gruppe angewendet werden.

Tab.: Klassifikation der Wirkstoffe im Hopfen

Indikation	Produkt	Wirkstoff	Wirkstoff- gruppe	Formu- lierung	Zulassung Öko-Hop- fen	Gefährdung für	
						Bienen	Raubmil- ben
Erdfloh, Markeule, Schattenwickler	Karate Zeon (G)	lambda-Cyhalothrin	3A	CS	-----	B4	↓↓↓
Hopfenblattlaus	Kantaro/Eradicoat	Maltodextrin	U	SL	ja	B2	↓↓
	Movento SC 100	Spirotetramat	23	SC	-----	B1	→
	Neudosan Neu (Art. 51)	Fettsäure-Kalziumsalze	U	SL	ja	B4	→
	Teppeki/AFINTO	Flonicamid	29	WG	-----	B2	↓
Gem. Spinnmilbe	Kanemite SC	Acequinocyl	20B	SC	-----	B4	→
	Kantaro/Eradicoat	Maltodextrin	U	SL	ja	B2	↓↓
	Milbeknock (Top)	Milbemectin	6	EC	-----	B1	↓↓
	Movento SC 100	Spirotetramat	23	SC	-----	B1	→
	Neudosan Neu (Art. 51)	Fettsäure-Kalziumsalze	U	SL	ja	B4	→
	Ordoval	Hexythiazox	10A	SC	-----	B4	↓↓
Peronospora Primärfektion	Aliette WG	Fosetyl-Al	P7	WG	-----	B4	↓↓
	Profler (Art. 51)	Fosetyl-Al + Fluopicolide	P7 + B5	WG	-----	B4	→
Peronospora Sekundärfektion	Aktuan	Dithianon + Cymoxanil	M9 + U	WDP	-----	B4	→
	Aliette WG	Fosetyl-Al	P7	WG	-----	B4	↓↓
	Bellis	Pyraclostrobin + Boscalid	C3 + C2	WG	-----	B4	→
	Delan WG	Dithianon	M9	WG	-----	B4	→
	Dimethofin	Dimethomorph	H5	DC	-----	B4	→
	Forum	Dimethomorph	H5	DC	-----	B4	→
	Folpan 80 WDG	Folpet	M4	WG	-----	B4	→
	Ortiva	Azoxystrobin	C3	SC	-----	B4	→
	Orvego	Dimethom. + Ametoctradin	H5 + C8	SC	-----	B4	↓
	Revus	Mandipropamid	H5	SC	-----	B4	→
Kupfer-Präparate	Airone SC	Kupferoxychlorid + -hydroxid	M1	SC	ja	B4	→

# Pflanzenschutz

Indikation	Produkt	Wirkstoff	Wirkstoff- gruppe	Formu- lierung	Zulassung Öko-Hop- fen	Gefährdung für		
						Bienen	Raubmil- ben	
Kupfer-Präparate	Coprantol Duo	Kupferoxychlorid + -hydroxid	M1	WG	ja	B4	→	
	Cuprozin progress	Kupferhydroxid	M1	SC	ja	B4	→	
	Funguran progress	Kupferhydroxid	M1	WDP	ja	B4	→	
Echter Mehltau	Bellis	Pyraclostrobin + Boscalid	C3 + C2	WG	-----	B4	→	
	Flint	Trifloxystrobin	C3	WG	-----	B4	→	
	Kumar (Art. 51)	Kaliumhydrogencarbonat	U	WLP	ja	B4	↓↓	
	<del>Sythane 20 EW</del>	Myclobutanil	G1	EW	-----	B4	→	
	Vivando (Art. 51)	Metrafenone	B6	SC	-----	B4	→	
Schwefel-Präparate	Kumulus WG	Schwefel	M2	WG	ja	B4	→	
	Microthiol Hopfen	Schwefel	M2	WG	ja	B4	→	
	Thiopron	Schwefel	M2	SC	ja	B4	↓↓	
	Thiovit Jet	Schwefel	M2	WG	ja	B4	→	
Hopfenputzen	Beloukha (Art. 51)	Pelargonsäure	Z	EC	-----	B4	↓↓	
	Quickdown (G)	Pyraflufen-ethyl	E	EC	-----	B4	k.A.	
	Vorox F (Art. 51)	Flumioxazin	E	WG	-----	B4	k.A.	
Ungräser, Quecke	Fusilade Max (G)	Fluazifop-P	A	EC	-----	B4	→	
Unkräuter	U 46 M-Fluid (G)	MCPA	O	SL	-----	B4	→	
Nagetiere	Ratron Gift-Linsen	Zinkphosphid	24A	Köder	-----	B3	→	
Nacktschnecken	Eisen-III-Phosphat-Präp.	Eisen-III-phosphat	k.A.	Köder	ja	B4	→	
Rehwild	Trico	Schaffett	U	EW	ja	B4	k.A.	

<u>Formulierung:</u>	WDP	Wasserdispergierbares Pulver	WG	Wasserdispergierbares Granulat	
	WLP	Wasserlösliches Pulver	EC	Emulsionskonzentrat	
	CS	Kapselsuspension	SL	Wasserlösliches Konzentrat	
	SC	Suspensionskonzentrat	EW	Öl in Wasser Emulsion	
	DC	Dispergierbares Konzentrat			
<u>Raubmilbengefahr:</u>	→	nicht schädigend	<u>Bienengefahr:</u>	B1 - B2	bienengefährlich
	↓↓	schädigend		B3 - B4	nicht bienengefährlich
	↓↓↓	stark schädigend			

k.A. = keine Angabe

## 6.1.23 Hinweise zur Mischbarkeit und Anwendung – Stand März 2022

Mischungen mit mehr als 3 Komponenten sollten unterbleiben oder zuvor in einer kleinen Parzelle getestet werden, denn die Verträglichkeit von Mischungen ist witterungsabhängig!

Gebrauchsanleitung in jedem Fall beachten!

**Empfehlungen ohne Gewähr!**

Tab.: Mischbarkeitstabelle

Pflanzenschutzmittel	nach Gebrauchsanweisung mischbar mit	Einschränkungen/Erfahrungen
<b>1. Peronospora</b>		
Aktuan	gebräuchlichen Fungiziden, Akariziden	gut mischbar
Aliette WG	PSM der Firma	nicht mit Blattdüngern mischen; SC-Formulierungen im Eimer anrühren und als erstes Produkt ins Fass geben (Ausflockungsgefahr)
Bellis	gebräuchlichen Fungiziden und Akariziden	gut mischbar
Delan WG	gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden, Akariziden und	gut mischbar
Forum/Dimethofin	gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden, Akariziden	gut mischbar
Kupfer-Präparate	gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden, Akariziden	gut mischbar
Ortiva	Fungiziden, Insektiziden	gut mischbar
Orvego	Fungiziden, Insektiziden, Akariziden	gut mischbar
Profler	siehe Aliette WG	siehe Aliette WG
Revus	Ortiva	gut mischbar
<b>2. Echter Mehltau</b>		
Flint	zahlreichen Fungiziden, Insektiziden	gut mischbar
Kumar	nach bisherigen Erfahrungen mit ge- bräuchlichen Fungiziden oder Insektiziden	keine Mischung mit Formulierungshilf- stoffen, EC Formulierungen, pH-Wert verändernden Präparaten (wie z. B. A- liette WG u. Phosphorige Säuren) und wasserlöslichen Düngemitteln
Schwefel-Präparate	gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden, Akariziden	nicht mit ölhaltigen Formulierungen
Sythane 20 EW	unter örtlichen Bedingungen zu prüfen	gut mischbar
Vivando	Fungiziden, Insektiziden, Akariziden	gut mischbar, SC-Formulierung (s. Aliette)
<b>3. Blattläuse</b>		
Kantaro/Eradicoat	gebräuchliche Fungiziden	gut mischbar
Movento SC 100	nur Solo-Anwendung empfohlen	
Neudosan Neu	Mischbarkeit noch nicht überprüft	
Teppeki/AFINTO	gebräuchlichen Fungiziden	gut mischbar, Additive nicht notwendig
<b>4. Gemeine Spinnmilbe</b>		
Kanemite SC	i. d. R. mit anderen PSM mischbar	gut mischbar
Kantaro/Eradicoat	gebräuchliche Fungiziden	gut mischbar
Milbknock (Top)	Fungiziden und Insektiziden	gut mischbar
Movento SC 100	nur Solo-Anwendung empfohlen	
Neudosan Neu	Mischbarkeit noch nicht überprüft	
Ordoval	gebräuchliche Fungiziden u. Insektizide	gut mischbar
<b>5. Erdfloh, Schattenwickler, Markeule</b>		
Karate Zeon	Aliette WG	nicht mit Blattdüngern
<b>6. Wildrepellent</b>		
Trico	keine Mischungen	
<b>7. Herbizide</b>		
Beloukha	AHL oder AN-Lösung	
Quickdown		erst ab voller Gerüsthöhe
Fusilade Max		ger. Wassermenge verbessert Wirkung
U 46 M-Fluid		nicht mit Kontaktherbiziden, da diese durch die Ätzwirkung die Wirkstoffverla- gerung in die Rhizome verhindern
Vorox F	AHL oder AN-Lösung	siehe Seite 108

6.1.24 Mischreihenfolge verschiedener PSM-Formulierungen

Die Art der PSM-Formulierung bestimmt die Reihenfolge, in der die verschiedenen Pflanzenschutzmittel in den Tank gegeben werden sollten.

Der Tank sollte vor der Zugabe von Produkten mindestens zur Hälfte mit Wasser befüllt werden. Im Anschluss muss das Rührwerk eingeschaltet und die gewünschten Mittel gemäß nachfolgender Reihenfolge zugegeben werden:

Tab.: Mischreihenfolge

<b>A: Feste Stoffe (Granulate)</b>	
1. Wasserlösliche Folienbeutel	Reines Wasser sorgt für eine optimale Auflösung von Folienbeutel
2. Wasserlösliche Granulate (SG, SX)	Viel Wasser bis zur vollständigen Auflösung nötig, da sich die in den Granulaten enthaltenen Bindemittel zuerst auflösen müssen, bevor die Wirkstoffe, Dispergier- u. Netzmittel freigesetzt werden.
3. Wasserdispersier. Granulate (WG) (Ausnahme Aliette WG und Profiler siehe Mischbarkeit), Pulver (WP)	
<i><b>Achtung:</b> Es darf kein direkter Kontakt zwischen Granulaten und den flüssigen Tankmischpartnern zustande kommen, d. h. es ist auf eine vollständige Auflösung und Einspülung der Granulate zu achten.</i>	
<b>B: Feste Partikel in flüssigem Produkt</b>	
4. Suspensionskonzentrate (SC)	
5. Suspoemulsion (SE)	
6. Kapselsuspension (CS)	
<b>C: Bereits gelöste Wirkstoffe</b>	
7. Wasserlösliche Konzentrate (SL)	
8. Ölhaltige Suspensionskonzentrate (OD)	
9. Emulsionen von Öl in Wasser (EW), emulgierbare Konzentrate (EC), emulgierbares Granulat (EG)	
10. Öle, Netzmittel (Tenside), Formulierungshilfsstoffe	Granulate können von Ölen umhüllt werden, wodurch die Lösung der Bindemittel beeinträchtigt wird.
11. Flüssigdünger und Spurennährstoffe	Die hohe Salzkonzentration in Düngern kann zur Herabsetzung der Auflösung von Bindemitteln in WG-Präparaten führen.

ohne Gewähr!



## 6.2 Schädlinge

### 6.2.1 Liebstockelrüssler, Luzernerüssler

*Otiorhynchus ligustici* L

#### Bedeutung

Im Anbaugebiet Elbe-Saale ist mit verbreitetem Auftreten zu rechnen. In den übrigen Anbaugebieten nimmt die Bedeutung des Schädlings zu. Bei stärkerem Auftreten werden die Hopfenstöcke durch Käfer- und Larvenfraß so stark geschwächt, dass der Ertrag beeinträchtigt wird oder ganze Stöcke ausfallen.

#### Schadbild

Der Käfer hat einen mehrjährigen Entwicklungszyklus und überdauert als Larve oder Käfer im Boden.

Im zeitigen Frühjahr (April und Mai) kommt der dunkle, ca. 1 cm große, flugunfähige Käfer an die Bodenoberfläche, um an den Spitzen der Hopfensprosse zu fressen. Dabei können ca. 0,5 cm große Löcher im Boden beobachtet werden. Auf dem Ackerboden ist der Liebstockelrüssler nur durch genaue Beobachtung zu erkennen. Deutlich sichtbar jedoch sind die frischen, hellgrünen Fraßstellen an den Sprossspitzen. Da die Käfer gerne wandern und dabei beachtliche Strecken zurücklegen, können von einem Käfer mehrere Hopfenstöcke befallen werden.

Der Liebstockelrüssler bevorzugt für seinen Reifungsfraß sonnige, warme und windstille Witterung. Bei Neuanpflanzungen sollten bereits bekannte Befallsstandorte gemieden werden.

#### Bekämpfung

Als Schwellenwert für das Erscheinen an der Bodenoberfläche gilt eine Erwärmung

### 6.2.2 Hopfen-Erdfloh

*Psylliodes attenuatus* Koch

#### Bedeutung

Im Frühjahr ist stärkerer Befall am Hopfen-austrieb mit massivem Lochfraß bereits bekämpfungswürdig.

des Bodens auf über 5°C in 10 cm Tiefe über mehrere Tage. Die Bekämpfungsschwelle ist erreicht, wenn mindestens ein Käfer pro drei Stöcken zu finden ist.

Der richtige Behandlungszeitpunkt ist entscheidend für den Bekämpfungserfolg. Bei Tagestemperaturen von über 20 °C während der Mittags- und frühen Nachmittagsstunden ist der Käfer aktiv und am wahrscheinlichsten zu treffen. Da diese Bedingungen in den meisten Jahren oft nur an ein bis zwei Tagen annähernd erreicht werden, ist hohe Schlagkraft oberstes Gebot. Der richtige Behandlungszeitpunkt ist entscheidend für den Bekämpfungserfolg. Da der Liebstockelrüssler einen mehrjährigen Entwicklungszyklus hat, ist die Behandlung meist im Folgejahr zu wiederholen. Derzeit ist kein Pflanzenschutzmittel gegen den Liebstockelrüssler zugelassen.



Abb.: Liebstockelrüssler *Otiorhynchus ligustici*  
© Gosik, Maria-Curie Skłodowska University

Ab 1 m Wuchshöhe des Hopfens kann der Befall in der Regel toleriert werden. Massives Auftreten im Sommer mit Schädigung der Dolden macht eine Bekämpfung notwendig.

### Schadbild

Die metallisch grünlich-bräunlich glänzenden adulten Käfer sind 2-2,8 mm lang und halb so breit. Erdflöhe sind leicht an den verdickten Hinterschenkeln zu erkennen, die sie befähigen bis zu 60 cm hoch bzw. weit zu springen.

Erdflöhe haben eine Generation pro Jahr. Die adulten Käfer überwintern in allen möglichen passenden Verstecken wie in der Bodenstreu, unter Rinde oder in den Ritzen von Hopfensäulen. Im Frühjahr bei Temperaturen über 5 °C werden sie aktiv, verlassen ihre Winterquartiere und fressen am Hopfenaustrieb das Blattgewebe. Bei starkem Befall sind die Blätter wie von Schrotkugeln durchlöchert oder fast skelettiert. Wenn der Hopfen etwa 1 m Höhe erreicht hat, ist dieser Blattfraß nicht mehr von Bedeutung. Im Mai und Juni kommt es zur Eiablage im Boden und die alten Käfer sterben danach ab. Die Larven und Puppen leben sieben bis zehn Wochen im Boden, ehe ab Mitte Juli die neue Generation an Käfern schlüpft. Nach einer Untersuchung auf einer Öko-Hopfenfläche im Jahr 2017 können bis zu 6 Millionen Käfer pro Hektar und Jahr schlüpfen.



Abb.: Erdfloh-Lochfraß an Blättern und Dolden

### 6.2.3 Wildverbiss

Besonders im Frühjahr können erhebliche Schäden durch Wildverbiss an Hopfen auftreten. Die Wildtiere, vor allem Reh-

Neben den Hopfenblättern werden jetzt auch Blüten, Doldenblätter und die Spindeln in den Dolden angefressen. Neben Lochfraß kann es an den Dolden zu Peronospora-ähnlichen Symptomen kommen, wenn diese kurz nach dem Beginn der Ausdoldung angefressen werden. Bei starkem Befall sind Schäden dann unausweichlich. Im Spätherbst verkriechen sich die Käfer wieder zur Überwinterung bis sie im Frühjahr wieder aus ihren Winterquartieren erscheinen.

### Bekämpfung

Die Insektizidanwendung sollte an warmen Tagen erfolgen; denn bei Kontaktmitteln ist es wichtig, dass zum Zeitpunkt der Behandlung warmes sonniges Wetter herrscht, um zu gewährleisten, dass die Käfer ihre Winterquartiere verlassen, am Hopfen fressen und so mit dem Wirkstoff in Berührung kommen.



Abb.: Hopfen-Erdfloh *Psylliodes attenuatus*, ♂ und ♀.

© Dr. Lech Borowiec, Universität Wrocław


Neben *Psylliodes attenuatus* wird auch der Nordeuropäischen Rübenerdfloh *Chaetocnema concinna* (MARSHAM) regelmäßig in den Dolden gefunden. Verglichen mit dem Hopfen-Erdfloh erreicht diese Art eine Häufigkeit von 5-10 % aller Individuen.

und Rotwild, äsen die jungen, frischen Triebe. Probleme größeren Ausmaßes können aber auch Hasen sowie

Schwarzwild verursachen. Fegeschäden durch Rehwild an hochgewachsenen Hopfenreben treten im Verlauf des Sommers auf und führen durch Verletzung und Unterbrechung der Wasserleitungsbahnen zum Vertrocknen einzelner Triebe und Aufleitungen.

Wie stets beim Einsatz von Abwehr- und Schutzmitteln gilt auch hier: **Gewöhnung der Tiere an einen Wirkstoff möglichst lange hinauszögern!** Dies lässt sich durch einen Wechsel zwischen den Abwehrmitteln erreichen. Auch müssen die Haarsäckchen, Duftstreifen etc. nach Beendigung des Wildverbisses (ca. 1/3 der Gerüsthöhe) unbedingt wieder entfernt werden.

Zur **Bekämpfung** sind folgende Abwehrmittel und -methoden bekannt:

- **Pflanzenschutzmittel Trico**  
Durch emulgiertes Schaffett wird die beabsichtigte wildabweisende Wirkung erzielt.  
Es kann bis zu dreimal im Abstand von 7 bis 21 Tagen eingesetzt werden. Die Aufwandmenge beträgt 15 l/ha in bis zu 50 l Wasser. Da es kaum Erfahrungen zur Mischbarkeit gibt, wird diese grundsätzlich nicht empfohlen. Praxiseinsätze brachten gute Ergebnisse.
- **Menschenhaare**  
Hierzu wird je eine Handvoll Haare in ein Kunststoffsäckchen (Zwiebel- oder Kartoffelsäckchen) gegeben und dieses am Rand der gefährdeten Hopfengärten an jedem 2. bis 3. Ankerseil in ca. 1 m Höhe befestigt.
- **Wildvergrämungsmittel Hukinol:**  
Für alle Wildarten geeignet. Aufgrund des starken, intensiven Geruchs nach menschlichem Schweiß ist eine Anbringung in der Nähe von Wohnbebauung nicht zu empfehlen.  
Anwendung: Zur Vermeidung von Wildverbiss oder zur Kitzrettung auf Kornitol Strips bzw. Lappen aufbringen und im Abstand von 10-20 m aufhängen.  
Die Wirkungsdauer hält ca. 10 Tage.
- **Vergrämungsmittel Wildschwein-Stopp**  
Das Produkt ist im Set mit 2 Varianten erhältlich, um zwischen den Duftstoffen wechseln zu können.  
Anwendungsempfehlung:  
25–30 Streifen pro ha (Filzplättchen auf Alufolie) an jedem zweiten Anker und einige innen im Garten anbringen; einmaliges Nachsprühen nach 8-10 Tagen;  
Gesamtverbrauch ca. 170 ml/ha und Saison; Wiederverwendung der mitgelieferten Streifen mehrmals möglich  
Bestellung: Hagopur AG,   
Tel.: 08192/72999-62,  
Fax: 08192/72999-63,  
(www.hagopur-shop.de)
- **Dünger Aminosol**  
Das zugelassene Düngemittel zeigte positive Nebeneffekte als Vergrämungsmittel gegen Haarwild (auch Hasen) bei besonderer Anwendung: 2 Liter Aminosol (Aminosäuren + 9 % org. geb. N + 1 % Kaliumoxid) wird mit 2 l Wasser angesetzt und 3 Tage stehen gelassen. Danach erfolgt die Ausbringung (ohne zusätzliche Pflanzenschutzmittel) in Wasser verdünnt auf die Reihe oder Vliesstreifen werden in die angesetzte Lösung getaucht und über die Fläche verteilt im Abstand von 4 m aufgehängt.
- **Schreckbänder & Elektroweidezaun**  
An die Zäune werden zusätzlich reflektierende Kunststoffschnüre angebracht. Dabei wird empfohlen, je einen Draht in 0,5 und 1 m Höhe anzubringen.
- **Vollständige Umzäunung**  
In stark Verbiss-gefährdeten Gebieten ist eine komplette Einzäunung der Hopfengärten empfehlenswert. Geeignet sind dazu großmaschige Drahtgitter mit einer Höhe von 1,5 m.  
Um den freilebenden Tieren einen ungehinderten Zugang zu den natürlichen Lebensräumen zu ermöglichen, müssen Zäune nach Ende des Gefährdungszeitraums wieder abgebaut werden.

## Pflanzenschutz

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Liebstöckelrüssler, Erdfloh, Drahtwurm, Schattenwickler, Markeule, Rehwild, Nager, Nacktschnecken

Indikation	Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]	Abstandsauflagen (weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanleitung)	Bienengefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
Drahtwurm, Lieb- stöckelrüssler	-----						
Erdfloh, Schattenwickler Markeule	Karate Zeon (G) ( <i>lambda-Cyhalothrin</i> )	3A	max. 0,075 l/ha 300 l Brühe/ha max. 1 Anw./Jahr	Gewässer nur verlustm. (90%) 5 m Nichtzielflächen 25 m verlustm.(90 %) 5 m	B4	14	Reihen/Einzelpflanzenbe- handlung bis 50 cm Höhe. Die Gebläsespritze ist <b>nicht</b> für die Applikation geeignet
Rehwild	Trico ( <i>Schaffett</i> )		15 l/ha in 50 l Wasser max. 3 Anw./Jahr	Gewässer <sup>1)</sup>	B4	F <sup>2)</sup>	Einsatzzeitpunkt: BBCH 13 bis Blühbeginn
Nagetiere	Ratron Gift-Linsen ( <i>Zink-Phosphid</i> )	24A	100 g je Nagetier- gang ≅ 5 Stück max. 1 Anw./Jahr	Gewässer 10 m	B3	F <sup>2)</sup>	Nicht an der Oberfläche aus- legen. Unzugänglich für Vö- gel weit in den Gang legen
Nacktschnecken	Sluxx HP Neu 1181 M ( <i>Eisen-III-Phosphat</i> ) Derrex ( <i>Eisen-III-Phosphat</i> )		7 kg/ha, streuen max. 2 Anw./Jahr  7 kg/ha, streuen max. 4 Anw./Jahr	Gewässer <sup>1)</sup>	B4  B4	F <sup>2)</sup>	Einsatzzeitpunkt: ab Schnei- den bis 75 cm Wuchshöhe und bei Befallsbeginn, 2. Anw. nach 7 - 14 Tagen

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

<sup>2)</sup> F = Wartezeit ist durch die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Ernte liegt!

G = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (= Risiko liegt beim Anwender)

## 6.2.4 Hopfenblattlaus

*Phorodon humuli* (SCHRANK)

### Bedeutung

Die Hopfenblattlaus befällt jedes Jahr alle Hopfensorten, wobei aber zwischen den Sorten eine unterschiedliche Anfälligkeit beobachtet wird. Generell werden Hochalphasorten, wie z. B. Hallertauer Magnum oder Herkules bevorzugt befallen. Eine geringe Anziehungskraft für die geflügelte Hopfenblattlaus (Aphisfliege) hat die Aromasorte Spalter Select.

### Schadbild

Von Ende Mai bis zur Ernte werden die Blattunterseiten, Blüten und Dolden von den Läusen besiedelt. Stark befallene Pflanzen bleiben in der Entwicklung zurück und bilden nur wenige oder verkümmerte Dolden. Blätter und Dolden werden durch die Ausscheidungen der Tiere, den sogenannten „Honigtau“, klebrig und glänzend. Rußtaupilze, die sich vom „Honigtau“ ernähren, verursachen an den befallenen Pflanzenteilen die „Schwärze“.

Stark befallene Blätter krallen sich nach unten ein und das Pflanzenwachstum bleibt in der Entwicklung zurück.

Stark befallene Pflanzen bilden im weiteren Verlauf nur wenige oder verkümmerte Dolden. Ertragsverluste reichen bis zum Totalausfall. Verkümmerte und „geschwärzte“ Dolden führen zu Qualitätsminderungen.

### Auftreten

Ab Mitte bis Ende Mai besiedeln geflügelte Blattläuse (Aphisfliegen) vom Winterwirt die jungen Blätter an den Triebspitzen der Hopfenpflanzen.

Der Zuflug geht fast ausschließlich von Schlehen, Zwetschgen und Pflaumen (seltener auch von Pfirsichbäumen) aus, auf denen die Eier der Tiere überwintern. Bei günstigen Flugbedingungen können die Blattläuse dabei problemlos Entfernungen von vielen Kilometern überwinden. In der Regel beträgt die zurückgelegte Distanz jedoch etwa 100 bis 1000 m, wenn Winter- und Sommerwirt in räumlicher Nähe wachsen.

Die Vermehrung der Läuse am Hopfen ist witterungsabhängig. Warme und gleichzeitig feuchte Witterung ist besonders begünstigend.

Die geflügelten Blattläuse setzen nach der Landung auf dem Hopfenblatt Larven ab, die nach etwa zehn Tagen bereits erwachsen und wieder gebärfähig sind. Diese ungeflügelten Blattläuse setzen dann im Laufe ihres drei- bis vierwöchigen Lebens durchschnittlich wieder fünf Larven pro Tag ab. Die Massenvermehrung erfolgt also auf den Blattunterseiten. Die Läuse breiten sich über die ganze Pflanze aus und besiedeln später auch Blüten und Dolden.




Abb.: Zuflug der Aphisfliegen im Blattlausmonitoring 2019 - 2021

## Bekämpfung

Für eine gezielte Bekämpfung ist eine regelmäßige Kontrolle von großer Bedeutung. Sind im Durchschnitt **50 Läuse pro Blatt oder max. 200 Läuse auf einzelnen Blättern** erreicht, wird spätestens eine **erste Bekämpfungsmaßnahme** notwendig.



Abb.: Blatt- und Doldenbefall durch Blattläuse

**Die erste Behandlung muss aber auf jeden Fall bis zur Vollblüte erfolgen.** Bei verspäteter Anwendung ist die Wirkung nicht mehr ausreichend und die Gefahr einer Resistenzbildung deutlich höher. Nachfolgende Spritzungen sind erforderlich, sobald bei den laufenden Kontrollen wieder Blattlausbefall festgestellt wird (Bekämpfungsschwelle beachten). Auf jeden Fall sollte der Hopfen bei beginnender Ausdoldung weitgehend frei von Blattläusen sein. Die unterschiedlichen Ausdoldungstermine der einzelnen Sorten sind zu beachten.

Für eine erfolgreiche Blattlausbekämpfung ist es wichtig, dass jede Spritzung optimal ausgeführt wird und die Hektaraufwandsmenge eingehalten wird.

Ferner sind sommerliche Temperaturen mit warmen Nächten notwendig. Die Blattläuse nehmen dann viel Nahrung auf und erreichen dadurch die letale Dosis.

Bei Temperaturen über 30 °C an mehreren Tagen wird die Wachsschicht (Verdunstungsschutz) der Pflanzenteile so stark, dass die Mittel nicht mehr in genügender Konzentration in das Zellgewebe eindringen können. Erst nach einem Nieder-

schlag werden die Blätter wieder weich.

Bei der Mittelwahl ist, soweit es die Zulassungssituation erlaubt, besonders auf einen regelmäßigen Wirkstoffwechsel zu achten, um keinen einseitigen Selektionsdruck auf die Population auszuüben und der Resistenzentwicklung Vorschub zu leisten.

## Auswirkung von Nützlingen auf den Blattlausbefall

Bei stärkerem Auftreten von Blattläusen am Hopfen folgt im Abstand von etwa zwei Wochen normalerweise auch ein verstärktes Auftreten von Nützlingen, die sich von den Blattläusen ernähren. Die wichtigsten Gegenspieler der Blattläuse sind dabei Marienkäfer (Larven und Adulte), Blumenwanzen (Larven und Adulte), Larven von Florfliegen und Larven von Schwebfliegen. Insbesondere im Hoch- und Spätsommer kann das Auftreten der Nützlinge den Blattlausbefall deutlich reduzieren, allerdings ist dann ein Blattlausschaden durch Besiedelung der Dolden meist schon geschehen.

Einen Sonderfall unter den Nützlingen stellt der Asiatische Marienkäfer *Harmonia axyridis* dar. Die Fraßleistung des Asiatischen Marienkäfers ist deutlich höher als jene der bekannten heimischen Arten, wie die des Siebenpunkts und kann großen Einfluss auf die Entwicklung von Blattlauspopulationen haben. Allerdings fressen diese Marienkäfer bei ungenügender Nahrungsgrundlage u. a. auch andere Marienkäferlarven und verdrängen mit ihrer Dominanz die heimischen Arten.

Da die oben genannten Nützlinge flugfähig sind und bei uns natürlich auftreten, ist ein gezielter Einsatz von Nützlingen nicht möglich. Es ist lediglich darauf zu achten, dass natürliche Auftreten von Nützlingen nicht zu stören, beispielsweise durch reduzierte Bodenbearbeitung. Besonders hilfreich ist zur Unterstützung von Nützlingen die Erhaltung von Hecken, Böschungen, etc.. Für einen im ökologischen Hopfenbau als Repellent anwendbaren Wirkstoff läuft aktuell die Beantragung als Grundstoff.

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung der Hopfenblattlaus

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]			Abstandsaufgaben (weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanlei- tung)	Bienen- gefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
		bis 3/4 Gerüsthöhe	bis vor der Blüte	ab der Blüte				
Kantaro/Eradicoat (Maltodextrin)	U	37,5 l/ha in 1500-2500 l Wasser max. 20 Anw./Jahr max. Konzentration 25 l/100 l Wasser (2,5 %)  Anwendungskonz. nicht unter 1,5 % Blattbenetzung vor Spritzstart überprüfen!			Gewässer <sup>1)</sup>	B2	F <sup>2)</sup>	<b>Nur zur Befallsminderung zugelassen!</b> Kontaktwirkung: Verkleben der Atemöffnungen. Wichtig: Vollflächige Benetzung der Blattunterseite bis kurz vor dem Ablaufen! Anwendungstemp. mind. 25 °C Spritzfilm muss in 1 Stunde antrocknen! Mehrere Behandlungen im Abstand von 5 - 7 Tagen erforderlich
Movento SC 10 (Spirotetramat)	23	0,95 l/ha	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Gewässer <sup>1)</sup> Nichtzielflächen 25 m verlustm. (90%) 5 m	B1	14	Optimaler Einsatzzeitpunkt von BBCH 37 - 55 (kurz vor der Blüte) Verzögerte Anfangswirkung v. ca. 3-5 Tage Frühzeitiger Einsatz erforderlich
Neudosan Neu (Kali-Seife) (Art. 51)	U	30 l/ha	36 l/ha in 1500 - 3000 l/ha Wasser max. Konz. 20 l in 1000 l Wasser (2 %)	40 l/ha	Gewässer 90% 20 m 20 m bewachsener Randstreifen ab 2 % Neigung	B4	F <sup>2)</sup>	<b>Vorwiegend befallsmindernde Wirkung!</b> Kontaktwirkung: Zellstruktur der Schädlinge wird aufgelöst. Wichtig: Vollflächige Benetzung der Blattunterseite bis kurz vor dem Ablaufen! Anwendungstemp. Unter 20 °C Wirkungsförderung: Hohe Luftfeuchtigkeit und langsames Antrocknen Mehrere Behandlungen im Abstand von 5 - 7 Tagen erforderlich
Teppeki/AFINTO (Flonicamid)	29	180 g/ha max. 2 Anw./Jahr 1 Anw./Jahr empfohlen			Gewässer <sup>1)</sup> Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m	B2	21	systemische und translaminare Wirkung wg. Rückstandsgefährdung max. 1 Anw.; nicht zu spät einsetzen

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

<sup>2)</sup> F = Wartezeit ist durch die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Ernte liegt!

Art. 51 = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (Risiko liegt beim Anwender)

### 6.2.5 Gemeine Spinnmilbe (Rote Spinne)

*Tetranychus urticae* KOCH

#### Bedeutung

Spinnmilben treten besonders stark in heißen, trockenen Jahren auf. Werden die Dolden befallen, sind erhebliche Ertrags- und Qualitätsverluste bis hin zum Totalausfall möglich. Entscheidend für eine schnelle Populationsentwicklung der Spinnmilben sind hohe Temperaturen (auch mikroklimatisch), weshalb südexponierte Lagen und Randbereiche häufig stärker befallsgefährdet sind.

Je nach Jahreswitterung entwickelt sich der Spinnmilbenbefall unterschiedlich schnell. Ab etwa Mitte Juni sind intensive Kontrollen notwendig. Diese sollten sich nicht nur auf das untere Drittel der Hopfenreben beschränken und müssen spätestens ab Mitte Juli die gesamte Rebe umfassen, da Spinnmilben sehr schnell nach oben "durchwandern" und innerhalb kurzer Zeit die ganze Pflanze besiedeln können. Das Wachstum der Spinnmilbenpopulation erfolgt normalerweise bis zur Ernte.



Abb.: Blattaufhellung durch Spinnmilbenbefall

#### Schadbild

Die Gemeine Spinnmilbe besiedelt vom Boden her die Hopfentriebe. Der Befall beginnt an den unteren Blättern der Pflanze. Je nach Sorte zeigen sich mehr oder weniger stark ausgeprägte gelbe Flecken an den Blättern. Meist erst mit der Lupe sind die Spinnmilben und deren weißlich-

glasige Eier zu erkennen. Auf den Blattunterseiten ist bei stärkerem Befall bereits mit bloßem Auge ein feines Gespinst sichtbar. Bei sehr starkem Befall im Hoch- und Spätsommer werden durch die Saugtätigkeit der Tiere, Blätter und Dolden innerhalb kurzer Zeit kupferrot; daher die Schadbildbezeichnung "Kupferbrand".



Abb.: Spinnmilbe mit Eiern

#### Auftreten

Überwinterungsform bei Spinnmilben sind die rot gefärbten Winterweibchen, die tiefe Temperaturen im Winter problemlos überstehen können. Je nach Frühjahrswitterung – entscheidend ist hier wohl der Zeitraum von Ende Februar bis Mitte Mai – kommen sie früher oder später aus ihren Verstecken hervor und beginnen mit der Nahrungsaufnahme und der Eiablage. Entsprechend wird auch die Wanderung zum Hopfen beeinflusst, die zwischen Ende April und Mitte Juli erfolgen kann. Je später die Spinnmilben den Hopfen erreichen, desto geringer ist die Chance, dass sie bis zur Ernte ein schädigendes Niveau ausbilden. Neben der Frühjahrswitterung, die den Grundstock für ein Jahr mit starkem Spinnmilbenbefall legt, sind schließlich besonders hohe Temperaturen im Hoch- und Spätsommer dafür ausschlaggebend, dass die Spinnmilben am Hopfen extreme Befallsstärken erreichen können. Das Wachstum der Spinnmilbenpopulation erfolgt normalerweise bis zur Ernte.



## Bekämpfungsschwelle

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde eine Bekämpfungsschwelle für Spinnmilben im Anbaugebiet Hallertau ermittelt.

Folgende Vorgehensweise ist unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Nutzung des Bekämpfungsschwellenmodells:

- regelmäßige Bestandskontrollen und Hinweise der amtlichen Hopfenberatung (z. B. Ringfax) beachten
- Ermittlung des Befallsindex an mindestens 20 Einzelblättern (je nach Größe des Hopfengartens; pro begonnenem Hektar wird eine Stichprobe von 20 Blättern empfohlen)
- Befallsbeginn: Blattunterseiten der unteren Blätter an den Randreihen bzw.

bevorzugten Besiedelungsflächen mit der Lupe auf Spinnmilben und ihre Eier untersuchen

- ab der Blüte: Blätter und angehenden Dolden in der Gipfelregion mittels Kanzel überwachen

**Als grobe Faustregel kann vor der Erstbehandlung eines Gartens davon ausgegangen werden, dass leichter Befall (bis zu 10 Spinnmilben bzw. 30 Eier) auf jedem zweiten bonitierten Blatt bereits einen bekämpfungswürdigen Spinnmilbenbefall bedeutet.**

**Junghopfen:** Häufig früher Befall. Da Junghopfen in der Regel später abgenommen wird und eine gute Durchsonnung des Bestandes gewährleistet ist, ist eine Bekämpfung fast in allen Fällen notwendig.

Tab.: Matrix zur Ermittlung des Befallsindex für jedes bonitierte Blatt

Spinnmilben	Geschätzte Anzahl Spinnmilben-Eier			
	0	< 30	30 bis 300	> 300
0	0	1	2	3
1 bis < 10	1	1	2	3
10 bis < 50	2	2	3	3
50 bis < 100	3	3	3	4
100 bis < 1000	4	4	4	5
> 1000	5	5	5	5




Abb.: Bekämpfungsschwellenmodell für die gemeine Spinnmilbe im Hopfen

### Bekämpfung

- **indirekt**

Durch das Entlauben der Hopfenreben im unteren Bereich und das Entfernen der Bodentriebe kann der Ausgangsbefall stark verringert werden, da die Spinnmilben im Mai vom Boden her zuwandern.

Vielen Nützlingsarten dienen Saumstrukturen als Überwinterungsquartier. Zu den natürlichen Gegenspielern von Spinnmilben gehören z. B. Raubmilben.

- **direkt**

Die Besiedelung erfolgt oft vom Feldrand aus. Eine genaue Kontrolle der Bestände zeigt oftmals, dass für eine erste chemische Bekämpfungsmaßnahme eine Randbehandlung ausreichend ist.

Danach ist der richtige Einsatzzeitpunkt entscheidend. Zu spät erkannter Befall lässt sich nur schwer unter Kontrolle bringen unabhängig vom eingesetzten Mittel. Die Bekämpfungsschwelle ist daher unbedingt zu beachten!

Aktuell sind gegen die Gemeine Spinn-

milbe ausschließlich Mittel mit Kontakt- bzw. Fraßwirkung zugelassen. Die Unterschiede in der Wirkungsstärke gegen die verschiedenen Stadien der Spinnmilbe können nachfolgender Grafik entnommen werden.

Für einen guten Bekämpfungserfolg ist bei Kontaktwirkstoffen auf eine ausreichende Benetzung und einen gleichmäßigen Belag zu achten. Die Wasseraufwandmenge ist an die Bestandsentwicklung und Belaubung anzupassen

Moderat warme Tages- und Nachttemperaturen fördern die Wirkung zusätzlich, da bei warmen Bedingungen die Spinnmilben aktiver sind. Die Wahrscheinlichkeit ist damit größer, dass sie mit Wirkstoff auf den Blättern in Kontakt kommen.

Der Erfolg der Behandlung muss nach 10 bis 14 Tagen überprüft werden. Bei etwaigen Folgebehandlungen mit Akariziden ist auf einen Wirkstoffwechsel zu achten, um Resistenzbildung zu verhindern.





### Möglichkeiten im Öko-Hopfenbau

In Form der gängigen phytosanitären Maßnahmen (Entlauben der Hopfenreben, Entfernen von Bodentrieben) kann auch das im Öko-Anbau verbreitete Abflammen die Bekämpfung der Spinnmilbe unterstützen.

Gezielt können Raubmilben eingesetzt werden, um den Spinnmilbendruck zu regulieren. Hierbei ist zu beachten, dass der Einsatz von Raubmilben frühzeitig erfolgen muss, bevor die Spinnmilbe große Populationen aufgebaut und sich im Gipfelbereich des Hopfens angesiedelt hat. Durch die dort vorherrschende Trockenheit und Wärme vermehrt sich die Spinnmilbe rasch. Durch Untersaaten dagegen kann ein raubmilbenfreundliches Mikroklima im Hopfengarten erzielt werden, Gräserpollen (z. B. Wiesenrispe, Rohrschwingel...) stellen außerdem eine

Ersatznahrung für Raubmilben dar. Heimische Raubmilben (*Typhlodromus pyri*) können über Schnittmaterial aus dem Weinbau angesiedelt werden. Die besonders effektiven (aber leider nicht überwinterungsfähigen) Raubmilben *Phytoseiulus persimilis* und *Neoseiulus californicus* können von den gängigen Nützlingsproduzenten bezogen werden (Übersicht unter [www.nuetzlingsanbieter.de](http://www.nuetzlingsanbieter.de)).

Neben Raubmilben zählen beispielsweise auch Blumenwanzen und der schwarze Kugelmarienkäfer zu den Fraßfeinden der Gemeinen Spinnmilbe. Natürliche und zugekaufte Nützlinge erreichen den größten Effekt gegen die Gemeine Spinnmilbe im Frühsommer, während des Aufbaus der Spinnmilbenpopulation. Allgemein sollte daher auf nützlingsschonende Pflanzenschutzmaßnahmen geachtet werden!

Entwicklungsstadien der Spinnmilbe				
	 Ei glasiger Punkt	 Larve grünlich, ohne Punkte	 Nymphen grünlich, zwei schwarze Punkte	 Adulte grünlich, zwei schwarze Punkte
<b>Kanemite SC</b>	++	+++	+++	++
<b>Kantaro</b>	-	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Milbeknock (Top)</b>	(+) <sup>1)</sup>	+++	+++	++
<b>Movento SC 100</b>	k.A. <sup>2)</sup>	+++	+++	- <sup>3)</sup>
<b>Neudosan Neu</b>	-	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Ordoval</b>	++	+++	+++	- <sup>3)</sup>

Bildquelle: Gartenjournal.net

1) Wirkung hauptsächlich auf mobile Stadien

2) Aufbau der Eihülle wird gestört und Eier sind wenig fruchtbar

3) Adulte leben weiter, erneute Eiablage wird verhindert

k.A. keine Angabe: Anzahl der Versuche am Forschungsinstitut Hüll bisher nicht ausreichend

Abb.: Wirkung der Spinnmilbenpräparate auf die einzelnen Entwicklungsstadien

# Pflanzenschutz

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung der Gemeinen Spinnmilbe

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]			Abstandsaufgaben (weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanlei- tung)	Bienen- gefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
		bis 3/4 Ge- rühth.	bis vor der Blüte	ab der Blüte				
Kantaro Eradicoat (Maltodextrin)	U	37,5 l/ha in 1500-2500 l Wasser max. 20 Anw./Jahr max. Konz. 25 l/1000 l Wasser (2,5 %)  Anwendungskonz. nicht unter 1,5 % Blattbenetzung vor Spritzstart überprüfen!			Gewässer <sup>1)</sup>	B2	F <sup>2)</sup>	<b>Nur zur Befallsminderung zugelassen!</b> <b>Kontaktwirkung:</b> Verkleben der Atemöffnungen Wichtig: gute Benetzung! Anwendungstemperatur min. 25 °C Spritzfilm muss in 1 Stunde antrocknen! Mehrmalige Behandlungen im Abstand von 5 - 7 Tagen erforderlich
Kanemite SC (Acequinocyl)	20B	Konzentration 0,15% min. 3,0 – 5,0 l/ha max. 1 Anw./Jahr			Gewässer 20 m verlustm. (90%) <sup>1)</sup>	B4	21	<b>Kontakt- und Fraßwirkung</b> nützlings- und bienenschonend gut mischbar auf eine gute Benetzung achten!
Milbeknock Milbeknock Top (Milbemectin)	6	-	-	1,5 l/ha max. 2 Anw./Jahr im Abstand von min. 21 Tagen	Gewässer nur verlustm. (90%) 20 m	B1	21	<b>Kontakt- und Fraßwirkung</b> translaminare <sup>3)</sup> Verteilung
Movento SC 100 (Spirotetramat)	23	0,95 l/ha max. 1 Anw./Jahr f. alle Indikationen Späteste Anw. BBCH 75	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Gewässer <sup>1)</sup> Nichtzielflächen 25 m verlustm. (90%) 5 m	B1	14	Optimaler Einsatzzeitpunkt von BBCH 37 - 55 (kurz vor der Blüte) Verzögerte Anfangswirkung ca. 3-5 Tage Frühzeitiger Einsatz erforderlich
Neudosan Neu (Kali-Seife) (Art. 51)	U	30 l/ha in 1500 - 3000l/ha Wasser max. 5 Anw./Jahr max. Konz. 20 l in 1000 l Wasser (2 %) Anwendungskonz. nicht unter 1,33 % Blattbenetzung vor Spritzstart überprüfen!	36 l/ha	40 l/ha	Gewässer <sup>1)</sup> 20 m bewachsener Randstreifen ab 2% Neigung	B4	F <sup>2)</sup>	<b>Vorwiegend befallsmindernde Wirkung!</b> Kontaktwirkung: Zellstruktur der Schädlinge wird auf- gelöst. Wichtig: gute Benetzung! Anwendungsbedingungen: unter 20 °C hohe Luftfeuchtigkeit und langsames Antrocknen Mehrmalige Behandlungen im Abstand von 5 – 7 Tagen erforderlich
Ordoval (Hexythiazox)	10A	0,6 l/ha in 700 - 3300 l Wasser/ha  max. 1 Anw./Jahr			Gewässer nur verlustm. (90%) 5 m	B4	28	<b>Kontaktwirkung</b> translaminare <sup>3)</sup> Verteilung, weitgehend nützlings- schonend, Einsatz vor der Blüte empfohlen aufgrund EU-Rückstandshöchstwertabsenkung auf 3 mg/kg

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

<sup>2)</sup> F = Wartezeit ist durch die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Ernte liegt!

<sup>3)</sup> translaminar= ins Blattgewebe eindringend, Blattunterseite wird geschützt

Art. 51 = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (Risiko liegt beim Anwender)

## 6.2.6 Gelegentlich auftretende Schädlinge

**Feld- und Wühlmäuse**

Besonders gefährdet sind Flächen mit minimaler Bodenbearbeitung, Gärten mit starkem Bewuchs an Gräsern und Unkräutern sowie Junghopfen.

**Vorbeugende Bekämpfung**

- Freilegung der Gänge im Bifangbereich durch rechtzeitiges Anrainen im Herbst
- Mulchen im Fahrgassenbereich
- Flache Bodenbearbeitung bei sehr starkem Befall (Achtung KULAP!)
- Bevorzugung abfrierender Zwischenfrüchte (z. B. Senf)

**Mechanische Bekämpfung**

„Bayerische Bügelfalle“ (Schlagfalle) oder „Schweizer Topcat-Falle“  
www.topcat.ch



In der Hallertau zu bestellen durch:  
BayWa Bruckbach, Tel.08442/95900-0  
BayWa Mainburg, Tel. 08751/86466-0

**Chemische Bekämpfung**

**Etisso Mäuse-frei Power-Sticks** und **Ratron Giftlinsen** mit dem Wirkstoff Zinkphosphid sind im Hopfen gegen Feld-, Erd- und Rötelmaus mit max. einer Anwendung im Jahr von 100 g Zinkphosphid pro Loch ( $\cong$  5 St.) zugelassen. Die Köder sind unzugänglich für Vögel zu platzieren, z. B. mit einer Legeflinte weit genug in die Nagetiergänge zu legen, damit kein Köder an der Oberfläche zurückbleibt.

**Schmetterlingsraupen**

(Lepidoptera: Nymphalidae, Lymantriidae, Noctuidae, Tortricidae, Crambidae)

- **Tagpfauenauge**, *Nymphalis io* (L.)
- **C-Falter**, „**Hopfenvogel**“, *Nymphalis c-album* (L.)
- **Buchen-Streckfuß**, „**Rotschwanz**“, *Calliteara pudibunda* (L.)
- **Schlehen-Bürstenspinner**, *Orgyia antiqua* (L.)
- **Ampfer-Wurzelbohrer**, *Triodia sylvina*(L.)
- **Hopfenschnabeleule**,

- *Hypena rostralis* (L.)
- **Saateule**, „**Erdraupe**“, *Agrotis segetum* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER])
- **Schattenwickler**, *Cnephasia alticolana* (HERRICH-SCHÄFFER)
- **Markeule**, *Hydraecia micacea* (ESPER)
- **Maiszünsler**, *Ostrinia nubilalis* (HÜBNER)

**Drahtwurm (Agriotes spp.)****Bedeutung**

Bei Drahtwürmern handelt es sich um die Larven von Schnellkäfer-Arten. Sie können bei stärkerem Auftreten die Hopfenstöcke stark schädigen. Gefährdet ist v. a. Junghopfen. Der ausgewachsene Käfer schädigt nicht.

**Schadbild**

Junge Wurzeln und Triebe, die sich noch in der Erde befinden, werden verbissen. Bei Trieben meistens die Köpfe, so dass sie absterben. Bei Junghopfen verfärben sich sehr häufig die bereits an die Erdoberfläche gekommenen Triebe von der Spritze her braun, sie werden brüchig und sterben ab. Drahtwürmer fressen vor allem im Frühjahr und Herbst bei 10-17 °C.

**Befallskontrolle**

Köder zur Befallsfeststellung: Möhren, Kartoffelhälften oder gekeimte Getreidekörner ca. 5-6 cm tief in Erde legen.

**Nacktschnecken****Bedeutung**

Schädigungen bis zum Totalfraß können im Junghopfen und bei der Ansaat von Zwischenfrüchten auftreten.

**Schadbild**

Die Blätter sind von Schleimspuren überzogen und skelettiert, d. h. zwischen den Blattrippen ist das Gewebe ausgefressen.

**Schwarze Bohnenblattlaus**

*Aphis fabae* SCOPOLI

**Thripse** (Thysanoptera: Thripidae)**Zikaden** (Cicadina: Cicadellidae)

## 6.3 Krankheiten

### 6.3.1 Peronospora

*Pseudoperonospora humuli* (MIYABE et TAKAHASHI) WILSON

#### Bedeutung

Diese Pilzkrankheit tritt jedes Jahr in unterschiedlicher Stärke auf. Alle Pflanzenteile können befallen werden. Blüten- und Doldenbefall kann zu vollständigem Ertragsverlust führen. Man unterscheidet zwischen Primär- und Sekundärinfektion.

#### Primärinfektion

##### Schadbild

Die Peronospora überwintert in den unterirdischen Pflanzenteilen und dringt im Frühjahr in die jungen Sprosse ein. Erkrankte Bodentriebe sind gestaucht, gelbgrün gefärbt und haben nach unten zusammengekrallte Blätter ("Bubiköpfe"). Gipfel- und Seitentriebe wachsen kaum mehr weiter und vertrocknen. An den Blattunterseiten solcher Triebe bildet sich häufig entlang der Blattadern ein grauschwarzer Belag aus Pilzsporen. Diese bilden die Infektionsquelle für nachfolgende Sekundärinfektionen.



Abb.: Seitentrieb mit Peronosporaprimärinfektion

#### Bekämpfungsempfehlung

Eine Bekämpfung muss spätestens dann durchgeführt werden, wenn an mehr als **1 % der Stöcke Bubiköpfe** zu finden sind.

Ist nur ein Teilstück des Hopfengartens betroffen, genügt es, dieses zu behandeln. Es hat sich bewährt, Peronospora-anfällige Sorten, Junghopfen im ersten Ertragsjahr und stockempfindliche Sorten wie z. B. Hallertauer Taurus vorbeugend zu behandeln.

Wenn der Bestand im Vorjahr mit Peronospora befallen war, kann durch tiefen Schnitt des Hopfens die Primärinfektion vermindert werden.



Abb.: Peronosporaprimärinfektion „Bubikopf“

**Eine ordnungsgemäße Bekämpfung der Primärinfektion ist Voraussetzung für die Bekämpfung der Sekundärinfektion nach dem Peronospora-Warndienst. Dazu gehört auch, dass der gesamte Umkreis der Fläche frei von Wildhopfen und schlecht gerodeten Hopfengärten ist.**

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Peronospora-Primärinfektion

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]			Abstandsauflagen  (weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanleitung)	Bienengefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
		bis $\frac{3}{4}$ Gerüsth.	bis vor der Blüte	ab der Blüte				
<b>Systemische Mittel:</b>								
Aliette WG (Fosetyl-Al)	P7	2,5 kg/ha max. 2 Anw. für Primärbehandlung im Abstand von min. 14 Tagen			Gewässer 5 m verlustm. (90%) <sup>1)</sup>	B4	14	Spritzbehandlung: Aliette WG wird hauptsächlich über das Blatt aufge- nommen; deshalb nicht zu früh aus- bringen! Werden beim Ausputzen und Anleiten noch Bubiköpfe gefunden, ist eine weitere Behandlung notwendig.
		2 Anwendungen: 1. Anwendung nach dem Austrieb bis 25 - 30 cm Wuchshöhe, 7 Tage vor dem Ausputzen 2. Behandlung nach dem Ausputzen/Anleiten			Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m			
Profler (Art. 51) (Fosetyl-Al + Fluopicolide)	P7 + B5	1,125 g/Stock in 0,2 bis 0,5 l Wasser/Stock max 1 Anw./Jahr max. 2,25 kg/ha			Gewässer 10 m verlustm. (90%) <sup>1)</sup>	B4	F <sup>2)</sup>	Von Entfaltung des 3. bis 5. Laubblatt- paares anwendbar; Anwendung als Einzelpflanzenbehand- lung <b>vor dem Ausputzen und Anlei- ten spätestens bis zum 30. April</b> Aufnahme hauptsächlich über das Blatt
			Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m					

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

<sup>2)</sup> F = Wartezeit ist durch die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Ernte liegt!

Art. 51 = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (= Risiko liegt beim Anwender)

## Sekundärinfektion

### Schadbild

Sekundärinfektionen erfolgen durch Zoosporangien, die mit dem Wind verbreitet werden und an Blätter, Blüten und Dolden gelangen. Bei Regenbenetzung schlüpfen daraus Zoosporen und dringen über Blattöffnungen in das junge Pflanzengewebe ein. Auf der Blattoberseite bilden sich zuerst gelbliche Flecken, die später verbräunen. An den Befallsstellen wächst auf der Blattunterseite ein grauschwarzer Pilzsporenbelag, der wiederum Ausgangspunkt für neue Zoosporangienbildung und Sekundärinfektion ist.

Infizierte Blüten verhärten, sterben ab und die Doldenbildung wird verhindert. Bei beginnendem Doldenbefall sind die Vorblätter stärker verfärbt als die Deckblätter, was zu einem gescheckten Aussehen der Dolde führt. Im Endstadium ist die ganze Dolde schokoladenbraun.



Abb.: *Peronospora*-Sekundärinfektion an Dolden

### Bekämpfung nach *Peronospora*-Warn-dienst

Die Bekämpfung der *Peronospora*-Sekundärinfektion erfolgt nach Feststellung erster Befallssymptome und/oder nach den Hinweisen und Aufrufen des amtlichen Warndienstes. Hierbei wird zwischen anfälligen und toleranten Sorten differenziert. In **Bayern** hat die Landesanstalt für Landwirtschaft einen ***Peronospora*-Warn-dienst** eingerichtet. An 5 Stationen in der Hallertau und an jeweils einer Station in Spalt und Hersbruck wird mit Hilfe einer Sporenfalle täglich die Anzahl der Zoosporangien in der Luft ermittelt.

Witterungsdaten von über 10 Messstationen, die in EDV-Witterungsmodellen verarbeitet werden, liefern zusätzliche Informationen zur Vorhersage der *Peronospora*-Befallswahrscheinlichkeit. Aufgrund der Vielzahl der gewonnenen Daten gibt der *Peronospora*-Warndienst täglich über den telefonischen Ansagedienst und das Internet bekannt, ob *Peronosporagefahr* besteht. Steigt die Anzahl der Zoosporangien in der 4-Tages-Summe vor der Blüte über 30 (50 bei toleranten Sorten) und ab der Blüte über 10 (20 bei toleranten Sorten) bei gleichzeitiger Regenbenetzung am Tag von mehreren Stunden, erfolgt ein Spritzaufruf für die jeweiligen Sortengruppen.

Die **Spritzaufrufe** werden über **Telefon-ansage, Internet, Ringfax oder SMS** bekannt gegeben. Bei Spritzaufrufen **Sortenhinweise beachten!** Hüller Zuchtsorten sind weniger anfällig gegen *Peronospora*. Die höhere Bekämpfungsschwelle ist durch mehrjährige Versuche und Praxiserfahrungen abgesichert.

**Eine ordnungsgemäße Bekämpfung der Primärinfektion ist Voraussetzung für die Bekämpfung der Sekundärinfektion nach dem *Peronospora*-Warn-dienst.** Wer die Primärinfektion nicht in den Griff bekommt und bis in den Juni hinein „Bubiköpfe“ an Boden- und Seitentrieben feststellt, hat einen höheren Infektionsdruck im Hopfengarten und kann sich nur bedingt nach dem *Peronospora*-Warn-dienst richten. Infektionsquellen stellen auch Wildhopfen und schlecht gerodete Hopfengärten dar, weil sie meist unter *Peronospora*-Befall leiden und somit benachbarte Hopfengärten gefährden. Die **Verordnung über die Bekämpfung der *Peronosporakrankheit*** des Hopfens verpflichtet die Pflanze Hopfengärten sauber zu roden oder die Triebe mindestens 4 m aufzuleiten und den Bestand ausreichend, mindestens aber dreimal gegen *Peronospora* zu behandeln. Die Gemeinde ist für die Überwachung der Verordnung zuständig.



Im **Anbaugebiet Tettngang** werden täglich an **vier Stationen** sowohl die infektiösfähigen Zoosporangien in der Luft als auch die jeweiligen Wetterdaten (Temperatur, relative Luftfeuchte, Blattbenetzungszeiten) erfasst und mit einem EDV-gestützten Simulationsmodell bezüglich Infektionsgefahren verrechnet. Die **Warnaufrufe** werden über den **telefonischen Auskunftgeber, Rundfax, E-Mail und Internet** bekannt gegeben.

Im **Anbaugebiet Elbe-Saale** wird von Mitte Mai bis Ende August täglich für jeden Hopfenstandort ein spezifischer Peronosporaindex auf der Basis bestimmter Wetterdaten errechnet und bei Erreichen des kritischen Wertes, das heißt einer für die Entwicklung der Peronospora günstigen Witterung, Warnung an die betreffenden

Betriebe gegeben. Dieser Warndienst wird in Sachsen/Anhalt von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau in Bernburg betrieben.

**Ansagen des Peronospora-Warndienstes**

Der tägliche Abruf der Warndiensthinweise vom telefonischen Ansagedienst oder aus dem Internet ermöglicht es dem Pflanzler, ausschließlich bei Infektionsgefahr zu spritzen. Folgendes ist dabei zu beachten:

1. Bestände laufend auf Krankheitsmerkmale kontrollieren.
2. Bekämpfung spätestens zwei Tage nach Aufruf durchführen.
3. Wildwachsende Hopfen roden, weil sie mit ihren Sporen benachbarte Hopfengärten gefährden.

**Internetadresse bzw. Telefonnummern des Peronospora-Warndienstes**

**Bayern:** Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Wolnzach  
**08161/8640-2460**  
<http://www.lfl.bayern.de/ipz/hopfen/030222>



**Baden-Württemberg:**  
 Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg,  
 Außenstelle Tettngang  
**01805/197197-25**  
[http://www.ltz-bw.de/pb/Lde/Startseite/Service/Hopfenbau\\_Warndienst](http://www.ltz-bw.de/pb/Lde/Startseite/Service/Hopfenbau_Warndienst)  
<https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/landwirtschaft/fachinformationen/hopfenbau/pflanzenschutz/>



Tab.: Spritzfolgen nach Warndienstaufruf zur Peronosporabekämpfung!

Empfehlung zur Mittelwahl während der Saison			
Primärbekämpfung	Sekundärbekämpfung		
	bis zur Gerüsthöhe	bei beginnender Ausdoldung	Abschlussbehandlung
Aliette WG Profler	Aliette WG Aktuan Forum, Dimethofin Folpan 80 WDG	Aktuan Forum, Dimethofin Delan WG Orvego Revus Airone SC Coprantol Duo Cuprozin progress Funguran progress Bellis Ortiva	Forum, Dimethofin Delan WG Orvego Revus Airone SC Coprantol Duo Cuprozin progress Funguran progress

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Peronospora-Sekundärinfektion

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]			Abstandsauflagen  (weitere Bestimmungen in der Ge- brauchsanleitung)	Bienen- gefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
		bis ¾ Gerüsth.	bis vor der Blüte	ab der Blüte				
<b>Systemische Mittel:</b>								
Aliette WG (Fosetyl-AI)	P7	4,5 max. 8 Anw./Jahr	7,5	10	Gewässer verlustm. (90%) <sup>1)</sup> 5 m Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m	B4	14	bei Tankmischungen mit SC- Formulierungen Mischreihenfolge beachten
<b>Teilsystemische Mittel:</b>								
Aktuan (Dithianon + Cymoxanil)	M9 + U	1,8 max. 10,6 kg/Jahr max. 5 Anw./Jahr	2,7	4,0	Gewässer nur verlustm. (90%) 20 m Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m	B4	14	nicht zur Abschlussbehandlung
Bellis <sup>2)</sup> (Pyraclostrobin + Boscalid)	C3 + C2	0,9 max. 2 Anw./Jahr empfohlen	1,4	2,0	Gewässer nur verlustm. (90%) 15 m Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m	B4	28	Zulassung auch gegen Echten Mehltau, sehr gute Nebenwirkung auf Botrytis
Dimethofin Forum (Dimethomorph)	H5	1,8 max. 6 Anw./Jahr	2,68	4,0	Gewässer 15 m verlustm. (90%) <sup>1)</sup>	B4	10	
Folpan 80 WDG (Folpet)	M4	1,87 max. 3 Anw./Jahr	3,74	4,68	Gewässer <sup>1)</sup> 20 m bewachsener Rand- streifen ab 2% Neigung	M4	21	Einsatz wird lediglich bis zur Blüte empfohlen wegen <b>Rückstandsproblematik:</b> Folpet (JP, US) + Captan
Ortiva <sup>2)</sup> (Azoxyastrobin)	C3	0,75 max. 3,2 l/Jahr max. 2 Anw./Jahr	1	1,6	Gewässer nur verlustm. (90%) 10 m 10 m bewachsener Rand- streifen ab 2% Neigung Nichtzielflächen 25 m verlustm. (90%) 5 m	B4	28	Nebenwirkung auf Botrytis und Echten Mehltau  Bei starkem Infektionsdruck Kombination mit anderen Pero-Produkten sinnvoll
Orvego (Dimetomorph +Ametoctradin)	H5 + C8	- max. 2 Anw./Jahr	2,7	2,7	Gewässer nur verlustm. (90%) 5 m Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m	B4	10	
Revus (Mandipropamid)	H5	0,75 max. 2 Anw./Jahr	1	1,6	Gewässer 15 m verlustm. (90%) <sup>1)</sup>	B4	14	

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferline bzw. Böschungsoberkante)

<sup>2)</sup> nur zwei Anwendungen mit Strobilurinhaltenen Pflanzenschutzmitteln pro Saison empfohlen

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Peronospora-Sekundärinfektion

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]			Abstandsaufgaben  (weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanleitung)	Bienen- gefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
		bis $\frac{3}{4}$ Gerüsth.	bis vor der Blüte	ab der Blüte				
<b>Kontaktmittel:</b>								
Delan WG (Dithianon)	M9	0,9	1,4	2	Gewässer nur verlustm. (90%) 20 m	B4	14	
Airone SC (Kupferhydroxid+ Kupferoxychlorid)	M1	3,31	4,92	7,35	Gewässer nur verlustm. (90%) 15 m Nichtzielflächen verlustm. (90%) 20 m verlustm. (90%) 0 m	B4	14	max. 4000 g Reinkupfer pro ha und Jahr
Coprantol Duo (Kupferhydroxid+ Kupferoxychlorid)	M1	3,21	4,78	7,14	Gewässer nur verlustm. (90%) 15 m Nichtzielflächen verlustm. (90%) 20 m verlustm. (90%) 0 m	B4	14	max. 4000 g Reinkupfer pro ha und Jahr
Cuprozin progress (Kupferhydroxid)	M1	2,4	3,6	5,4	Gewässer nur verlustm. (90%) 15 m Nichtzielflächen verlustm. (90%) 25 m verlustm. (90%) 5 m	B4	7	max. 4000 g Reinkupfer pro ha und Jahr
Funguran progress (Kupferhydroxid)	M1	2,4	3,6	5,4	Gewässer nur verlustm. (90%) 15 m Nichtzielflächen verlustm. (90%) 5 m verlustm. (90%) 0 m	B4	7	max. 4000 g Reinkupfer pro ha und Jahr

Kupferpräparate

### 6.3.2 Botrytis

*Botrytis cinerea* PERSOON

#### **Bedeutung**

Diese Pilzkrankheit tritt von Jahr zu Jahr unterschiedlich stark auf. Der wirtschaftliche Schaden entsteht vor allem durch die Qualitätsbeeinträchtigung. Die Unterscheidung von Botrytis- und Spätmehltaubefall ist oft bei der getrockneten Dolde nicht mehr eindeutig möglich.

#### **Schadbild**

Botrytis befällt Blüten und Dolden. Zur Zeit der Hopfenblüte werden die Griffel befallen. Von dort geht die Krankheit auf die Dolden über. Vor allem windgeschützte feuchte Lagen mit dichten Beständen begünstigen den Befall. Die Dolden werden meist an den Spitzen rotbraun; daher wird das Schadbild auch als "Rotspitzigkeit" bezeichnet. Selten werden die ersten Blättchen vom Doldenstiel her befallen. Vor

allem bei Feuchtigkeit können das Pilzgeflecht und die bis zu 1 cm langen Pilzfäden an den befallenen Stellen mit bloßem Auge erkannt werden. Die rotbraune Färbung der Dolden bei Botrytis ist heller als bei Befall mit *Peronospora*.

#### **Bekämpfung**

Vorbeugende Bekämpfung ist nur in Lagen, die als gefährdet bekannt sind, und bei feuchter Witterung während der Blüten- und Doldenbildung, erforderlich. Bei anfälligen Sorten sind Spritzfolgen von Peronosporamitteln mit Nebenwirkung auf Botrytis notwendig. Besonders anfällig sind die Sorten Hallertauer Magnum, Hallertauer Merkur und Polaris.

#### **Bekämpfungsmittel**

Zurzeit ist kein Mittel zugelassen. Die Produkte Bellis, Flint und Ortiva haben eine Nebenwirkung gegen Botrytis.

### 6.3.3 Echter Mehltau

*Sphaerotheca macularis*

Ehemals: *Podosphaera macularis* (BRAUN)

#### **Bedeutung**

Der Echte Mehltau ist eine bedeutende Krankheit im Hopfen, die nicht in jedem Jahr und auf jedem Standort gleich stark auftritt. Auch gibt es deutliche Unterschiede in der Sortenanfälligkeit. Sehr anfällig sind im Allgemeinen die Hochalphasorten wie Herkules, Hallertauer Magnum, Hallertauer Taurus, Nugget und Polaris. In gefährdeten Lagen und anfälligen Sorten werden auf den Blättern bereits im Mai die ersten Pusteln festgestellt. Hinzu kommen starke Blüten- und Doldeninfektionen sowie Spätmehltau. Dadurch kann der Ertrag und die Qualität stark beeinträchtigt werden.

#### **Schadbild**

Erste Befallssymptome sind vereinzelte pustelartige Erhebungen auf der Blattober- und selten auf der Blattunterseite, aus

denen sich mehlartige, weiße Flecken entwickeln.



Abb.: „Weiße Pusteln“ des Echten Mehltaus auf der Blattoberseite

Diese Mehltaupusteln können an allen oberirdischen Pflanzenteilen auftreten. Dolden können noch in jedem Reifestadium befallen werden, zeigen dann häufig Missbildungen und trocknen ein. Echter Mehltau tritt ab Anfang Mai, insbesondere bei warmer Witterung und in dichten, blattreichen Beständen auf. Hopfen in Staulagen und an Waldrändern sind ebenfalls

besonders gefährdet. Eine erfolgte Mehltauinfektion überdauert sowohl Regen- als auch Trockenperioden. In Jahren mit langen Regenperioden treten Pusteln auch verstärkt auf der Blattunterseite auf.

### Begünstigende Faktoren

#### Standort

- offen zur Hauptwindrichtung
- Staulage nach Osten (Hang, Waldrand), bei Ostwind entsprechend umgekehrt
- Infektionsquellen in der Flur (Wildhopen, aufgelassene Gärten)

#### Anbau

- anfällige Sorten
- Ausbringung von frischem, nicht verrottem Rebenhäcksel
- mangelnde Hygienemaßnahmen (kein Entlauben/Entfernen von Bodentrieben)
- dichte blattreiche Bestände (überhöhte N-Düngung, Zahl der angeleiteten Triebe, blattreiche Sorten)
- Anbausystem (z. B. Non Cultivation)
- lange Blüh- und Ausdoldungsphase

#### Vorbeugende Maßnahmen

- Hygienemaßnahmen beachten (Schneiden, Ackern, Entlauben, Hopfenputzen)
- Infektionsquellen in der Umgebung ausschalten (Wild-/Durchwuchshopfen)
- angepasste N-Düngung

### 6.3.4 Stockfäule

#### Bedeutung

Das Faulen der Stöcke verursacht eine verminderte Triebzahl, geringe Vitalität, Stressempfindlichkeit, Nährstoffaufnahmestörungen, geringes Längenwachstum und verminderte Seitentrieblänge, bis hin zu Welkeerscheinungen. Als Ursache der Stockfäule kommen in Frage: Schneiden bei Kahlfrösten, Staunässe, Überdüngung, Bodenverdichtung, Infektion mit *Peronospora*, *Phytophthora*, *Fusarium* oder *Verticillium*. Nur eine genaue Untersu-

- anfällige Sorten möglichst nicht auf einer gefährdeten Lage anpflanzen
- bei anfälligen Sorten und Problemlagen nur zwei Triebe pro Aufleitung (bei TU, PE drei Triebe)

#### Bekämpfung

Die derzeit zugelassenen chemischen Pflanzenschutzmittel wirken hauptsächlich vorbeugend, weshalb eine Bekämpfung des Echten Mehltaus nur dann Erfolg verspricht, wenn sie bei anfälligen Sorten und in Befallslagen prophylaktisch erfolgt oder bei den übrigen Sorten spätestens beim Auftreten der ersten Mehltaupusteln durchgeführt wird.

Zur Bekämpfung des Spätmehltaubefalls werden auch noch späte Fungizidanwendungen im August bis kurz vor der Ernte empfohlen. Die Wartezeiten der einzusetzen Mittel sind hier besonders zu beachten.

**Bei anfälligen Sorten und in gefährdeten Lagen werden wöchentliche sorgfältige Kontrollen empfohlen**, um den Befallsbeginn rechtzeitig festzustellen.

#### Wichtige Konsequenzen:

- Wildhofen konsequent beseitigen und im Frühjahr rechtzeitig mit der Bekämpfung des Echten Mehltaus beginnen.
- Auch bei sehr geringem Infektionsdruck kann es bei günstigen Witterungsbedingungen im Juli/August zu Neuinfektionen und Spätmehltaubefall kommen.

chung kann im Einzelfall klären, wodurch die Stockfäule verursacht wird. Besonders anfällig sind die Sorten Hersbrucker Spät, Brewers Gold und Hallertauer Taurus.

#### Bekämpfung

Zur Steigerung der Abwehrkraft befallener Stöcke kann Profiler oder Aliette WG nach dem Aufdecken und Schneiden bzw. bei beginnendem Stockaustrieb eingesetzt werden. Eine gesonderte Bekämpfung der *Peronospora*-Primärinfektion wird dadurch hinfällig.

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Echem Mehltau

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoffgruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]			Abstandsauflagen  (weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanleitung)	Bienengefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
		bis ¾ Gerüsth.	bis vor der Blüte	ab der Blüte				
Bellis <sup>2)</sup> ( <i>Pyraclostrobin + Boscalid</i> )	C3+C2	0,9	1,4	2,0	Gewässer nur verlustm. (90%) 15 m Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m	B4	28	Zulassung auch gegen Peronospora; sehr gute - Nebenwirkung auf Botrytis
Flint <sup>2)</sup> ( <i>Trifloxystrobin</i> )	C3	0,56	0,83	1,25	Gewässer nur verlustm. (90%) 20 m  20 m bewachsener Rand- streifen ab 2% Neigung  Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%)	B4	14	Gute Nebenwirkung auf Peronospora; Nebenwirkung auf Botrytis
Vivando (Art. 51) ( <i>Metrafenone</i> )	B6	0,3	0,44	0,66	Gewässer 10 m verlustm. (90%) <sup>1)</sup> Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90%) 0 m	B4	3	

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

<sup>2)</sup> nur zwei Anwendungen mit strobilurinhaltigen Pflanzenschutzmitteln pro Saison empfohlen

Art. 51 = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (Risiko liegt beim Anwender)

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Echtem Mehltau

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]			Abstandsauflagen  (weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanleitung)	Bienengefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung	
		bis ¾ Gerüsth.	bis vor der Blüte	ab der Blüte					
Kumar (G) (Kaliumhydrogen- carbonat)	U	2,2	3,3	5,0	Gewässer <sup>1)</sup> Nichtzielflächen verlustm. (90%)	20 m 0 m	B4	1	Keine Mischung mit Zusatz- stoffen oder pH-Wert ab- senkenden Mitteln
Sythane 20 EW (Myclobutanil)	G1	-	-	1,5	Gewässer verlustm. (90%) <sup>1)</sup> Nichtzielflächen verlustm. (90%)	20 m 5 m 20 m 0 m	B4	14	Sicherheitszuschlag zur Warte- zeit empfohlen  Aufbrauchfrist bis 30.11.2022
Microthiol Hopfen Kumulus WG Thiovit Jet (Schwefel)	M2	5,6	8,4	12,5	Gewässer verlustm. (90%) Nichtzielflächen verlustm. (90%)	20 m 20 m 0 m	B4	7	Wirkung nur vorbeugend  Um Fehlgerüche beim Einsatz von Schwefelpräparaten zu vermei- den, sollte die letzte Behandlung nicht zu spät erfolgen!
Thiopron (Schwefel)	M2	7,5	7,5	7,5	Gewässer verlustm. (90%) <sup>1)</sup> Nichtzielflächen verlustm. (90%)	15 m 20 m 0 m	B4	1	Einsatz nur bis 25 °C empfohlen

Schwefelpräparate

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

Art. 51 = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (= Risiko liegt beim Anwender)

### 6.3.5 Verticillium-Welke

*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin (ehemals: *V. albo-atrum* Reinke et Berthold) und *Verticillium dahliae* Klebahn

#### Bedeutung

In den letzten Jahren ist wieder eine kontinuierliche Ausbreitung der Befallsfläche im Anbaugebiet Hallertau zu beobachten. Der Erreger des bodenbürtigen Pilzes ist *Verticillium nonalfalfae*, welcher sich in milde und letale (aggressive) Formen unterscheiden lässt. Die letalen *Verticillium*-Stämme befallen bis dahin als tolerant eingestufte Hopfensorten und können zu erheblichen Ertragsausfällen führen. In den letzten Jahren konnte die Ausbreitung der letalen (aggressiven) Form über das gesamte Anbaugebiet beobachtet werden.

#### Biologie und Schadbild

Der Pilz infiziert seine Wirtspflanzen über die Wurzel und gelangt so in die Leitbahnen der Hopfenpflanze. Das von unten nach oben wachsende Pilzgeflecht verstopft die Leitbahnen und bildet Sporen, die sich mit dem Wasserleitungssystem in unterschiedliche Pflanzenteile ausbreiten. Zusätzlich werden toxische, zellwandabbauende Enzyme vom Pilz ausgeschieden, die in der Pflanze Abbau- und Alterungsprozesse auslösen.

Die Welke-Symptome äußern sich ab Anfang Juni durch ein Aufhellen der unteren Blätter, die im weiteren Verlauf zu Nekrosen werden. Je nach Fortschreiten des Befalls sterben immer mehr Blätter ab.

Des Weiteren kann die Krankheit den Übergang der vegetativen Phase zur generativen Phase verhindern, weshalb Blüte und Ausdoldung gestört werden können. Nicht abgestorbene Dolden weisen bräunliche Verfärbungen auf und verschlechtern so die Qualität des Ernteguts. Schneidet man den unteren Teil einer befallenen Rebe auf, lässt sich eine Verbräunung der Leitbahnen feststellen. Zum Teil kommt es zu einer Verdickung der befallenen Reben an der Basis.

Verbreitet wird der Schaderreger durch infizierte Pflanzen, nicht hygienisierte Erntereste, den Boden und dikotyle Zwischenfrüchte und Unkräuter, die als Wirtspflanzen dienen können. Durch sein Dauermyzel kann *Verticillium* bis zu 5 Jahre ohne Wirtspflanzen im Boden überleben.

Verdächtige Pflanzen können mithilfe eines Wachstumstests im Labor auf *Verticillium*-Befall untersucht werden. Allerdings kann bei diesem Test nicht zwischen milder und letaler Form differenziert werden.

Kosten der Untersuchung: **49,50 €**.

Anmeldung von Proben per E-Mail

[mykologie@LfL.Bayern.de](mailto:mykologie@LfL.Bayern.de) oder

Telefon: **08161 8640 5651**

Hinweise zur Probenziehung und den Versand finden sich unter

<https://www.lfl.bayern.de/ips/gartenbau/023464/index.php>



Eine **Unterscheidung der milden und letalen (aggressiven) Krankheitsform** ist aufgrund der Symptome schwierig und nur über den molekularen Nachweis (Real-time-qPCR) möglich. Auf befallenen Flächen lässt sich meist eine Mischung aus milden und letalen Rassen nachweisen.

Anmeldung von Proben per E-Mail

[hop.pfla@lfl.bayern.de](mailto:hop.pfla@lfl.bayern.de) oder

Telefon: **08161 8640 2335**

#### Vorbeugende Maßnahmen bei beginnendem Welke-Befall

- gezieltes Entfernen der verdächtigen Hopfenstöcke (mit Wurzelwerk!) sowie der direkten Nachbarpflanzen → auch Pflanzen ohne Symptome können infiziert sein
- Wiederaustrieb bekämpfen
- Düngung:
  - reduzierte Stickstoffdüngung
  - N<sub>min</sub>-Untersuchung



- keine stark N-haltigen organischen Dünger (Gülle)
- Anbau neutraler Zwischenfrüchte (Gräser oder Getreide)
- **Feldhygiene** beachten:
  - erst gesunde, dann befallene Gärten bearbeiten
  - Desinfektion der Bearbeitungsgeräte (MENNO Florades)
  - Rebenhäcksels-Rückführung vermeiden
  - infizierten Rebenhäcksels mindestens 4 Wochen einer ausreichend thermischen Behandlung (durchgehende Heißrotte mit Wenden des Haufens) unterziehen
  - kein Fehsermaterial aus infizierten Hopfengärten entnehmen
  - ausschließlich Pflanzgut mit Pflanzenpass verwenden

#### Bei stärkerem Welke-Befall

- bei nesterweisem Auftreten im Hopfengarten einen Umgriff von einer Reihe links und rechts des Befallherdes (auch symptomlose Pflanzen) und

jeweils mind. 5 m in Längsrichtung roden

→ kein erneutes Anpflanzen mit Hopfen, sondern gerodete Fläche mit Getreide begrünen

- keine Erzeugung und Abgabe von Fehsermaterial im/aus dem Betrieb
- Sanierung: Anbaupause von mind. 3 Jahren
  - Ansaat einer Welke-neutralen Kultur (Gräser, Getreide, Mais)
  - Unkraut bekämpfen, da potentielle Wirtspflanzen
  - Wiederaustrieb bekämpfen

#### Bekämpfung:

Bisher sind keine direkten Bekämpfungsmaßnahmen bekannt. Zur Befallsreduzierung werden die genannten, vorbeugenden Präventionsmaßnahmen empfohlen. Weitere Informationen finden sich unter

<https://www.lfl.bayern.de/ipz/hopfen/181766/index.php>



### 6.3.6 Viruserkrankungen

*Apfelmosaik-, Prunus Necrotic Ringspot-, Hopfenmosaik-, Arabis Mosaik-, Latentes Hopfen- und Amerikanisches Latentes Hopfen - Virus*

#### Bedeutung

Viruskrankheiten sind in allen Hopfenanbaugebieten verbreitet. Ertrag und Alpha-säuregehalt können je nach Virusart, Befallsstärke und Sorte mehr oder weniger stark vermindert werden.

#### Schadbild

Bei Befall mit Hopfenmosaik-Virus findet man häufig mosaikartige Aufhellungen an den Blättern. Bei Befall mit Apfelmosaik-Virus zeigen sich auch ring- und bänderförmige Blattaufhellungen. Die Blätter verhärten und drehen sich ein. Optisch kann von den Befallssymptomen nicht auf die Art und Stärke des Virusbefalls geschlossen werden.

Häufig treiben die mit Virus verseuchten Stöcke im Frühjahr scheinbar normal aus, zeigen jedoch nach kurzer Zeit unterschiedlich starke Wachstumsdepressionen. Dabei zeigen erkrankte Pflanzen meist gestauchten Wuchs, entwickeln sich zögernd und erreichen oft nicht die Gerüsthöhe. Starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sowie lang anhaltende kühle Witterungsperioden führen zu einer stärkeren Ausprägung vor Virosen. Bei nachfolgend wüchsiger Witterung kann der Neuzuwachs wieder ein normales Aussehen erreichen.

#### Bekämpfung

Da eine **chemische Bekämpfung** nicht möglich ist, muss bei der Neuanlage auf virusfreies Pflanzmaterial geachtet werden. Althopfen muss sorgfältig gerodet und vor der Neupflanzung sollte der

Hopfengärten 1 Jahr von Hopfen freigehalten werden.

### Qualitätspflanzgut

Die Vermehrung des Qualitätspflanzgutes, das in Bayern mit dem Zertifikat A versehen wird, erfolgt in Gewächshäusern und Laborbetrieben. Die für die Herstellung von Qualitätspflanzgut verwendeten Mutterpflanzen wurden vor der Vermehrung auf die oben genannten Virusarten untersucht.

Im **Anbaugebiet Elbe/Saale** werden von ausgewählten, leistungsfähigen Pflanzen aus Stamm- und Erhaltungszuchten, die

im Vermehrungsbetrieb „pac Elsner“ Dresden durch Wärmebehandlung virusfrei gemacht wurden, Mutterpflanzen gewonnen, die als Ausgangsmaterial für die Vermehrung verwendet werden. Diese werden im Vermehrungsbetrieb unter Glas bewurzelt, ab Mitte Mai an den Landwirtschaftsbetrieb Grosser in Coswig geliefert und sofort im Freiland ausgepflanzt. Bis zum Herbst entwickeln sich daraus kräftige Jungpflanzen mit einem ausgeprägten Wurzelstock von 30 - 100 g und ca. 20 - 30 gut ausgebildeten Augen, die ab Mitte Oktober ausgeliefert werden.

### 6.3.7 Viroide

*Hop latent viroid (HLVd), Hop stunt viroid (HSVd), Citrus bark cracking viroid (CBCVd)*

#### Bedeutung

Viroide zählen zu den kleinsten bekannten Schaderregern bei Pflanzen. Ihre Erbsubstanz besteht lediglich aus einem ringförmigen, einzelsträngigen Ribonukleinsäure-Molekül und im Unterschied zu Viren besitzen sie keine Proteinhülle. Die ersten Symptome einer Citrus bark cracking viroid (CBCVd)-Infektion an Hopfen wurden 2007 in Slowenien beobachtet. Im Jahr 2014 konnten diese Symptome dem CBCVd zugeordnet werden. Im Jahr 2019 wurde das Citrus bark cracking viroid (CBCVd) erstmalig in Deutschland und in der Hallertau auf einer Praxisfläche nachgewiesen. Wie lange der Schaderreger bereits auf deutschen Hopfenflächen vorhanden ist, kann nicht genau bestimmt werden. In Slowenien erfolgte die Infektion vermutlich durch Biokompost mit Zitrusfrüchten und Zitruschalen, welcher zur Düngung in Hopfengärten ausgebracht wurde. Die Herkunft in Deutschland ist unbekannt.

Ein weiteres sehr gefährliches Viroid ist das Hop stunt viroid (HSVd), welches zu gleich starken Ertrags- und Qualitätsverlusten führen kann wie CBCVd. HSVd trat erstmals in den 1940er Jahren in Japan

und Korea auf. 2004 wurde das Viroid zum ersten Mal auch in Hopfengärten der USA sowie 2007 in China nachgewiesen. In der Hallertau sind derzeit keine Infektionen in Praxisgärten bekannt.

Ein drittes beim Hopfen nachgewiesenes Viroid ist das Hop Latent Viroid (HLVd), welches wegen seiner leichten Übertragbarkeit weltweit in allen großen Hopfenanbaugebieten zu finden ist. Da HLVd-Befall bei Hopfen zu keinen drastischen Auswirkungen auf Ertrag und Alphasäuregehalt führt, wird dieser toleriert.

Ist ein Bestand infiziert verbreiten sich Viroide sehr leicht mechanisch bei Kulturarbeiten über den hoch infektiösen Pflanzensaft und damit verunreinigten Geräten.

#### Schadbild

HSVd-infizierte Hopfen zeigen oftmals erst 3-5 Jahre nach dem Befall Symptome. Im typischen Fall sind verkürzte Internodien an den Haupt- und Seitentrieben und reduzierter Wuchs Warnsignale für HSVd-Befall. Die unteren Blätter sind meist eingerollt, kleiner und zeigen Vergilbungen. Die Symptome variieren allerdings sehr stark von Sorte zu Sorte, auch in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen. Diese Symptome sind auch für eine Infektion mit dem Citrus Bark Cracking Viroid typisch und sind deutlich verstärkt, wenn beide Viroide kombiniert vorkommen.

Bilder von Pflanzen mit typischen CBCVd-Symptomen finden Sie ebenfalls im LfL-Felhygienekonzept zum CBCVd

<https://www.lfl.bayern.de/ipz/hopfen/293834/index.php>



### Bekämpfung

Eine Bekämpfung der Viroide mit Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln ist nicht möglich. Selbst Hitze kann die infektiöse Erbsubstanz der Viroide nicht unschädlich machen. Damit sind symptomlose, mit CBCVd bzw. HSVd infizierte Hopfen wegen ihres hoch infektiösen Safts die größte Gefahrenquelle für eine ungehinderte Verbreitung der Viroide vom primären Befallsherd, über verseuchte Maschinen und Geräte über den gesamten Bestand hinweg und auch in andere Bestände. Phytosanitäre Maßnahmen wie die Abtötung der mit Viroid befallenen Pflanze einschließlich Wurzelstock durch mehrmalige Quickdown oder MCPA-Behandlungen und nachfolgender Verbrennung der verseuchten Pflanzenteile sind derzeit die einzige Möglichkeit, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Solange nicht sichergestellt ist, dass alle viroidinfizierten Pflanzenteile (lebende und tote Pflanzenreste) entfernt wurden, darf keine Neuanpflanzung erfolgen. Nachuntersuchungen sind auf jeden Fall erforderlich.

Da es bislang keine zuverlässig heilenden Methoden für viroidinfizierte Hopfen gibt, ist ein kontinuierliches, möglichst umfassendes Monitoring die beste Vorsorge.

### 6.4 Hopfenputzen und Unkrautbekämpfung

Als Alternative zum mechanischen **Hopfenputzen** wie z. B. dem Entlauben von Hand und mit Entlaubungsgeräten können Nährstofflösungen und/oder die Pflanzenschutzmittel Beloukha, Quickdown und Vorox F zum chemischen Hopfenputzen eingesetzt werden. Die Nährstofflösungen

Seit 2008 werden an der LfL Pflanzen aus den Zuchtgärten, dem Vermehrungsbetrieb Eickelmann und aus Praxisgärten der Hallertau, aus Tettang und dem Elbe-Saale-Gebiet mit RT-qPCR auf CBCVd und HSVd getestet. Dringend empfohlen wird vor allem Pflanzern, die ausländische Sorten anbauen, den jeweiligen Bestand stichprobenartig testen zu lassen, selbst wenn keine Symptome zu beobachten sind. Bei einer begrenzten Zahl wird die Untersuchung auf HSVd und CBCVd ohne Kosten für den Pflanzern durchgeführt. Anmeldung von Blattproben für das Monitoring an [Virologie@LfL.Bayern.de](mailto:Virologie@LfL.Bayern.de) oder per Telefon: 08161/8640 5695. Bislang wurden in allen Hopfenproben aus Praxisbeständen noch keine HSVd-Infektionen nachgewiesen.

### Vorsichtsmaßnahmen

Verzichten Sie auf den Anbau von Pflanzgut, das nicht auf Viroide getestet wurde. Dies gilt insbesondere für Pflanzgut aus dem Ausland (v. a. aus USA, Japan, Slowenien). Verwenden Sie keinen Kompost mit Zitrusresten zur Düngung Ihrer Hopfengärten. Waschen und wenn möglich desinfizieren Sie Leihmaschinen vor dem Einsatz auf eigenen Flächen.

### Qualitätspflanzgut

Beim Vermehrungsbetrieb Eickelmann wurden alle zur Vermehrung verwendeten Mutterpflanzen als HSVd-frei getestet. 2014 wurde zudem damit begonnen, die Zitrusviroid-Freiheit des Pflanzmaterials zu bestätigen. Aus dieser Quelle steht verticillium-, virus- und viroidfreies Qualitätspflanzgut zur Verfügung.

und stickstoffhaltigen Mischungen zum Hopfenputzen sind im vorderen Kapitel „Anbau“ ab S. 21 beschrieben.

Von den chemischen PSM eignen sich Beloukha, Quickdown und Vorox F zum 2. Hopfenputzen. Beloukha und Vorox F können zudem auch nach dem ersten

Ackern zum ersten Hopfenputzen eingesetzt werden. Eine Anwendung von Vorox F nach dem zweiten Ackern hat als Zusatznutzen eine Unkrautbekämpfung auf dem Bifang mit Wirkung bis in den Herbst. Um Schäden am Hopfen zu vermeiden sind in allen Fällen die Anwendungsempfehlungen der Hersteller genau zu beachten!

**Beloukha** kann zum 1. und 2. Hopfenputzen mit 5,3 l/ha bei Reihenbehandlung und einer Menge an Behandlungsflüssigkeit von 400-500 l/ha eingesetzt werden. Gemäß Firmenempfehlung sollten davon 30 % AHL, 50 % InnoFert Hopfen, oder 50 % MgCl<sub>2</sub>-Lösung sein, damit der gewünschte Entlaubungseffekt erzielt wird. Weitere Zusätze sind 0,1 % Adhäsit **und** 0,05 % Break Thru S 301 sowie ein Schaumstopp (z. B. proagro Schaumfrei). Folgende Mischreihenfolge ist einzuhalten: 1. halbe Wassermenge, 2. volle Menge Nährstofflösung, 3. Schaumstopp, 4. Beloukha, 5. Additive 6. ggf. Zink und Bor 7. restliche Wassermenge.

Die Anwendung muss nicht zwingend nach Regenereignissen erfolgen, d. h. die Wachsschicht ist nicht so relevant. Wichtiger sind gemäßigte Temperaturen und eine hohe Luftfeuchte (>60 %) bei der Anwendung und nachfolgende Tage ohne Niederschlag mit warmen-heißen Temperaturen.

Bei **Quickdown** muss der Hopfen volle Gerüsthöhe erreicht haben, da ein zu früher Einsatz zu stärkeren Rebenverätzungen mit Ertragsdepressionen führen kann.

**Vorox F** bringt nur in Kombination mit AHL und einem Haftmittel den gewünschten Entlaubungseffekt. Die für die Mischungen notwendigen Mengen an Vorox F sind deutlich geringer als die zugelassene Höchstmenge. Da andererseits durch zu aggressive Mischungen das Risiko dem Hopfen zu schädigen steigt, sind die Herstellervorgaben bei diesem Produkt genau einzuhalten.

Das **erste Hopfenputzen** mit Vorox F darf erst nach dem ersten Ackern erfolgen. Der

Hopfenbestand muss im dritten Standjahr oder älter sein und eine Wuchshöhe vom mindestens 3 m erreicht haben. Er muss vital sein. Die Anwendung darf nicht mit handgeführten Geräten durchgeführt werden.

Für Bestände ab 3 m, die die Gerüsthöhe noch nicht erreicht haben, gilt die Empfehlung (Angaben für die Reihenbehandlung = 1/3 der Fläche):

- 20 g/ha Vorox F
- in 400 – 500 l Spritzbrühe  
davon 120 – 150 l AHL (30 %)
- + 0,4 – 0,5 l/ha Adhäsit (0,1 %)

Für Bestände, die zum ersten Hopfenputzen bereits Gerüsthöhe erreicht haben, gilt die Empfehlung:

- 30 g/ha Vorox F
- in 400 – 500 l Spritzbrühe  
davon 120 – 150 l AHL (30 %)
- + 0,4 – 0,5 l/ha Adhäsit (0,1 %) oder Karibu (0,04 %)

Beim **zweiten Hopfenputzen** mit Vorox F nach dem letzten Ackern muss der Hopfenbestand im zweiten Standjahr oder älter sein. Er muss vital sein und darf keine Welkeprobleme zeigen. Ist ein Arbeitsgang erstes Hopfenputzen voraus gegangen, kann zugleich eine Unkrautbekämpfung auf dem Bifang erfolgen. Das Unkraut auf dem Damm sollte dafür noch nicht aufgelaufen oder höchstens im Keimblattstadium sein. Eine feinkrümelige Bodenstruktur und ein feuchter Damm verbessert die Zusatzwirkung Unkrautbekämpfung und Dammversiegelung.

Es gilt die Empfehlung (Angaben für die Reihenbehandlung = 1/3 der Fläche):

- 120 – 150 g/ha Vorox F
- in 400 – 500 l Spritzbrühe  
davon 120 – 150 l AHL (30 %)
- + 0,16 - 0,2 l/ha Break Thru S 301  
oder  
Karibu (0,04 %)

Zur **Ungras- und zur Queckenbekämpfung** ist die Anwendung von Fusilade Max genehmigt.

Zur **Unkrautbekämpfung** ist die Anwendung von U 46 M-Fluid genehmigt.  
Exportnormen beachten!

**Beachte:**

- Es gibt keine Indikation für Herbizidanwendungen im Herbst.
- Beim Hopfenputzen und bei der Unkraut- und Ungrasbekämpfung wird nicht der ganze Hopfengarten

abgespritzt, sondern nur eine Teilfläche im Bereich des Bifangs. Da sich die zugelassenen Wirkstoff- und Wassermengen auf die ganze Hopfenfläche beziehen, tatsächlich aber nur etwa ein Drittel der Fläche behandelt wird, sind die tatsächlichen Aufwandmengen pro ha Hopfengarten auf die behandelte Fläche anzupassen, also auf ein Drittel zu reduzieren.

Tab.: Pflanzenschutzmittel zum ersten Hopfenputzen nach dem ersten Ackern

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]		Abstandsauflagen		Bienengefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
		bezogen auf Gesamtfläche (lt. Zulassung)	bezogen auf Reihen-/ Bifangbehandlung (1/3 der Gesamtfläche)	(weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanleitung)				
Beloukha (Art. 51) ( <i>Pelargonsäure</i> )	Z		5,3 l/ha in 300 – 500 l Brühe/ha, davon 30 % AHL oder 50 % InnoFert Hopfen oder 50 % MgCl <sub>2</sub> Lösung 0,1 % Adhäsit und 0,05 % Break Thru S 301 Schaumstop	Gewässer <sup>1)</sup>  Nichtzielflächen verlustm. (90%)	20 m 0 m	B4	F <sup>2)</sup>	Um <b>Schaumbildung</b> zu vermeiden: Spritzwasser nicht unter 10°C <b>Mischreihenfolge beachten:</b> 1. Halbe Wassermenge 2. Nährstofflösung 3. Schaumstop 4. Beloukha 5. Additiv(e) 6. ggf. Zink und Bor 7. Restliche Wassermenge  Rel. Luftfeuchtigkeit > 60 % und folgende Tage ohne Nieder- schlag begünstigen die Wirkung
Quickdown (G) ( <i>Pyraflufen</i> )	E	max. 0,32 l/ha in 800 – 1000 l Wasser/ha	0,1 l/ha in 250 – 350 l Wasser/ha	Gewässer verlustm. (90 %) <sup>1)</sup>  Nichtzielflächen verlustm. (90 %)	5 m 20 m 0 m	B4	F <sup>2)</sup>	Einsatz erst ab <b>voller Gerüsthöhe</b>
Vorox F (Art. 51) ( <i>Flumioxacin</i> )	E		ab 3 m Wuchshöhe: 20 g/ha in 400 – 500 l Brühe/ha, davon 120-150 l AHL (30 %) +0,4-0,5 l/ha Adhäsit (0,1 %) ab Gerüsthöhe 30 g/ha+ AHL+Adhäsit	Gewässer verlustm. (90 %) <sup>1)</sup> 10 m bewachsener Rand- streifen ab 2% Neigung  Nichtzielflächen verlustm. (90%)	5 m 20 m 0 m	B4	F <sup>2)</sup>	Bestände ab dem 3. Standjahr Wuchshöhe mindest. 3m vitaler Bestand keine Anwendung ohne Zusatzstoff  keine Anwendung handgeführter Geräte

ERSTES Hopfenputzen - nach dem ersten Ackern

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

<sup>2)</sup> F = Wartezeit ist durch die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Ernte liegt

G/Art. 51 = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (= Risiko liegt beim Anwender)

Tab.: Pflanzenschutzmittel zum zweiten Hopfenputzen nach dem zweiten Ackern

Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoff- gruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]		Abstandsauflagen		Bienen- gefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
		bezogen auf Gesamtfläche (lt. Zulassung)	bezogen auf Reihen-/ Bifangbehandlung ( $\frac{1}{3}$ der Gesamtfläche)	(weitere Bestimmungen in der Gebrauchsanleitung)				
Beloukha (Art. 51) (Pelargonsäure)	Z		5,3 l/ha in 400 – 500 l Brühe/ha, davon 30 % AHL oder 50 % InnoFert Hopfen oder 50 % MgCl <sub>2</sub> Lösung 0,1 % Adhäsit und 0,04 % Break Thru S 301 Schaumstop	Gewässer <sup>1)</sup>  Nichtzielflächen verlustm. (90%)	20 m 0 m	B4	F <sup>2)</sup>	Um <b>Schaumbildung</b> zu vermeiden: Spritzwasser nicht unter 10°C <b>Mischreihenfolge beachten:</b> 1. Halbe Wassermenge 2. Nährstofflösung 3. Schaumstop 4. Beloukha 5. Additiv(e) 6. ggf. Zink und Bor  7. Restliche Wassermenge Rel. Luftfeuchtigkeit > 60 % und folgende Tage ohne Nieder- schlag begünstigen die Wirkung
Quickdown (G) (Pyraflufen)	E	max. 0,32 l/ha in 1100 – 1300 l Wasser/ha	0,1 l/ha in 350 – 430 l Wasser/ha	Gewässer verlustm. (90%) <sup>1)</sup> Nichtzielflächen verlustm. (90%)	5 m 20 m 0 m	B4	F <sup>2)</sup>	Einsatz erst ab <b>voller Gerüsthöhe</b>
Vorox F (Art. 51) (Flumioxacin)	E		120 – 150 g/ha in 400 – 500 l Brühe/ha, davon 120 – 150 l AHL (30 %) + 0,16 – 0,2 l/ha Break Thru S 301 (0,04 %) oder Karibu	Gewässer verlustm. (90%) <sup>1)</sup> 10 m bewachsener Rand- streifen ab 2% Neigung Nichtzielflächen verlustm. (90%)	5 m 20 m 0 m	B4	F <sup>2)</sup>	Bestände ab dem 2. Standjahr vitaler Bestand keine Anwendung ohne Zusatzstoff Einsatz vor der Blüte bis BBCH 55

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

<sup>2)</sup> F = Wartezeit ist durch die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Ernte liegt

G/Art. 51 = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (= Risiko liegt beim Anwender)

Tab.: Pflanzenschutzmittel zur Ungras- und Unkrautbekämpfung

Indikation	Produkt (Wirkstoff)	Wirkstoffgruppe	Aufwandmenge [kg o. l/ha]		Abstandsauflagen	Bienengefahr	Wartezeit in Tagen	Bemerkung
			bezogen auf Gesamtfläche (lt. Zulassung)	bezogen auf Reihen-/Bifang- behandlung (1/3 der Gesamtfläche)	(weitere Bestimmungen in der Gebrauchs- anleitung)			
Quecke	Fusilade Max (G) (Fluazifop-P)	A	max. 2 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha max. 1 Anw. /Jahr	0,67 l/ha in 70 – 150 l Wasser/ha	Gewässer <sup>1)</sup> Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90 %) 0 m	B4	28	
Ungräser	Fusilade Max (G) (Fluazifop-P)	A	max. 1 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha max. 1 Anw. /Jahr	0,33 l/ha in 70 – 150 l Wasser/ha	Gewässer <sup>1)</sup> Nichtzielflächen 20 m verlustm. (90 %) 0 m	B4	28	z. B. Einjährige Ungräser und Getreidearten <b>außer Jährige Rispe</b>
Unkräuter	U 46 M-Fluid (G) (MCPA- Präparate)	O	1,0 l/ha in 400 – 600 l Wasser/ha max. 1 Anw. /Jahr	0,33 l/ha in 150 – 200 l Wasser/ha	Gewässer <sup>1)</sup> Nichtzielflächen 25 m verlustm. (90 %) 5 m	B4	35	ab voller Gerüsthöhe, nicht bei hohen Temperaturen

<sup>1)</sup> Einhaltung des landesspezifischen Mindest-Gewässerabstandes (in Bayern 5 m bis zur Uferlinie bzw. Böschungsoberkante)

G = Ausweitung auf geringfügige Verwendung (= Risiko liegt beim Anwender)



## 6.5 Applikationstechnik

### 6.5.1 Spritztechnik zum Abspritzen (Bodenschädlinge, Hopfenputzen, Unkrautbekämpfung)

Reihenbehandlungen erfolgen i. d. R. mit Abspritzgeräten und Unterstockspritzgestängen. Je nach Indikation und Belaubung variieren dabei die Zahl der Düsen, die Wasseraufwandmenge und die

Fahrgeschwindigkeit. Mit folgender Formel kann unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landwirts der Ausstoß und somit die Düsengröße für die geplante Behandlung ermittelt werden.

Allgemeine Formel:

$$\text{Einzeldüsenausstoß (l/min)} = \frac{\text{Wasseraufwand (l/ha)}^* \times \text{Fahrgeschwindigkeit (km/h)} \times \text{Arbeitsbreite (m)}}{600 \times \text{Gesamtdüsenanzahl}}$$

Beispiele für bestehende Indikationen im Hopfen:

- **Hopfenputzen/Bodenschädlinge**

$$\text{Einzeldüsenausstoß (l/min)} = \frac{500 \text{ (l/ha)}^* \times 6 \text{ (km/h)} \times 3,2 \text{ (m)}}{600 \times 4 \text{ (Gesamtdüsenanzahl)}} = 4,0 \text{ l/min}$$

- **Unkraut- u. Gräserbekämpfung**

$$\text{Einzeldüsenausstoß (l/min)} = \frac{150 \text{ (l/ha)}^* \times 6 \text{ (km/h)} \times 3,2 \text{ (m)}}{600 \times 4 \text{ (Gesamtdüsenanzahl)}} = 1,2 \text{ l/min}$$

Je nach Indikation, Wasseraufwandmenge und Fahrgeschwindigkeit errechnet sich ein unterschiedlicher Einzeldüsenausstoß. Mit den berechneten Werten können nun in der Düsentabelle die

passenden Düsen ausgewählt werden. Es ist aber darauf zu achten, dass der optimale Druckarbeitsbereich des Düsentyps nicht über- oder unterschritten wird.

Tab.: Durchflusstabelle für Düsengrößen und Farbkennzeichnung nach ISO 10625

Druck bar	Durchfluss l/min bei Düsengröße									
	-01 orange	-015 grün	-02 gelb	-025 lila	-03 blau	-04 rot	-05 braun	-06 grau	-08 weiß	-10 schwarz
3,0	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20	4,00
3,5	0,43	0,65	0,86	1,08	1,30	1,73	2,16	2,59	3,46	4,32
4,0	0,46	0,69	0,92	1,15	1,39	1,85	2,31	2,77	3,70	4,62
5,0	0,52	0,77	1,03	1,29	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13	5,16
6,0	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	2,26	2,83	3,39	4,53	5,66
7,0	0,61	0,92	1,22	1,53	1,83	2,44	3,06	3,67	4,89	6,11
8,0	0,65	0,98	1,31	1,63	1,96	2,61	3,27	3,92	5,23	6,53
9,0	0,69	1,04	1,39	1,73	2,08	2,77	3,46	4,16	5,54	6,93
10,0	0,73	1,10	1,46	1,83	2,19	2,92	3,65	4,38	5,84	7,30

Werte gelten für Wasser bei 20 °C, Druck unmittelbar an der Düse gemessen. Für Düngerlösungen ergeben sich aufgrund des höheren spezifischen Gewichts (Dichte) geringere Ausstoßmengen.

=> Vor Anwendungsbeginn Spritze auslitern!

\*) Die Ausbringmenge bezieht sich auf 1 ha Hopfengarten.

Tab.: Düsen mit anerkannter Verlustminderung von 90 %

Hersteller	Bezeichnung der Düse	Beschreibung der Eintragung	Verwendungsbestimmungen	
Lechler	IS 80-03 POM	1)	Düsen in Streifenspritzgeräte mit Druck bis 8,0 bar	*
Lechler	IDKS 80-025 POM	2)	Düsen in Streifenspritzgeräte mit Druck bis 3,0 bar	*
Lechler	IDKS 80-03 POM	2)	Düsen in Streifenspritzgeräte mit Druck bis 3,0 bar	*
Lechler	IDKS 80-04 POM	2)	Düsen in Streifenspritzgeräte mit Druck bis 3,0 bar	*
Lechler	IDKS 80-05 POM	2)	Düsen in Streifenspritzgeräte mit Druck bis 3,0 bar	*
Lechler	IDKS 80-06 POM	2)	Düsen in Streifenspritzgeräte mit Druck bis 6,0 bar	*
Agrotop	AirMix OC 025		Streifenspritzung mit einem Druck bis 3,0 bar	*
Agrotop	AirMix OC 03		Streifenspritzung mit einem Druck bis 3,0 bar	*
Agrotop	AirMix OC 04		Streifenspritzung mit einem Druck bis 3,0 bar	*
Agrotop	AirMix OC 05		Streifenspritzung (auch Hopfenputzen) bis 5,0 bar	*
Agrotop	Albuz TVI 80-03	3)	Streifenspritzung mit einem Druck bis 8,0 bar	
Agrotop	TD 80-08		Unterstockspritzgeräte mit Düse Agrotop TD 80-08	
Agrotop	AVI OC 80-04		Druckbereich 2,0 – 7,0 bar	

- 1) Spritzhöhe 20 cm – Streifenbreite 60 cm, Spritzhöhe 30 cm – Streifenbreite 70 cm, Spritzhöhe 40 cm – Streifenbreite 80 – 100 cm, Spritzhöhe 50 cm – Streifenbreite 90 – 120 cm
- 2) Düseneinbauwinkel (Offset) 0°: Abstand zur Zielfläche 20 cm: Streifenbreite 30 cm, Abstand 30 cm: Streifenbreite 40 cm, Abstand 40 cm: Streifenbreite 50 – 60 cm, Abstand 50 cm: Streifenbreite 60 – 70 cm  
Düseneinbauwinkel (Offset) 20°: Abstand zur Zielfläche 20 cm: Streifenbreite 30 - 50 cm, Abstand 30 cm: Streifenbreite 60 – 80 cm, Abstand 40 cm: Streifenbreite 70 – 100 cm, Abstand 50 cm: Streifenbreite 90 – 130 cm.
- 3) Streifenspritzung mit Spritzhöhen zwischen 30 cm und 50 cm
  - Bei Verwendung dieser verlustmindernden Düsen sind geringere Abstandsauflagen zu Gewässern und Nicht-Zielflächen möglich.
  - TurboDrop-Düsen spritzen großtropfiger. Die Abtrift wird dadurch deutlich reduziert (z. B. geringere Beeinträchtigung der Untersaat!).
  - Mit einem \* gekennzeichneten Düsen sind Injektor-Exzenter-Flachstrahldüsen sog. randscharfe TurboDrop-Düsen. Damit sind exakte Abschlusskanten bei den Behandlungsflächen möglich.
  - Zum Abspritzen der Bodentriebe auf dem Bifang sollten Düsen mit breiteren Ausstoßwinkel verwendet oder mehrer Düsen übereinander angeordnet werden. Muß zum späterern Einsatz-Zeitpunkt die Untersaat geschont werden, empfiehlt sich der Einsatz von Düsen mit einem engeren Ausstoßwinkel oder Injektor-Exzenter-Flachstrahldüsen.
  - Eine gleichmäßigere Benetzung wird erreicht, wenn je Spritzseite zwei bis

vier Düsen rechtwinklig angebracht werden, wobei die Düsen in die Fahrtrichtung sowie entgegen der Fahrtrichtung eingestellt werden.

- Der Zusatz zugelassener Haft-, Spreit- und Penetrationshilfsmitteln kann die Benetzung und den Wirkungsgrad erhöhen.
- Düseneinsätze sind regelmäßig auf Verschleiß zu kontrollieren!

Tab.: Ausbringungsmengen (bei Reihenbehandlung mit 2 Düsen je Seite; AB 3,20 m)

Type	Druck	Ausbringungsmenge in l/ha bei km/h			
Farbe	bar	5	6	7	8
-025 lila	3	150	125	107	94
	4	173	144	123	108
	5	194	161	138	121
	6	212	176	151	132
-03 blau	3	180	150	129	113
	4	209	174	149	130
	5	233	194	166	145
	6	255	213	182	159
-04 rot	3	240	200	171	150
	4	278	231	198	173
	5	311	259	222	194
	6	339	283	242	212
-05 braun	3	300	250	214	188
	4	347	289	248	217
	5	387	323	276	242
	6	425	354	303	265
-08 weiß	3	480	400	343	300
	4	554	461	395	346
	5	620	516	443	387
	6	680	566	485	425

### 6.5.2 Spritztechnik zum Sprühen

Ziel der Applikationstechnik in Raumkulturen ist es, das Pflanzenschutzmittel möglichst ohne Verluste gleichmäßig verteilt an alle Pflanzenteile anzulagern. Benetzungsversuche bestätigen immer wieder, dass gerade die Gipfelregionen und die Reihen zwischen den Spritzgassen schlechter benetzt werden.

**Einflussfaktoren** auf die Benetzung sind:

- Arbeitsbreite
- Wassermenge
- Fahrgeschwindigkeit
- Luftmenge (Gebläsestufe)
- Zusatz von Additiven
- Druck
- Düsen

Auf einzelne Einflussfaktoren soll im weiteren Verlauf näher eingegangen werden.

### Arbeitsbreite

Belagsmessungen haben gezeigt, dass die Benetzung der Reben zwischen den Fahrgassen deutlich schlechter ist als in der Fahrgasse. In Versuchen wurde ebenfalls eine Verschlechterung des Spritzbelages mit Erhöhung der Arbeitsbreite von 6,40 m auf 9,60 m festgestellt. Die Frage der größeren Arbeitsbreite spielt v. a. bei den frühen Behandlungen bis Erreichen der Gerüsthöhe eine Rolle. Bei einer Arbeitsbreite von 6,40 m wird bei optimalen Drücken über 20 bar und moderaten Fahrgeschwindigkeiten eine zu hohe Wassermenge ausgebracht. Infolgedessen wird oftmals der Druck reduziert, was zu einer Verschlechterung der Wirkstoffanlagerung am Hopfen zwischen den Fahrgassen führt. Versuche haben hier gezeigt, dass eine Vergrößerung der Arbeitsbreite auf 9,60 m und einer damit verbundenen Erhöhung des Drucks gleichmäßigere Applikationsergebnisse liefern kann.

Dennoch wird für spätere Anwendungen ab Erreichen der Gerüsthöhe eine Reduzierung der Arbeitsbreite auf 6,40 m empfohlen, d. h. jede 2. Gasse fahren.

**Wassermenge**

Die Wasseraufwandmenge variiert je nach Wachstumsstand, Sorte und zu

behandelnden Schaderreger. Blattflächenmessungen haben gezeigt, dass hochertrageiche Sorten wie z. B. Herkules eine deutlich höhere Blattoberfläche aufweisen als die meisten anderen Sorten. Anhaltspunkte für die notwendige Menge an Spritzflüssigkeit sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tab.: Empfohlener Wasser- und Mittelaufwand bei Hopfen in Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium

Entwicklungsstadium (ES) (nach BBCH-Code)	20 % der Gerüsthöhe erreicht bis 70 % der Gerüsthöhe erreicht  (ES 32 bis ES 37)	70 % der Gerüsthöhe erreicht bis In- floreszenzknospen vergrößert  (ES 37 bis ES 55)	Infloreszenzknospen vergrößert bis 50 % der Dolden ge- schlossen  (ES 55 bis ES 85)
<b>Gebläsespritze</b>			
Peronospora	700 – 1300 l	1300 – 1900 l	1900 – 2800 l
Blattl., Mehltau, Gem. Spinnm.	800 – 1500 l	1500 – 2200 l	2200 – 3300 l
<b>Mittelaufwand</b>	24 bis 45 %	45 bis 67 %	bis 100 %

Tab.: Umrechnungsmatrix zum Ansetzen einer Spritzflüssigkeit

Konzentration des Mittels in %	Mittelmenge in g bzw. ml für 100 l	Erforderliche Mittelmenge in kg bzw. l je Spritze bei einem Fassinhalt von Liter ....						
		600	800	1000	1500	2000	3000	4000
0,045	45	0,27	0,36	0,45	0,675	0,9	1,35	1,8
0,05	50	0,3	0,4	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0
0,10	100	0,6	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
0,15	150	0,9	1,2	1,5	2,25	3,0	4,5	6,0
0,20	200	1,2	1,6	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0
0,25	250	1,5	2,0	2,5	3,75	5,0	7,5	10,0
0,30	300	1,8	2,4	3,0	4,5	6,0	9,0	12,0
0,375	375	2,25	3,0	3,75	5,62	7,5	11,25	15,0
0,50	500	3,0	4,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0
0,75	750	4,5	6,0	7,5	11,25	15,0	22,5	30,0
1,0	1000	6,0	8,0	10,0	15,0	20,0	30,0	40,0
2,0	2000	12,0	16,0	20,0	30,0	40,0	60,0	80,0

**Wichtige Hinweise:**

- Bringen Sie die volle Mittelmenge aus!  
Keine Unterdosierung!
- Wassermenge (l/ha) x Konzentration (%) = Mittelmenge in kg oder l je ha.
- Wird z. B. die Wassermenge verringert, muss die Konzentration erhöht

werden, damit die volle Mittelmenge ausgebracht wird.

- Beachten Sie die Angaben zu Konzentration und Mittelmenge pro ha in den Tabellen der Bekämpfungsmittel!
- Nur mit hoher Wassermenge wird eine ausreichende Benetzung erreicht (besonders wichtig bei Kontaktmitteln).

## Fahrgeschwindigkeit

Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit verschlechtert sich der Spritzbelag, v. a.

- im oberen Pflanzenbereich
- in den von der Fahrgasse entfernteren Reihen

Bis zum Erreichen der Gerüsthöhe sollten deshalb Fahrgeschwindigkeiten von 2,0 - 3,0 km/h eingehalten werden. Ab Erreichen der Gerüsthöhe liegen die **optimalen Fahrgeschwindigkeiten** bei einer Arbeitsbreite von 6,40 m bei **1,6 - 2,2 km/h**.

## Luftmenge (Gebläsestufe)

Bei Spritzungen vor Erreichen der Gerüsthöhe soll mit verringerter Gebläsedrehzahl gearbeitet werden (erste Stufe). Ab Blühbeginn müssen alle Spritzungen mit voller Zapfwellendrehzahl gefahren werden, damit die volle Gebläseleistung erreicht wird. Änderungen der Fahrgeschwindigkeit sind dann nur noch durch Umschaltung auf einen anderen Gang möglich. Schlepper mit einem stufenlosen Getriebe sind dabei im Vorteil.

## Zusatz von Additiven

Zusatzstoffe oder Additive lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen. Man unterscheidet:

- Öle  
verringern die Abdrift, greifen die Kutikula an und beschleunigen die Durchdringung des Herbizides durch die Wachsschicht
- Netzmittel  
werden zur Verbesserung der Benetzung bei Herbiziden und Kontaktmittel eingesetzt
- Detergentien oder „Super“-Benetzer  
steigern die Benetzung um ein Vielfaches durch extreme Herabsetzung der Oberflächenspannung
- Penetrationshilfsmittel  
verbessern die Wirkstoffaufnahme und -verteilung in der Pflanze bei systemisch wirkenden Pflanzenschutzmitteln

- Haftmittel  
reduzieren das Ablaufen der Spritzbrühe von den Blättern und erhöhen die Regenbeständigkeit; meist zu Kontaktwirkstoffen beigegeben.

Additive können die Wirkungsleistung von Pflanzenschutzmitteln unter schwierigen Einsatzbedingungen absichern und die Effektivität des Pflanzenschutzmitteleinsatzes erhöhen. Zur Wirkstoffreduktion sollten sie im Hopfen nicht eingesetzt werden, da die Potenz der zugelassenen Präparate oftmals begrenzt ist und von ihnen selbst keine Wirkung ausgeht.

Die Auswahl des Zusatzstoffes richtet sich nach der Wirkungsweise des Pflanzenschutzmittels und dem Anwendungsziel.

Im Hopfen und entsprechend den Indikationen dürfen nur genehmigte Zusatzstoffe gemäß § 42 Pflanzenschutzgesetz eingesetzt werden. Eine monatlich aktualisierte Liste ist unter dem folgenden Link zu finden:

[https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04\\_Pflanzenschutzmittel/Zusatzstoffe\\_liste.html](https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/Zusatzstoffe_liste.html)

## Druck

Der Spritzdruck spielt eine entscheidende Rolle bei der Benetzung der Hopfenpflanzen, v. a. in den Problembereichen (Gipfelregion, Reben zwischen den Fahrgassen). Dazu kommt, dass TurboDrop-Düsen einen höheren Spritzdruck erfordern, um die größeren Tröpfchen mit Unterstützung des Gebläses in die Problemzonen zu transportieren. Zu beachten ist dabei, dass der am Manometer abgelesene Spritzdruck von dem an der Düse abweichenden kann (3-5 bar Unterschied möglich).


### Empfehlung:

**20-25 bar Spritzdruck, gemessen an den TD-Düsen, nicht unterschreiten!**

## Düsen

### Abdriftminderung durch Turbo-Drop-Düsen

TurboDrop-Düsen sind Stand der Technik; denn durch die Verwendung von Turbo-Drop-Düsen, die Abdeckung der äußeren Gebläseaustrittsöffnung und zwei einseitigen Spritzfahrten kann die Abdrift von Pflanzenschutzmitteln im Hopfen um ca. 90 % verringert werden.



- (A) TD Uni Clip-Injektor
- (B) Bajonettkappe mit Schlüsselweite 8mm
- (C) Gewindeüberwurfmutter mit Öffnung 12,5 mm vom jeweiligen Spritzgerät
- (D) Vormontierter TD Uni Clip-Bajonettträger

Abb.: TurboDrop Düse TD Uni Clip 80° / 60° / 40° / 20° von agrotop

Zur Reinigung der TD Uni Clip ist je nach Bajonettssystem ein eventuell angepasster 16 mm Gabelschlüssel notwendig. ACHTUNG! Eine Demontage ohne 16 mm Gabelschlüssel kann zu Schäden am TD Uni Clip – Injektor führen. Unter [www.agrotop.com](http://www.agrotop.com) ist eine ausführliche Montage und Demontageanleitung zu finden.

#### Vorteile von TD-Düsen:

- **weniger Abdrift bei gleicher Wirkung**
- **geringerer Abstand zu Gewässern und Nicht-Zielflächen**

**Abdriftmindernde Geräte** werden vom Institut für Anwendungstechnik im Pflanzenschutz des JKI geprüft und nach erfolgreicher Anerkennung in das Verzeichnis „Verlustmindernder Geräte“ eingetragen. In dem Verzeichnis finden sich für den

Hopfenbau verschiedene Sprühgeräte. Ebenso geprüft und eingetragen wurden für alle Sprühgeräte Flachstrahldüsen-sätze mit TurboDrop-Düsen der Firma Agrotop für die „Hallertau“ und für „Tettngang“ mit folgender Düsenbestückung:

Tab. Abdriftmindernde Düsenbestückung bei Sprühgeräten

Düsenbestückung (von oben nach unten)	Düsenatz Agrotop „Hallertau“	Düsenatz Agrotop „Tettngang“
8	TD 40-04	TD 60-05
7	TD 40-05	TD 60-06
6	TD 40-05	TD 60-06
5	TD 40-04	TD 60-04
4	TD 40-03	TD 60-03
3	TD 40-03	TD 60-025
2	TD 60-025	TD 60-015
1	TD 60-015	TD 60-015

Alle abdriftmindernden Sprühgeräte verwenden ein Axialgebläse. Sprühgeräte mit anderer Luftführung sind nicht geprüft und deshalb nicht abdriftmindernd.

Je nach Pflanzenschutzmittel ist die Verwendung abdriftmindernder Technik in Gewässernähe vorgeschrieben oder dürfen die Abstände zu Gewässern oder angrenzenden Nicht-Zielflächen verringert werden.

Bedenken Sie auch, dass Abdrift in Nachbarkulturen Schäden verursachen kann oder Probleme mit Anwohner vorprogrammiert sind.

#### Weitere Punkte, die zur Reduzierung der Abdrift beitragen:

- Rechtzeitiges Ausschalten des Sprühgerätes vor dem Wenden bereits vor der letzten Rebe. Diese Randreben können durch eine Fahrt am Vorgehende quer zu den Reihen mit einer einseitigen Spritzung in Richtung Hopfengarten behandelt werden.
- Spritzungen nur bei Windstille bzw. nicht bei Windgeschwindigkeiten über 3 m/sec. und möglichst nicht bei Lufttemperaturen über 25 °C (im Bestand) ausbringen.

- Ein regelmäßig geprüftes und perfekt eingestelltes Pflanzenschutzgerät ist

Voraussetzung für eine optimale Benetzung bei geringstmöglicher Abdrift.




Abb.: Verbesserte Randbehandlung mit TurboDrop-Injektordüsen, zwei einseitigen Spritzfahrten und Abdeckung der äußeren Gebläseaustrittsöffnung

### Düsenbestückung

Damit die erforderliche Spritzflüssigkeitsmenge gleichmäßig über die gesamte Höhe des Hopfens verteilt wird, ist die richtige Düsenbestückung Voraussetzung. Im Laufe der Spritzsaison nimmt der Hopfen in Höhe und Blattmasse kräftig zu. Dementsprechend verändert sich auch die Düsenbestückung. Bei voller Belaubung sollte die obere Hälfte der Düsen des Düsenkranzes einen zwei- bis dreimal so großen Ausstoß haben als die untere Hälfte. Wenn z. B. bei einer Gebläsespritze mit insgesamt 12 Düsen die unteren 6 Düsen des Düsenkranzes einen Ausstoß von 15 l/min haben, dann sollten die oberen 6 Düsen einen Ausstoß von 30 - 45 l/min haben.

Im oberen Teil des Düsenkranzes müssen also größere Düsen sein als unten. Außerdem müssen die oberen Düsen einen spitzeren Strahlwinkel haben als die unteren, denn nur der spitze Strahlwinkel erzeugt größere Tropfen, die für die größere

Entfernung erforderlich sind. Nur unter diesen Voraussetzungen kann auch der obere Bereich des Hopfens genügend Spritzflüssigkeit erhalten.

### Kriterien für die Düsenbestückung

- Entwicklungsstadium und Wasseraufwandmenge
- Gerüsthöhe
- Arbeitsbreite
- Schaderreger

Bei zielgerechter Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen im Hopfenbau sind folglich die Faktoren Wasseraufwand, Arbeitsbreite und Fahrgeschwindigkeit weitgehend vorgegeben. Ein angestrebter Gesamtdüsenausstoß muss deshalb im Wesentlichen über die **Auswahl der Düsenbestückung** und in Grenzen über die **Variation des Betriebsdrucks** erreicht werden.

Tab. Beispiele für empfohlene Düsenbestückungen in der Hallertau bei 6,40 m Arbeitsbreite

<b>Kleine Düsenbestückung bis <math>\frac{3}{4}</math> Gerüsthöhe – Arbeitsbreite 6,40 m</b>									
TurboDrop Injektordüsen			Druck in bar						
			18	20	22	24	26	28	30
Düse Nr.	Größe	Farbe	Düsenausstoß in l/min						
8 (oben)	geschlos- sen	-							
7	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
6	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
5	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
4	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
3	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
2	TD 60-025	lila	2,45	2,58	2,71	2,83	2,94	3,05	3,16
1 (unten)	TD 60-015	grün	1,47	1,55	1,62	1,70	1,76	1,83	1,90
<b>Gesamtausstoß in l/min</b>			<b>37,24</b>	<b>39,26</b>	<b>41,16</b>	<b>42,96</b>	<b>44,70</b>	<b>46,46</b>	<b>48,12</b>
			Wasseraufwand in l/ha						
Fahrge- schwindigkeit in km/h	2,0		1746	1840	1929	2014	2095	2178	2256
	2,2		<b>1587</b>	1673	1754	1831	1905	1980	2051
	2,4		<b>1455</b>	<b>1534</b>	1608	1678	1746	1815	1880
	2,6		<b>1343</b>	<b>1416</b>	<b>1484</b>	<b>1549</b>	1612	1675	1735
	2,8		<b>1247</b>	<b>1315</b>	<b>1378</b>	<b>1438</b>	<b>1497</b>	<b>1556</b>	1611
	3,0		<b>1164</b>	<b>1227</b>	<b>1286</b>	<b>1343</b>	<b>1397</b>	<b>1452</b>	<b>1504</b>

<b>Mittlere Düsenbestückung bis Erreichen der Gerüsthöhe – AB 6,40 m</b>									
TurboDrop Injektordüsen			Druck in bar						
			18	20	22	24	26	28	30
Düse Nr.	Größe	Farbe	Düsenausstoß in l/min						
8 (oben)	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
7	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
6	TD 40-04	rot	3,92	4,13	4,33	4,53	4,71	4,89	5,06
5	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
4	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
3	TD 40-03	blau	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
2	TD 60-025	lila	2,45	2,58	2,71	2,83	2,94	3,05	3,16
1 (unten)	TD 60-015	grün	1,47	1,55	1,62	1,70	1,76	1,83	1,90
<b>Gesamtausstoß in l/min</b>			<b>45,08</b>	<b>47,52</b>	<b>49,82</b>	<b>52,02</b>	<b>54,12</b>	<b>56,24</b>	<b>58,24</b>
			Wasseraufwand in l/ha						
Fahrge- schwindigkeit in km/h	1,8		2348	2475	2595	2709	2819	2929	3033
	2,0		<b>2113</b>	<b>2228</b>	2335	2438	2537	2636	2730
	2,2		<b>1921</b>	<b>2025</b>	<b>2123</b>	<b>2217</b>	2306	2397	2482
	2,4		<b>1761</b>	<b>1856</b>	<b>1946</b>	<b>2032</b>	<b>2114</b>	<b>2197</b>	<b>2275</b>



<b>Große Düsenbestückung bei voller Belaubung – AB 6,40 m</b>									
<b>TurboDrop Injektordüsen</b>			<b>Druck in bar</b>						
			<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
<b>Düse Nr.</b>	<b>Größe</b>	<b>Farbe</b>	<b>Düsenausstoß in l/min</b>						
<b>8 (oben)</b>	<b>TD 40-04</b>	<b>rot</b>	3,92	4,13	4,33	4,53	4,71	4,89	5,06
<b>7</b>	<b>TD 40-05</b>	<b>braun</b>	4,90	5,16	5,41	5,65	5,88	6,11	6,32
<b>6</b>	<b>TD 40-05</b>	<b>braun</b>	4,90	5,16	5,41	5,65	5,88	6,11	6,32
<b>5</b>	<b>TD 40-04</b>	<b>rot</b>	3,92	4,13	4,33	4,53	4,71	4,89	5,06
<b>4</b>	<b>TD 40-03</b>	<b>blau</b>	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
<b>3</b>	<b>TD 40-03</b>	<b>blau</b>	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
<b>2</b>	<b>TD 60-025</b>	<b>lila</b>	2,45	2,58	2,71	2,83	2,94	3,05	3,16
<b>1 (unten)</b>	<b>geschlossen</b>	<b>-</b>							
<b>Gesamtausstoß in l/min</b>			<b>51,94</b>	<b>54,72</b>	<b>57,38</b>	<b>59,94</b>	<b>62,36</b>	<b>64,78</b>	<b>67,04</b>
			<b>Wasseraufwand in l/ha</b>						
<b>Fahrge- schwindigkeit in km/h</b>	<b>1,6</b>	<b>3043</b>	<b>3206</b>	3362	3512	3654	3796	3928	
	<b>1,8</b>	<b>2705</b>	<b>2850</b>	<b>2989</b>	<b>3122</b>	<b>3248</b>	3374	3492	
	<b>2,0</b>	<b>2435</b>	<b>2565</b>	<b>2690</b>	<b>2810</b>	<b>2923</b>	<b>3037</b>	<b>3143</b>	
	<b>2,2</b>	<b>2213</b>	<b>2332</b>	<b>2445</b>	<b>2554</b>	<b>2657</b>	<b>2761</b>	<b>2857</b>	

**Die Ausstoßmengen sind für jedes Pflanzenschutzgerät zu überprüfen.**

Die in der Tabelle angegebene Ausbringungsmenge bezieht sich auf den Druck an den Düsen. Wenn die Ausbringungsmenge in der Praxis nicht erreicht wird, besteht ein Druckabfall vom Manometer zu den

Düsen. In diesem Fall ist der Spritzdruck zu erhöhen. Ist die Ausbringungsmenge größer als errechnet, kann ein Verschleiß der Düsen vorliegen. Dann ist zu überprüfen, ob noch eine exakte Querverteilung gegeben ist.

6.5.3 Spritztechnik Tettang

**Empfehlungen zur Erzielung optimaler Spritzbeläge:**

- Spritzdruck von mindestens 20-25 bar einhalten.
- Wasseraufwand nicht zu knapp bemessen. Sichtbare Abtropfverluste signalisieren Grenze des Aufnahmevermögens der Blattoberfläche.

- Ausreichende Drehzahl des Gebläselüfters begünstigt Bestandsdurchdringung.

Die Düsenbestückung ist dem Stand der Vegetation und den Erfordernissen des zu behandelnden Schadfaktors anzupassen. Deshalb empfiehlt es sich einige Ersatzdüsen in verschiedenen Kalibergrößen bereit zu legen.

Tab.: Bestückungsempfehlung für TurboDrop-Injektordüsen bei voller Belaubung

TurboDrop Injektordüsen		Druck in bar						
		18	20	22	24	26	28	30
Düse Nr.	Größe	Düsenausstoß in l/min						
8 (oben)	TD 04-60	3,92	4,13	4,33	4,53	4,71	4,89	5,06
7	TD 05-60	4,90	5,16	5,41	5,65	5,88	6,11	6,32
6	TD 05-60	4,90	5,16	5,41	5,65	5,88	6,11	6,32
5	TD 04-60	3,92	4,13	4,33	4,53	4,71	4,89	5,06
4	TD 03-60	2,94	3,10	3,25	3,39	3,53	3,67	3,80
3	TD 025-60	2,45	2,58	2,71	2,83	2,94	3,05	3,16
2	TD 015-60	1,47	1,55	1,62	1,70	1,76	1,83	1,90
1 (unten)	TD 015-60	1,47	1,55	1,62	1,70	1,76	1,83	1,90
<b>Gesamtausstoß in l/min</b>		<b>51,94</b>	<b>54,72</b>	<b>57,36</b>	<b>59,96</b>	<b>62,34</b>	<b>64,76</b>	<b>67,04</b>
		<b>Wasseraufwand in l/ha bei 10,50 m Arbeitsbreite</b>						
<b>Fahrge- schwindigkeit in km/h</b>	<b>1,0</b>	2.968	3.127	3.279	3.426	3.562	3.701	3.831
	<b>1,2</b>	2.473	2.606	2.731	2.855	2.969	3.084	3.192
	<b>2,0</b>	1.484	1.563	1.639	1.713	1.781	1.850	1.915

Tab.: TurboDrop-Injektordüsen

Bauteile der Düsen	Düsenbezeichnung bzw. Farbe der Bauteile							
	TD 015-60	TD 02-60	TD 025-60	TD 03-60	TD 04-60	TD 05-60	TD 06-60	TD 08-60
Injektor	grün	gelb	lila	blau	rot	braun	grau	weiß
Kappe	grün	gelb	lila	blau	rot	braun	grau	weiß
Mundstück	rot	grün	blau	blau	grau	grau	schwarz	elfenbein
Druck in bar	Düsenausstoß in l/min in Abhängigkeit vom Druck							
20	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13	5,16	6,20	8,26
22	1,62	2,17	2,71	3,25	4,33	5,41	6,50	8,67
24	1,70	2,26	2,83	3,39	4,53	5,65	6,79	9,05
26	1,76	2,36	2,94	3,53	4,71	5,88	7,07	9,42
28	1,83	2,44	3,05	3,67	4,89	6,11	7,33	9,78
30	1,90	2,53	3,16	3,80	5,06	6,32	7,59	10,12

#### 6.5.4 Sensorsteuerung im Pflanzenschutz

##### Gießbehandlung

Für die Bekämpfung der Peronospora-Primärinfektion und von Bodenschädlingen werden Pflanzenschutzmittel zur Einzelpflanzenbehandlung im Gießverfahren ausgebracht. Aus Gründen des Anwenderschutzes und zur Arbeitserleichterung wurde eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, das Pflanzenschutzmittel punktgenau und mit exakter Dosierung zu applizieren.

Zur Lokalisierung des Hopfenstockes werden optische Sensoren verwendet, die den eingesteckten Aufleitdraht und somit die Position des Stockes erkennen. Die Technik kann zweireihig eingesetzt oder auch mit dem Hopfenkreiseln kombiniert werden.



Abb.: Einzelpflanzenbehandlung (200 ml)

Die Düseneinheit besteht aus einem Windkessel, der für einen Druckausgleich sorgt. Das pneumatische Ventil wird über die Sensortechnik gesteuert. Zur Pflanzenschutzmittelbereitstellung wird die vorhandene Pflanzenschutzspritze für Reihenbehandlungen verwendet.

Die Düsenausstoßmenge kann durch den Arbeitsdruck der Pflanzenschutzspritze und durch die Öffnungszeit des Düsenventils gesteuert werden. Damit sind Ausbringmengen von 250 bis 800 l/ha möglich.

##### Reihenbehandlung

Vor und nach dem Ausputzen und Anleiten des Hopfens (BBCH 11–19) werden Pflanzenschutzmittel in Reihenbehandlungen mit 1-3 Düsen pro Seite auf die Hopfentriebe

appliziert, um Peronospora-Primärinfektionen oder Schädlinge wie z. B. den Erdfloh und Schattenwickler zu bekämpfen. Die Wasseraufwandmenge beträgt bei Reihenbehandlung 400-500 l/ha. Aufgrund des weiten Stockabstandes (1,4-1,6 m) und der geringen Bodenbedeckung der ausgetriebenen bzw. angeleiteten Triebe gelangen bei der durchgehenden Bandbehandlung ca. 80-90 % der Spritzbrühe auf den Boden. Durch den Einsatz von optischen Sensoren, die den Aufleitdraht erkennen, kann der Spritzfächer zwischen den Hopfenstöcken abgeschaltet werden. Bei gleicher Wirkung können so Pflanzenschutzmittel eingespart und die Umwelt geschont werden. Versuche in 2011 und 2012 haben Einsparraten von über 50 % ergeben.



Abb.: Sensorgesteuerte Flachstrahldüsen zur Reihenbehandlung



Abb.: Spritzfächer wurde zwischen den Stöcken abgeschaltet

### 6.5.5 Pflegen und Einwintern der Pflanzenschutzgeräte

Zu den regelmäßigen **Pflegearbeiten** gehört neben der Kontrolle des Ölstandes an Pumpe und Getriebe das Reinigen der Filter. Um einen gleichmäßigen Ausstoß an den Düsen zu gewährleisten, sollen die Düsenplättchen jedes Jahr, bei Keramik-Düsenplättchen jedes dritte Jahr erneuert werden.

Das **Reinigen** von Pflanzenschutzgeräten erfordert besondere Sorgfalt und wurde unter dem Kapitel „Gute landwirtschaftliche Praxis im Pflanzenschutz“ beschrieben.

#### Einwintern des Pflanzenschutzgerätes

- Nach der Spritzsaison soll das Gerät mit einem Reinigungsmittel gespült werden. Man füllt ca. 300 Liter Wasser in den Tank, gibt nach Dosierungsanleitung einen Spritzenreiniger (z. B. Agroclean usw.) dazu und spült bei laufendem Rührwerk das Fass und alle Spritzleitungen durch. Nach 1 Stunde Einwirkzeit lässt man die Brühe nochmals umlaufen und verspritzt das Ganze im Hopfengarten. Anschließend soll die Gebläsespritze nochmals mit

klarem Wasser gespült und alle Filter gereinigt werden.

- Bei Kolbenpumpen zur vollständigen Entleerung die Ablasstopfen abschrauben, bzw. Ablasshähne öffnen und nochmals bei kleinster Zapfwelldrehzahl ca. 20 Sekunden laufen lassen, anschließend in die Öffnungen mit einem Ölkännchen einige Spritzer Hydrauliköl aus pflanzlicher Herkunft spritzen.
- Bei Kolbenmembranpumpen ca. 7 Liter Frostschutzmittel in den Spritzbehälter geben und Pumpe so lange laufen lassen, bis an den Düsen kein Spritzstrahl mehr austritt. Damit ist die Pumpe frostsicher.
- Filter und Düsen abschrauben und reinigen, anschließend Filter und Düsen aus Metall in ein Ölbad (pflanzliches Hydrauliköl) legen. Die Anschlüsse für die Düsen und Filter reinigen und anschließend Filter und Düsen wieder einbauen.
- Manometer abschrauben und frostfrei lagern.

## 7 Ernte

### 7.1 Erntetechnik

#### Vor Beginn der Ernte

- Vorbereitung der Pflückmaschine mit Erneuerung beschädigter und verbrauchter Pflückfinger bzw. ganzer Pflückleisten (ca. alle 3-4 Jahre) bei Pflücktrommeln, Reinigung der Pflücktrommeln und Windreinigung sowie Prüfung der Bänder.
- Alle Schmierstellen müssen nach den von den Herstellern vorgegebenen Intervallen abgeschmiert werden.

#### Während der Ernte

- Regelmäßige Reinigung der Pflücktrommel (mehrmals am Tage) sowie Anpassung der Drehzahl und des Abstandes der Pflücktrommeln an Habitus und Pflückreife

- Regelmäßige Reinigung der Saugwindreinigung zur Verhinderung des Verklebens der Reinigungsgitter und Ventilatorenrohre
- Einstellung der Reinigung zur Erreichung einer einwandfreien Pflückqualität
- Anpassung der Reinigung an die Witterungsverhältnisse durch mehrmalige Korrektur der Einstellung während des Tages
- Verhinderung der Doldenblattrückführung, soweit vorhanden, zur Steigerung der Qualität des Erntegutes
- Bei Bedarf zusätzliche Stängelausscheider einbauen

Tab.: Erntezeitbereich der wichtigsten Hopfensorten

	August											September																												
	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Hall. Mfr.																																								
Spalter																																								
North. Brewer																																								
Tettnanger																																								
Hall. Tradition																																								
Opal																																								
Saphir																																								
Perle																																								
Spalter Select																																								
Aurum																																								
Hall. Magnum																																								
Smaragd																																								
Hersbrucker																																								
Hall. Taurus																																								
Callista																																								
Diamant																																								
Hall. Blanc																																								
Polaris																																								
Tango																																								
Cascade																																								
Herkules																																								
Huell Melon																																								
Ariana																																								
Nugget																																								
Mand. Bavaria																																								

Da die Anbauggebiete Hersbruck und Elbe-Saale weiter nördlich liegen (Tageslänge!), wird die Reife im Anbaugbiet Hersbruck um ca. 3-4 Tage und im Anbaugbiet Elbe-Saale um ca. 5-6 Tage später erreicht.

## 7.2 Erntezeitpunkt

**Der Erntezeitpunkt beeinflusst folgende Qualitätsparameter:**

- Ertrag (dt/ha)
- Alphasäuregehalt (%)
- Ölgehalt (ml/100 g Hopfen)
- Aromapunkte (Feinheit und Intensität)
- Aussehen (Farbe und Glanz)
- Mängel (Befall mit Krankheiten und Schädlingen)

Der richtige Erntezeitpunkt ist wichtig für einen hohen Ertrag und eine gute Qualität. Zu früh geerntete Hopfen sind noch nicht ausgewachsen und erbringen deshalb niedrigere Erträge. Die frühen Erntetermine führten bei den Erntezeitversuchen vor allem in den Folgejahren zu deutlichen Ertragseinbußen! Bis zum Erntezeitpunkt werden noch Reservestoffe in den Wurzelstock eingelagert. Je später die Ernte, desto länger ist diese Einlagerung und desto vitaler und ertragsstabiler bleiben die Bestände. Der höchste Bitterstoffgehalt hingegen wird bei den meisten Sorten vor dem Ertragsoptimum erreicht. Bei zu

später Ernte über den optimalen Zeitbereich leiden vor allem die äußere Qualität und das Aroma.

Bei der Produktion von Flavor-Hopfen ist das oberste Ziel eine optimale sortentypische Aromausprägung zu erreichen. In Erntezeitversuchen konnte der große Einfluss des Erntetermins auf die quantitative und qualitative Aromausprägung aufgezeigt werden.

Mit zunehmender Reife erhöht sich der Gesamtölgehalt, wobei sich die Ölzusammensetzung verändert. Bei den später geernteten Hopfen wurde das sortentypische Aroma durch zunehmend zwiebelige und knoblauchartige Aromanoten beeinträchtigt, was auf den Anstieg von Schwefelverbindungen zurückzuführen ist. Wegen der hohen Qualitätsansprüche müssen gerade bei den Flavor-Hopfensorten die Brauerwünsche beachtet und der Erntetermin mit dem Vertragspartner abgesprochen werden.




Abb.: Schematischer Verlauf der Qualitätsparameter während der Abreife

### 7.3 Befruchteter Hopfen

Befruchteter Hopfen ist nicht nur wegen seines geringeren Brauwerts unerwünscht, sondern bereitet auch dem Pflanzler bei der Ernte Schwierigkeiten:

- Schnellere Abreife mit Farbveränderungen vor allem der Vorblätter (Verbräunung)
- Starke Zerblätterung der Hopfendolden

Zu erkennen ist befruchteter Hopfen an den vergrößerten Vorblättern, die im Vergleich zu unbefruchteten Hopfen schneller die grüne Farbe verlieren und je nach Reife ein gelbliches bis bräunliches Aussehen haben. Am Spindelansatz der Vorblätter sind die 1-2 mm großen, kugeligen Samen zu finden (s. Bild). Wegen seiner unerwünschten Eigenschaften ist eine Befruchtung des Hopfens unter allen Umständen zu vermeiden.

### 7.4 Trocknung

#### Qualitätserhaltung durch eine optimale Trocknung

Hopfen hat bei der Ernte einen Wassergehalt von 76-82 %. Eine sofortige Trocknung auf 9-10 % Wassergehalt ist zur Erlangung der Lagerfähigkeit und Erhaltung der Qualität notwendig. Bei zu langer Lagerung im Grünhopfenvorratsbehälter kann bereits vor der Trocknung die äußere und innere Qualität durch Erwärmung und Kondenswasserbildung beeinträchtigt werden. Das Ergebnis sind Farbveränderungen oder sogenannte „angegangene Dolden“.

Gleichzeitig kann eine zu lange Zwischenlagerung im Grünhopfensilo bereits eine Reduzierung von Alphasäuren und Aromastoffen bewirken! Zudem wird eine optimale Trocknung erst ab dem optimalen Reifezeitpunkt der jeweiligen Sorte möglich.

Eine Verordnung in Bayern zur Bekämpfung wilden Hopfens von 1956 bestimmt, dass wilder Hopfen vom Grundstücksbesitzer bis spätestens 15. Juni zu roden ist. Die Gemeinden sind für die Durchführung der Verordnung verantwortlich.



Abb.: Querschnitt durch eine befruchtete Hopfendolde

#### Ursachen von Qualitätsminderungen während der Trocknung

Zahlreiche Trocknungsversuche belegen, dass in den ersten 10-15 Minuten der Trocknungszeit das meiste Wasser aus den Dolden freigesetzt wird. Damit die äußere und innere Hopfenqualität bei der Trocknung möglichst erhalten bleibt, muss das freigesetzte Wasser über die Trocknungsluft stetig von der Doldenoberfläche abtransportiert werden. Gelingt dies nicht, kann es in kürzester Zeit zu Qualitätsminderungen kommen. Optisch sind diese am Ende der Trocknung am fehlenden Glanz und an der Veränderung der typischen Doldenfarbe bis ins bräunliche erkennbar. Somit ist die Ursache von Qualitätsminderungen meist eine der Trocknungstemperatur entsprechend zu geringe Luftgeschwindigkeit zum Zeitpunkt der höchsten Wasserabgabe des Hopfens.

Hopfen ist ein kapillar hygroskopisches Produkt. Charakteristisch hierfür ist die

Einteilung der Hopfentrocknung in 3 Abschnitte.

### 1. Trocknungsabschnitt

- Verdunstung nur an der Oberfläche
- Innerhalb der Dolde keine Temperaturunterschiede
- konstante Trocknungsgeschwindigkeit
- Luftgeschwindigkeit bestimmt Trocknungsgeschwindigkeit



### 2. Trocknungsabschnitt

- Wassergehalt an der Oberfläche sinkt schneller als im Inneren
- Trocknungsgeschwindigkeit kann nicht aufrecht erhalten werden
- Ort der Verdunstung wandert ins Innere
- Wärme muss ins Innere geleitet werden
- das im Inneren verdunstete Wasser muss dampfförmig an die Oberfläche diffundieren
- Temperaturanstieg in / auf der Dolde



### 3. Trocknungsabschnitt

- physikalisch-chemisch gebundenes Wasser wird abgeführt
- Weitere Verdampfung bis Gleichgewichtsfeuchte erreicht ist




Abb.: Einteilung der Hopfentrocknung in drei Trocknungsabschnitte

## Hordentrocknung

### Optimales Verhältnis der Trocknungsparameter

Durch ein optimales Verhältnis der Trocknungsparameter Schütthöhe, Trocknungstemperatur und Luftgeschwindigkeit in den jeweiligen Trocknungsabschnitten kann die Qualität bestens erhalten und die Trocknungsleistung deutlich gesteigert werden.

Im ersten Trocknungsabschnitt darf die Trocknungstemperatur nur soweit erhöht werden, solange gewährleistet ist, dass das freigesetzte Wasser auch durch eine ausreichend vorhandene Luftgeschwindigkeit abtransportiert wird. Erst im zweiten Trocknungsabschnitt bewirken höhere Trocknungstemperaturen auch höhere Trocknungsgeschwindigkeiten ohne Qualitätsminderungen zu verursachen. Infrarot-Messungen zeigten, dass zu diesem Zeitpunkt die Doldentemperatur, durch die Kühlwirkung des noch vorhandenen Wassers in der Dolde, stets niedriger als die Trocknungstemperatur ist. Damit der Hopfen nicht übertröcknet bzw. die innere Qualität nicht beeinträchtigt wird, sollte die

Temperatur im dritten Trocknungsabschnitt wieder reduziert werden.

In der Praxis kann bereits bei verschiedenen Steuerungen von Luftherzern die Trocknungstemperatur und die Luftgeschwindigkeit für die entsprechenden Trocknungsabschnitte eingestellt werden.

### Technische Hilfsmittel – eine Entscheidungshilfe

Für jede Darre ergibt sich ein optimales Verhältnis der Trocknungsparameter in Abhängigkeit von Sorte, Schütthöhe und installierter Gebläseleistung. Am besten ist dieses durch eine graphische Aufbereitung wichtiger Messwerte wie relativer Feuchte und Temperatur der Darrabluft, Trocknungstemperatur unter der Auszugshorde und der „Drahtmesswerte“ im Schub zu ermitteln. Kennzeichen einer optimierten Darre ist ein einheitlicher Befüll- und Entleer-Rhythmus, d. h. nach jedem Entleeren des Schubers kann die Aufschütthorde sofort wieder mit Grünhopfen befüllt werden.






Abb.: Praxisbeispiel für Anzeige wichtiger Messwerte




Abb.: Messfläche über der Aufschütthorde mit entsprechendem Wärmebild

### Wärmebildtechnik zur Überwachung einer gleichmäßigen Hopfentrocknung

Eine gleichmäßige Temperatur- und Luftverteilung ist eine grundsätzliche Voraussetzung für eine gleichmäßige Trocknung und optimale Trocknungsleistung. Je länger im ersten Trocknungsabschnitt zum Zeitpunkt der höchsten Wasserabgabe des Hopfens mit hoher Luftgeschwindigkeit getrocknet werden kann, desto höher wird die erzielbare Trocknungsleistung sein. Aber auch bei optimal eingestellter Wärme- und Luftverteilung kann es – v. a. bei hohen Luftgeschwindigkeiten – sehr schnell zu einer ungleichmäßigen

Abtrocknung in der Aufschütthorde kommen. Der Grund sind die unterschiedlichen Strömungswiderstände des Grünhopfens in der obersten Lage, bedingt durch unterschiedlicher Lagerzeit vor der Trocknung im Hopfensilo, unterschiedlicher Verweilzeit des Hopfens in der Aufschütthorde von Beginn bis Ende der Befüllung, ungleicher Schütthöhe und unterschiedlicher Schüttdichten. Mit Hilfe der Wärmebildtechnik kann der Trocknungsvorgang auf Gleichmäßigkeit überwacht bzw. bei Bedarf durch gezielte Korrekturmaßnahmen eine gleichmäßige Abtrocknung gewährleistet werden.

### Darrablufttemperatur – ein wichtiger Messwert

In der Praxis werden die besten Qualitäten und Trocknungsleistungen in  $\text{kg/m}^2$  und Stunde in den Darren erzielt, in denen die Luftgeschwindigkeit zum Zeitpunkt der höchsten Wasserabgabe des Grünhopfens in der Aufschütthorde auf mind.  $0,4 \text{ m/s}$  erhöht werden kann. Unter diesen Bedingungen ergibt sich gleichzeitig eine Darrablufttemperatur von mindestens  $30 \text{ }^\circ\text{C}$ . Dadurch ist garantiert, dass das freiwerdende Wasser aus den Dolden über die Trocknungsluft abgeführt wird. Bei einer stärkeren Abkühlung der Darrabluft über die Taupunkttemperatur kommt es zur Kondenswasserbildung, mit der Folge, dass sich die äußere Qualität verschlechtert und die Trocknungsleistung stark verringert.

Deshalb kann über die Darrablufttemperatur das optimale Verhältnis der Trocknungsparameter eingestellt werden. Wird z. B. eine Mindestdarrablufttemperatur unterschritten, muss die Luftgeschwindigkeit erhöht werden. Ist eine Erhöhung der Luftgeschwindigkeit wegen einer begrenzten Luftleistung nicht mehr möglich, muss entweder die Schütthöhe oder die eingestellte Trocknungstemperatur reduziert werden.

### **Luftgeschwindigkeit hat größten Einfluss auf Hopfenqualität und Trocknungsleistung**

Eine Reduzierung der Schütthöhe kann durch eine ausreichend dimensionierte Gebläseleistung vermieden werden. Zum Zeitpunkt der höchsten Wasserabgabe kann die Trocknungsleistung durch höhere Luftgeschwindigkeiten deutlich erhöht und die Qualität am besten erhalten werden. Zusätzlich erhöht sich der trocknungstechnische Wirkungsgrad, da das freigesetzte Wasser ohne Kondensation vollständig abgeführt wird. Da ein enger Zusammenhang zwischen Luft-, Trocknungsleistung und erzielbare Qualitäten besteht, werden derzeit viele Trocknungsanlagen mit höheren Luft- und Heizleistungen nachgerüstet bzw. ausgestattet. Ein leistungsstarkes Trocknen hat eindeutig qualitative, energetische und wirtschaftliche Vorteile.

### **Voraussetzungen und Grundsätze bei der Hordentrocknung**

Eine optimale Trocknungsleistung und vor allem Erhaltung der Hopfenqualität sind erreichbar durch:

- eine geeignete Brennersteuerung für konstante Trocknungstemperaturen
- gleichmäßige Trocknungstemperaturen über die gesamte Darrfläche
- gleichmäßige Luftgeschwindigkeiten über die gesamte Darrfläche
- Befüllung der Aufschütthorde unter Vermeidung von Schüttkegeln
- Trocknungstemperatur 62-68°C, gemessen unter der Auszugshorde
- Luftgeschwindigkeit 0,3 m/s-0,6 m/s
- Schütthöhe von 25-35 cm in Abhängigkeit von Gebläseleistung und Sorte
- Verhältnis der 3 Trocknungsparameter den jeweiligen Trocknungsabschnitten anpassen
- ständige Kontrolle auf Gleichmäßigkeit der Trocknung in der Aufschütthorde mit Hilfe von Wärmebildtechniken
- bei ungleichmäßiger Trocknung in der Aufschütthorde Korrektur von Hand

mittels einer Gabel oder eines Rechens

- graphische Dokumentation der wichtigsten Messwerte
- Trocknungsdauer ist abhängig von Witterung, Sorte und eingestellten Trocknungsparametern

### **Hopfen in Aufschütthorde nicht zu früh kippen**

Durch Messung und graphischer Aufbereitung der Temperatur und der relativen Feuchte der Darrabluft kann der Kippzeitpunkt der Aufschütthorde besser bestimmt werden, damit der Hopfen nicht zu früh gekippt wird. Für jede Darre lässt sich dadurch ein eigener Wert für den optimalen Kippzeitpunkt ermitteln.

### **Hopfen nicht übertrocknen**

- Durch Messen mit dem „Draht im Schuber“ kann der Entleerzeitpunkt besser bestimmt werden, um den Hopfen im Schuber nicht zu übertrocknen.
- Bei Sortenwechsel oder Änderung der Trocknungstemperatur muss bei manchen Systemen der Draht-Sollwert neu überprüft und bei Bedarf korrigiert werden.
- Eine regelmäßige Kontrolle auf Nesterbildung während der Trocknung ist notwendig!
- die Feuchtigkeit des getrockneten Hopfens sollte durch Wassergehaltsuntersuchungen kontrolliert werden.

### **Bandtrocknung**

#### **Beim Bandtrockner gelten die gleichen trocknungstechnischen Grundsätze wie in den Hordendarren.**

Beim Bandtrockner wird wie in den Hordendarren, der Hopfen in drei Lagen in einem kontinuierlichen Verfahren getrocknet. Der feuchtere Grünhopfen befindet sich auf dem obersten Band, während der trockenere Hopfen bis zur optimalen Endfeuchte auf dem untersten Band verbleibt.

Wie in Hordendarren versucht man mit technischen Hilfsmitteln den Trocknungsablauf zu optimieren.

### Beim Bandtrockner ist die gleiche Messtechnik wie in Hordendarren verwendbar

Über Abluftventilatoren wird die feuchte Luft aus dem Bandtrockner abgesaugt. Durch Messen der Temperatur und der relativen Feuchte der Abluft können die Absaugleistungen der Ventilatoren über Frequenzumformer geregelt werden. In Versuchen konnte aufgezeigt werden, dass die äußere Qualität am besten erhalten bleibt, wenn die relative Feuchte im vorderen Bereich des Bandtrockners einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Dadurch ist garantiert, dass das aus den Dolden entzogene Wasser möglichst schnell abtransportiert wird. Die maximal zulässige relative Abluftfeuchte muss, in Abhängigkeit von der Grundeinstellung des Bandtrockners, zunächst durch Dokumentation ermittelt werden. Zum Zeitpunkt der höchsten Wasserabgabe des Hopfens bestimmt die Luftgeschwindigkeit und

nicht die Trocknungstemperatur die Trocknungsgeschwindigkeit. Deshalb führen Trocknungstemperaturen über 65 °C im vorderen Drittel des oberen Bandes sehr schnell zu Qualitätsbeeinträchtigungen, ungleichmäßiger Trocknung und geringerer Trocknungsleistung. Damit der Hopfen nicht zu früh vom oberen Band auf das mittlere Band fällt, kann der Trocknungsverlauf ebenfalls durch Messen der relativen Feuchte der Trocknungsluft mit einem elektronischen Hygrometer im letzten Viertel des obersten Bandes kontrolliert werden. Ähnlich wie in Hordendarren wird mit dem System „Draht im Bandtrockner“ der aktuelle Trockengrad des Hopfens beurteilt werden. Dabei wird im letzten Drittel des unteren Bandes ein Messdraht oder ein Gestänge angebracht, an denen eine Wechsellspannung angelegt wird. Über ein Auslesegerät wird ein Wert angezeigt, der vom Wassergehalt abhängig ist.

Der vorgegebene Sollwert ist am besten einzuhalten, wenn die Bandgeschwindigkeit des Auftragsbandes und der drei Trocknungsbänder jeweils separat eingestellt werden können.




Abb.: Messpunkte und mögliche Grundeinstellungen des Bandtrockners

### Die optimale Luftgeschwindigkeit bestimmt die Trocknungsleistung

Im Bandtrockner wurde bei Trocknungsversuchen bei gleicher Schütthöhe und gleichbleibender Einstellung der Ansaugöffnung des Gebläses stets eine

unterschiedliche Luftgeschwindigkeit in m/s ermittelt. Ursache dafür ist u. a. das unterschiedliche Schüttgewicht des Grünhopfens und die sich daraus ergebende Luftgeschwindigkeit. Innerhalb einer Sorte ändert sich das Schüttgewicht in

Abhängigkeit von Witterung, Reifezeit, Wachstumsbedingungen und Feuchtegehalt. Zwischen den Sorten bestehen naturgemäß Gewichtsunterschiede. Deshalb kann beim Bandtrockner am besten durch

stetige Anpassung der Schütthöhe die Luftgeschwindigkeit so eingestellt werden, dass immer die optimale Trocknungsleistung garantiert ist.

### 7.5 Nutzung alternativer Energiequellen bei der Hopfentrocknung

Mit zunehmend steigenden Energiepreisen wird verstärkt nach alternativen Energiequellen und Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung bei der Hopfentrocknung nachgefragt. Für deren effizienten Einsatz müssen folgende Grundsätze und Zusammenhänge beachtet werden.

#### **Je höher die Ansaugtemperatur, desto niedriger der Heizölverbrauch**

Mit steigender Temperatur der Ansaugluft verringert sich der Heizölverbrauch bei gleicher Trocknungsleistung. Mit der durch alternative Energiequellen erzeugten Wärme wird die Ansaugluft der Trocknung vorgewärmt und somit Heizöl eingespart. Wie viel Liter Heizöl pro Stunde Trocknungszeit eingespart werden können, ist abhängig von der Nennwärmeleistung der alternativen Energiequelle. Durch die Bereitstellung von 10 kWh Wärme kann 1 Liter Heizöl ersetzt werden. Anhand dieser Umrechnung kann sehr schnell die Wärmeleistung der alternativen Energiequelle ermittelt werden. Somit können z. B. durch eine Hackschnitzelheizung mit einer Leistung von 100 kW und bei einem Wirkungsgrad von 90 % 9 Liter Heizöl pro Stunde Trocknungszeit ersetzt werden. Die Heizleistung der Ölbrenner in den Trocknungsanlagen beträgt in Abhängigkeit von der Darrgröße 300–1200 kWh. Anhand der Heizleistung der in der Praxis eingesetzten Ölbrenner wird sehr schnell deutlich, dass durch den für die Hopfentrocknung erforderlichen hohen Energiebedarf Heizöl nur zum Teil durch die zusätzlichen alternativen Wärmequellen ersetzt werden kann.

#### **Positionierung der Wärmetauscher bestimmt den Wirkungsgrad**

Die zusätzliche Nutzung der Wärmeenergie von im Betrieb bereits vorhandenen

Hackschnitzelheizungen oder aus der Abwärme von Biogasanlagen zur Vorwärmung der Ansaugluft erfolgt über Wärmetauscher. In Versuchen wurden Wirkungsgradunterschiede der installierten Wärmetauscher von 20-80 % festgestellt! Die Abweichung lag in der unterschiedlichen Art und Positionierung der Wärmetauscher. Für eine optimale Wärmeabgabe muss der Wärmetauscher so im Luftstrom der Ansaugluft angebracht sein, dass die zusätzliche Wärmequelle von der Ansaugluft vollständig erfasst wird. Darüber hinaus muss der Wärmetauscher auf den erforderlichen Luftdurchsatz abgestimmt sein und darf die Strömungsverhältnisse der Trocknungsluft nicht beeinträchtigen oder verändern.

Bei Berechnung der Wirtschaftlichkeit müssen die Kosten der eingesetzten alternativen Energiequellen, wie z. B. für Hackschnitzel angesetzt werden. Ferner ist die Wirtschaftlichkeit einer Investition abhängig von der Nutzungsdauer, der Investitionshöhe und dem Heizölpreis. Die jährliche Einsparung variabler Trocknungskosten errechnet sich dann aus den eingesparten Heizölkosten abzüglich der variablen Kosten alternativer Energiequellen.

#### **Nutzung der Abwärme von Stromaggregaten**

In vielen Betrieben werden zur Stromerzeugung Stromaggregate eingesetzt. Zum Erzeugen von 10 kWh nutzbarer Wärmeleistung müssen 3 Liter Heizöl aufgewendet werden; denn ein Drittel der eingesetzten Energie ist elektrische Energie und 2/3 ist thermische Energie, wovon 50 % ungenutzt durch Abgase verloren gehen. Die Abwärme der Stromaggregate kann direkt zur Vorwärmung der Ansaugluft verwendet werden. Somit können z. B. mit der Abwärme von einem Stromaggregat mit einer

Leistung von 60 KW bei einem theoretischen Wirkungsgrad von 100 % 6 Liter Heizöl pro Stunde Trocknungszeit ersetzt werden. Wie bei den Wärmetauschern ist der erzielte Wirkungsgrad von der Positionierung des Stromerzeugers abhängig. Wird die Abwärme vollständig vom Luftstrom der Ansaugluft erfasst, können Wirkungsgrade von bis zu 90 % erzielt werden. In der Praxis wurden Wirkungsgradunterschiede von 10-90 % festgestellt.

### Nutzung solarer Gebäudewärme

In vielen Hopfengebäuden ist die Luft durch die Wärmeabstrahlung der Hopfendarren und dem solaren Einfluss unter der Dacheindeckung deutlich wärmer als die Außenluft. Gelingt es, diese wärmere Gebäudeluft mit einem auf die vorhandene Luftmenge energetisch *angepassten* Gebläse oder Lüfter über Schächte oder Lüftungsschläuche der Ansaugluft für die Trocknungsanlage zuzuführen, kann dadurch mit teils geringem Aufwand Energie eingespart werden. Vor einer solchen Baumaßnahme müssen aber unbedingt die brandschutzrechtlichen Vorschriften, wie der Einbau einer Brandschutzklappe und von Staubfiltern eingehalten werden. Zusätzlich sind die Empfehlungen der Hersteller für Trocknungsanlagen zu beachten! Für einen effektiven Wirkungsgrad sollte die Temperatur der genutzten Gebäudeluft mindestens 25 °C betragen und darf die absolute Feuchte dieser Luft nicht höher sein als die absolute Feuchte der Außenluft!

### Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung aus der Darrabluft

Neueste Trends sehen die Integration von Wärmerückgewinnungen vor, mit deren Hilfe die warme Abluft aus der Trocknung über Platten- oder Kreuzstromwärmetauscher zum Anwärmen der Ansaugluft genutzt wird. Dieses System eignet sich in gleichem Maße für konventionelle Hordentrocknungen als auch für Bandtrockner. Hierbei wird die Abluft aus der Trocknung per Gebläse über einen Wärmetauscher ins Freie ausgeblasen. Gleichzeitig saugt

der Warmluftzeuger über diesen Wärmetauscher die kühlere Ansaugluft im Kreuzstromverfahren gegen den Abluftstrom an. Der Luftstrom der Zuluft wird dadurch bei gleichbleibender absoluter Feuchte vorgewärmt.




Abb.: Prinzip eines Kreuzstrom-Wärmetauschers

Je höher die Temperaturdifferenz zwischen Abluft und Ansaugluft ist, desto effizienter arbeitet eine entsprechende Anlage. Bei optimierten Trocknungsabläufen und gleichmäßiger Abtrocknung über die gesamte Trocknungsfläche ist mit einer Energieeinsparung von 25-30% zu rechnen. Entstehendes Kondenswasser beim Betrieb ist ein Zeichen dafür, dass die Wärmerückgewinnungsanlage im optimalen Betriebspunkt arbeitet.

### Wirtschaftlichkeit alternativer Energiequellen

Die Wirtschaftlichkeit einer Investition zur Nutzung alternativer Energiequellen bzw. von Wärmerückgewinnungssystemen ist abhängig von deren Anschaffungskosten, den laufenden Betriebskosten, der voraussichtlichen Nutzungsdauer, der Auslastung sowie des eingesparten Heizöls unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Heizölpreises. Die jährliche Einsparung variabler Trocknungskosten errechnet sich somit aus den geminderten Heizölkosten abzüglich der variablen Kosten der alternativen Energiequellen, wie z.B. der anfallende Hackschnitzelverbrauch oder im Falle einer Wärmerückgewinnung der elektrische Energiebedarf für die zusätzlichen Gebläse.

## 7.6 Konditionierung

### Ziele der Konditionierung

- Sicherung der Hopfenqualität
- Ausgleich der unterschiedlichen Wassergehalte des inhomogenen Hopfens
- Feuchteausgleich zwischen Spindel und Doldenblätter
- Einstellen der gewünschten Hopfenfeuchte
- Erreichen einer opt. Lagerfähigkeit

### Nur gleichmäßig, nicht übertrockneter Hopfen kann optimal konditioniert werden

Der optimale Wassergehalt des Hopfens frisch aus der Darre liegt zwischen 8-10 %. In diesem Zustand liegt der Wassergehalt der Spindel zwischen 25-35 % und bei den Doldenblättern nur noch bei 4-7 %. Bei der Lagerung des Hopfens auf dem Hopfenboden und/oder beim Belüften in Konditionierungskammern werden die unterschiedlichen Wassergehalte des inhomogenen Hopfens und der große Feuchteunterschied zwischen Spindel und Doldenblättern ausgeglichen.

Dieser Feuchteausgleich ist beendet, wenn die Spindel und die Doldenblätter

denselben Wassergehalt erreicht haben. Bei ausgeglichenem Hopfen bleibt der Wassergehalt sehr stabil und ändert sich durch den Einfluss von Umgebungsluft oder Belüftungsluft nur noch sehr langsam. Solange Feuchteunterschiede zwischen Spindel und Doldenblättern vorhanden sind, kann durch die Umgebungsluft und durch die Belüftung in Konditionierungsanlagen der Wassergehalt der Dolden verändert bzw. beeinflusst werden.

### Das Sorptionsverhalten von Hopfen muss bekannt sein

Unter Sorptionsverhalten versteht man die Eigenschaft von Hopfen, Wasserdampf aus der Luft aufzunehmen bzw. abzugeben, bis sich ein Gleichgewichtszustand zwischen der Hopfenfeuchte und der Umgebungsfeuchte der Luft eingestellt hat. Nach den Sorptionsthermen nimmt der Hopfen bei der Lagerung oder Belüftung bei einer relativen Luftfeuchte von 58-65 % nach einer bestimmten Zeit einen Wassergehalt von 9-12 % an.




Abb.: Sorptionsisothermen von Hopfen

### Homogene Partien durch Mischen beim Befüllen der Kammer

Wird der Hopfen vor oder beim Befüllen der Konditionierungskammer gemischt, beginnt bereits schon vor der Belüftung ein Feuchteausgleich des inhomogenen Hopfens. Bei der Belüftung werden dann v. a. die großen Wassergehaltsunterschiede zwischen Spindel und Doldenblättern ausgeglichen.

### Beurteilung der Hopfenfeuchte vor der Belüftung

Durch ein Messen der relativen Feuchte und Temperatur der Umgebungsluft des Hopfens in der Konditionierungskammer kann bereits vor der Belüftung bzw. unmittelbar bei Belüftungsbeginn der Wassergehalt des Hopfens abgeschätzt werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zu Beginn der Belüftung das Spindelwasser über die relative Luftfeuchtigkeit der Belüftungsluft noch nicht ausreichend erfasst wird. Eine relative Luftfeuchte von weniger als 45% deutet darauf hin, dass der Hopfen in der Kammer bei einer Belüftung nur mit Umluft sich auf einen Wassergehalt von unter 9% einstellen würde. Wird dagegen bereits am Anfang der Belüftung mit einer optimalen Belüftungsluft von 22-24°C und 58-65% r.F. im zu belüftenden Hopfen eine relative Feuchte von über 50% gemessen, ist davon auszugehen, dass die Spindelfeuchte noch zu hoch ist. In beiden Fällen ist zunächst eine „Klimatisierungsbelüftung“ vor der Homogenisierung erforderlich.

### Optimale Belüftungsluft hat 22-24 °C und 58-65 % rel. Luftfeuchte

Für eine optimale Homogenisierung und Einstellen einer gewünschten Hopfenfeuchte muss bei der Konditionierung die Temperatur und die relative Feuchte der Belüftungsluft geregelt werden. Da der Feuchteausgleich innerhalb der Dolde temperaturabhängig ist, hat die Temperatur einen größeren Einfluss als die relative Feuchte der Belüftungsluft auf den Wassergehalt des Hopfens.

Die Dolde ist homogenisiert, wenn Spindel und Doldenblätter den gleichen Wasser-

gehalt haben. Für die Kapillarwasserbewegung von der Spindel in die Doldenblätter ist eine Temperatur von 22-24 °C optimal, da die Doldenblätter sowohl Feuchte von der Spindel und gleichzeitig auch von der Belüftungsluft aufnehmen.

### Entscheidend ist ein Messen der Belüftungsluft im Luftverteilteraum der Konditionierungskammer

Durch ein Messen der Temperatur und der relativen Feuchte im Zuluftkanal bzw. Luftverteilteraum der Konditionierungskammer kann über die Mischluftregelung die optimale Belüftungsluft eingestellt werden. Ist der Hopfen in der Kammer zu trocken oder zu feucht, wird der Belüftungsluft nach Bedarf temperierte Luft mit höherer bzw. niedriger Feuchte zugemischt, bis die Mischluft die gewünschte Temperatur und relative Feuchte erreicht hat.

Damit auch bei heißen Erntetagen die optimale Belüftungstemperatur von 22-24 °C eingehalten wird, haben Praxisversuche gezeigt, dass ein korrekt auf die Anlagengröße dimensioniertes Kühl-Pad für die optimale Belüftungsluft sorgen kann. Diese „Kühl-Pads“ bestehen aus einem in einem Rahmen senkrecht stehendem, gefalteten Papier, über das ständig Wasser herabfließt. Bei geschickter Anordnung und Auswahl des Pads kann dieses die Funktion eines Luftbefeuchters als auch einer Kühlung übernehmen. Eine stetige Einstellung der erforderlichen Belüftungsparameter ist durch eine elektronische Steuereinheit sinnvoll.



Abb.: Kühlpad zum Einstellen der richtigen Belüftungsluft

**Kontrolle der Belüftungsluft ist wichtig!**

In der Praxis werden zum Messen der Belüftungsluft Handmessgeräte oder stationär eingebaute Temperatur- und Feuchtefühler eingesetzt. Über diese kann die Mischluftregelung gesteuert werden. Wichtig ist, dass die Temperatur und Feuchte der Belüftungsluft während der Belüftung im Zuluftkanal oder im Luftverteilterraum über eine Digitalanzeige oder einen PC-Bildschirm mitverfolgt werden kann. Zahlreiche Messgeräte können die aus Temperatur und relativer Feuchte berechnete absolute Feuchte der Luft in g Wasser/kg Luft anzeigen. Über diesen Wert kann eine Veränderung der Mischluft sehr schnell festgestellt und auch beurteilt werden, ob der Hopfen in der Kammer durch die Belüftung ausgeglichen, angefeuchtet oder nachgetrocknet wird. Bei 22 °C besteht zudem eine enge Korrelation zwischen der absoluten Feuchte in g/kg Luft und der erzielbaren Hopfenfeuchte.

**Das Messen in der Kammer ist eine zusätzliche Kontrolle und optimiert die Belüftungszeit**

Der Konditioniervorgang bei idealer Belüftungsluft sollte solange fortgesetzt werden, bis sich die Feuchteunterschiede zwischen den Dolden und innerhalb der Dolde vollständig ausgeglichen haben. Dies kann zum einen durch eine ausreichend lange Belüftungszeit bewerkstelligt werden oder über eine direkte oder indirekte Messung der Absolutfeuchte des Hopfens überprüft werden. Ändert sich z. B. der Wert eines Absolutfeuchtemessgerätes über einen Zeitraum von 30 Minuten nicht mehr oder nur kaum, dann kann angenommen werden, dass der Hopfen ausgeglichen ist. Ebenso kann dies auch auf einfache Weise über eine indirekte Messung der Temperatur und der relativen Feuchte überwacht werden. Es sollte aber eine Mindestbelüftungszeit von 4 Stunden eingehalten werden.




Abb.: Schema der Nachbehandlung von Hopfen in Konditionierungskammern




### Zusammenfassende Hinweise zur Steuerung von Belüftungsanlagen

- Voraussetzung ist eine optimale Reife des Hopfens
- Gleichmäßige Trocknung auf 8-10 % Wassergehalt
- Gleichmäßige Verteilung und Durchmischung des Hopfens beim Befüllen der Konditionierungskammer Beurteilung der Hopfenfeuchte in der Kammer vor der Belüftung
- Rechtzeitiger Belüftungsbeginn mit Umluft oder Mischluft
- Messen der Belüftungsluft im Luftverteilerraum der Kammer
- Optimale Belüftungsluft: 22-24 °C und 58-65 % r. LF
- Kontrolle der Belüftungsluft über die absolute Feuchte in g/kg
- Messwerte im belüfteten Hopfen sind eine zusätzliche Kontrolle
- Belüftungszeit: 3-6 Stunden
- Ruhephase des belüfteten Hopfens bis zum Pressen für eine vollständige Homogenisierung erforderlich
- Dokumentation der Messwerte des Belüftungsvorganges
- Geringere Doldenzerblätterung bei opt. Belüftungstemperatur (22-24 °C)

### 7.7 Neutrale Qualitätsfeststellung (NQF)

Die Einführung der "Neutralen Qualitätsfeststellung" im Jahr 1994 hat zu einer deutlichen Verbesserung der äußeren Qualität des Hopfens geführt. So wurde der Anteil an Blatt/Stängel und Abfall um

mehr als die Hälfte reduziert. Der durchschnittliche Wassergehalt der Partien sank um etwa 2 %. Der Anteil an Doldenblätter hat etwas zugenommen.



Quelle: Hopfenring e.V.

Abb.: Neutrale Qualitätsfeststellung, Hallertau

## 7.8 Aktuelle Qualitätstabelle für deutschen Siegelhopfen – Fassung 2021

Wert Zuschlag bzw. Abschlag (= Minderung) = Kaufpreis / Rohgewicht kg x Wert in %

**Qualitätsmerkmal**                      **Wertbereiche - Qualitätsstufe – Zuschlag (+) / Abzug (-)**

### A) Wassergehalt:

Festgestellt nach Methode Analytica EBC 7.2

Der Verkäufer trägt die Kosten einer notwendigen Nachtrocknung. Rohhopfen ist möglichst qualitätsschonend unter bestmöglicher Beachtung der Trocknungsparameter Schütthöhe, Trocknungstemperatur und Luftgeschwindigkeit in der Darre zu trocknen.

	Qualitätsstufe	Wert
<b>Optimalwert</b>	bis 10,5 %	+ 2,0 %
	10,6 % - 11,5 %	0
	11,6 % - 12,5 %	- 2,0 %
	größer 12,5 %	- 6,0 % oder Nacherfüllung

### B) Äußere Beschaffenheit

#### 1. Pflücke

##### a) Blätter- und Stängelanteil, sonstige Bestandteile

Teile von Rebenblättern und Reben-, Blatt- oder Doldenstängel und Hopfenabfall sind bis zu insgesamt 2,39 % zulässig. An der Dolde befindliche Stängel werden erst ab 2,5 cm als Stängel gerechnet. Hopfenabfall sind Kleinsteile von dunkelgrüner bis schwarzer Farbe und sonstige, nicht von der Dolde stammende Bestandteile.

	Qualitätsstufe	Wert
<b>Optimalwert</b>	bis 1,10 %	2,0 %
<b>Standardwert</b>	1,2 % - 2,39 %	0
	2,4 % - 3,9 %	- 2,0 %
	größer 3,9 %	- 4,0 % oder Nacherfüllung

##### b) Doldenblätter

von der Hopfenspindel abgelöste Deck- und Vorblätter sind bis 26,0 % zulässig;

	Qualitätsstufe	Wert
<b>Standardwert</b>	bis 26 %	0
	27 % - 35 %	- 2,0 %
	größer 35 %	- 6,0 % oder Nacherfüllung

#### 2. Sortenreinheit, Samenanteil

Der Samenanteil darf einschließlich etwaiger Fremdsortenanteile und sonstiger Fremdbestandteile maximal 2,0 % betragen. Der Samen ist die voll ausgebildete Frucht (Kugel) der Dolde. Die Hopfen sind in äußerster Sortenreinheit zu liefern. Bei Überschreiten der Toleranzgrenze ist der Käufer zur Nacherfüllung sowie zur Minderung (Multiplikator 1,0) oder zum Rücktritt berechtigt.

#### 3. Dolden

- Krankheiten und Schädlinge (z. B. Peronospora, Mehltau, Botrytis, Blattlaus, Spinnmilbe und Minder-schädlinge)
- Farbe (Veränderung der typischen Doldenfarbe, fehlender Glanz)
- Geruch (kein sortentypisches Aroma, muffig, modrig, Fremdgeruch)

	Befall	Einstufung	Wert
<b>Standardwert</b>	kein	G-1	0 %
	leicht	G-2	0 %
	mittel	G-3	- 2,0 %
	stark	G-4	- 5,0 %
	sehr stark	G-5	- 10,0 % oder Nacherfüllung

Die Geltendmachung weitergehender gesetzlicher Mängel und Schadensersatzansprüche beim Überschreiten der Abschlagswerte und der Nacherfüllung bleibt von den vorstehenden Regelungen der Qualitätstabelle unberührt.

## 7.9 Rebenhäcksel

### Anfall und Raumgewicht von Rebenhäcksel

Der **Anfall** an Rebenhäcksel kann je nach Betrieb, Sorte und Jahr beträchtlich schwanken. Messungen in umfangreichen Versuchen über mehrere Erntejahre haben Differenzen von bis zu 100 % ergeben. Für normal entwickelte Bestände kann von einem Rebenhäckselanfall von **140 dt/ha**, bezogen auf 17,5 dt/ha Trockenhopfen, ausgegangen werden. Für schwächere Bestände oder Landsorten (z. B. Hallertauer Mfr.) ist mit einem geringeren Anfall zu rechnen. Bei ertragreichen Beständen (HKS) sind höhere Rebenhäckselmengen zu erwarten.

Das **Raumgewicht** des Rebenhäcksel zum Zeitpunkt der Ausbringung schwankt je nach Jahrgang, Sorte und Witterung erheblich. Bei Messungen am Transportfahrzeug variiert das Raumgewicht zusätzlich aufgrund unterschiedlicher Verdichtung oder Überladung. Als Ergebnis verschiedener Messungen kann von einem durchschnittlichen Raumgewicht von **350-360 kg/m<sup>3</sup>** ausgegangen werden. Aufgrund der Deklaration der Rebenhäcksel als Wirtschaftsdünger sind die damit verbundenen Auflagen zu Sperrfristen, Ausbringmengen und einer ordnungsgemäßen Lagerung zu beachten.

### Gewässerverunreinigung durch Sickersaft von Rebenhäcksel

Bei der Lagerung von Rebenhäcksel bildet sich im Zuge der Verrottung bereits nach wenigen Tagen Sickersaft, der auf unbefestigten Flächen beim Versickern in den Boden das Grundwasser verunreinigen kann oder durch oberflächigen Abfluss in Gewässer gelangt und diese verunreinigt. Der Sickersaft ist in seiner Schädlichkeit dem Silosickersaft ähnlich. Bereits geringe Mengen können aufgrund des enormen

Sauerstoffbedarfes zum Absterben vieler Lebewesen in einem Gewässer führen. Er belastet ein Gewässer 300-fach höher als häusliche Abwässer.

Der Sickersaft darf deshalb auf keinen Fall in oberirdische Gewässer oder ins Grundwasser gelangen. Um dies zu vermeiden, wird der Rebenhäcksel auf einer dichten Bodenplatte mit Gefälle zu einer Sammelrinne gelagert und der Sickersaft in einen dichten, ausreichend großen Sammel-schacht bzw. in die Gülle- oder Jauchegrube abgeleitet.

### Hygienemaßnahmen

Pilzkrankheiten überdauern oft auf Ernterückständen. Verbleiben oder gelangen diese unhygienisiert zurück auf den Acker, können Neuinfektionen für nachfolgende Kulturen davon ausgehen.

### Aus Vorsorgegründen sollten deshalb folgende Punkte beachtet werden:

- Keine Ausbringung von frischem Rebenhäcksel in Hopfengärten
- Generell kein Rebenhäcksel in welkebefallene Hopfengärten zurückbringen
- Die Randbereiche des Rebenhäckselhaufens werden nicht ausreichend hygienisiert, da die notwendige Temperatur von 70 °C für die sichere Abtötung der Krankheitserreger erst in einer Tiefe von etwa 1 m erreicht wird. Belastete Randzonen daher auf Ackerflächen ausbringen!

Betriebe, die Probleme mit Hopfenwelke haben, sollten aus Vorsorgegründen ihr Rebenhäcksel der Vergärung (Biogasanlage) zuführen. Untersuchungen haben gezeigt, dass nach dem Prozess der Konservierung und Vergärung in der Biogasanlage der Verticillium-Pilz in den Proben nicht nachweisbar war.

## 8 Cross Compliance

In **Bayern** ist eine Broschüre mit den Cross-Compliance-Regelungen 2022 beim jeweils zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erhältlich oder auf der Internetseite des Staatsministeriums zu finden.

<http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/001318/index.php>



Um die Vorgaben betriebsindividuell und vollständig zu überprüfen, sind die Checklisten Cross Compliance (nur CC) bzw. GQS Bayern zu verwenden (beides über

<https://www.lfl.bayern.de/iem/qualitaets-sicherung/>



abrufbar) sowie ggf. eine Beratung in Anspruch zu nehmen (z. B. ÄELF; Kreisverwaltungsbehörden u. Verbundberatung).

## 9 Dokumentationssysteme für den Hopfenbaubetrieb

Im Hopfenbau hat die Dokumentation produktionstechnischer Maßnahmen eine lange Tradition. Seit Jahren muss jeder verkaufte Partie ein sogenannter Pflanzenschutzmittelbogen mit allen durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen beigefügt werden. Oder betriebswirtschaftlich orientierte Landwirte führen seit über 20 Jahren Schlagkarteien, um durch überbetriebliche Auswertungen einen Überblick über ihre Kostenstruktur und Wettbewerbsfähigkeit zu bekommen. Besonders geeignet für die überbetriebliche Auswertung ist die Bayerische Hopfenschlagkartei HSK, die es als EDV-Programm oder als Formblätter gibt (s. nachfolgender Formblattsatz). Des Weiteren können auch Dokumentationen mit dem EDV-Programm „HR Produktpass Plus“ vom Hopfenring über eine Schnittstelle eingeleiten und ausgewertet werden.

Seit einiger Zeit hat das EDV-Programm „HR Produktpass Plus“ eine Schnittstelle zum Abwaageprogramm CoHaP. Dadurch

Betriebe in **anderen Bundesländern** können über die Startseite von GQS

<https://gqs.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite>



auf Informationen und Checklisten der Länder zugreifen.

Spezielle Arbeitshilfen für Betriebe in **Baden-Württemberg** sind unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Gemeinsamer+Antrag/Cross+Compliance+Arbeitshilfen>



**Weitere Auskünfte erteilen die jeweils zuständigen Landwirtschaftsbehörden der Länder.**

ist es möglich, die Aufzeichnungen zu den Pflanzenschutzbehandlungen ins CoHaP zu übertragen und zusammen mit den Abwaagedaten den PSM-Bogen auf elektronischem Wege zu den Handelsfirmen zu senden.

Wer keine Schlagkarteiprogramme zur Dokumentation nutzt, muss dennoch exakte und zeitnahe Aufzeichnungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln machen, die im Rahmen der CC-Kontrollen auch rückwirkend kontrolliert werden. Formblätter für eine einfache Dokumentationshilfe (Erfassungsbogen Pflanzenschutz) und für die Bayerische Hopfenschlagkartei (HSK) finden sie auf den nächsten Seiten oder stehen auch im Internet unter

[https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ipz/dateien/bayerische\\_schlagkartei\\_hopfen.pdf](https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ipz/dateien/bayerische_schlagkartei_hopfen.pdf) zum Download zur Verfügung.



## 9.1 Erfassungsbogen Pflanzenschutz

# Erfassungsbogen Pflanzenschutz im Hopfen 20..

Betrieb: .....



Anwendungsdatum	Pflanzenschutzmittel (vollständige Namen)	Aufwandmenge (kg od. l/ha)	Name des Anwenders	Anwendungsfläche (Schlag, Bewirtschaftungseinheit)																			
				<b>Behandelte Schläge ankreuzen!</b>																			

## 9.2 Erfassungsbogen Düngung

# Schlagbezogene Aufzeichnung der Düngemaßnahmen bis zur Ernte 20\_\_

Dokumentationspflicht laut DüV innerhalb von 2 Tagen nach der Düngemaßnahme



Betriebsleiter/in: \_\_\_\_\_ Betriebsnummer: \_\_\_\_\_

Datum	Düngemittel	Menge	Ausgebrachte Nährstoffe					ha	Anwendungsfläche															
	z.B. NPK 15+5+20	dt/ha m³/ha t/ha l/ha	N	NH <sub>4</sub> -N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO		Name des Schlages oder der Bewirtschaftungseinheit und Fläche in ha															
			kg/ha	kg/ha <small>(nur bei org. Düngern)</small>	kg/ha	kg/ha	kg/ha <small>(optional)</small>																	
20.04.	NPK 15+5+20+2	3	45		15	60	6	Schlagname																
25.05.	Mastschweinegülle (N-P reduziert)	10	40	24	19	25	9																	
								<b>gedüngte Schläge ankreuzen</b>																

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, IPZ 5a Hopfenbau, Wolnzach  
<https://lfl.bayern.de/ipz/hopfen/index.php> unter Downloads

Stand 05/2020 (Erfüllung der Aufzeichnungspflicht)

### 9.3 Bayerische Schlagkartei Hopfen

<b>Bayerische Schlagkartei Hopfen</b>											
<b>Erntejahr</b>	_____										
<b>Anwendungsfläche (Schlag)</b>	_____										
<b>Schlagnummer</b>	_____										
<b>Betriebsdaten</b>											
<b>Betriebsnummer</b>	<b>0 9</b> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
<b>Name</b>	_____										
<b>Straße, Nr.</b>	_____										
<b>Ortsteil</b>	_____										
<b>PLZ, Ort</b>	_____										
<b>Telefon/Fax</b>	_____										
<b>E-mail</b>	_____										
<b>Gesamthopfenfläche</b>	_____										
<b>Arbeitskreis/Ringgruppe</b>	_____										
<b>Schlaggrunddaten</b>											
<b>Sorte</b>	_____										
<b>Virusfrei</b>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>										
<b>Pflanzjahr</b>	_____										
<b>Schlaggröße in ha</b>	_____										
<b>Aufleitungen pro ha</b>	_____										
<b>Lage</b>	eben <input type="checkbox"/> leicht hängig <input type="checkbox"/> stark hängig <input type="checkbox"/>										
<b>Staunässe</b>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>										
<b>Bodenart</b>	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td> </td></tr></table>	01	02	03	04	05					
01	02	03	04	05							
<b>Bemerkungen</b>	<b>US-Norm</b> <input type="checkbox"/> <b>J-Norm</b> <input type="checkbox"/> <b>KVA</b> <input type="checkbox"/> <b>ISO</b> <input type="checkbox"/>										

### Ernte

Ernte von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Ertrag des Schlages \_\_\_\_\_ kg = \_\_\_\_\_ kg/ha

### Qualitätsbefund

Wassergehalt \_\_\_\_\_ % Dolden-Boniturnote (1-5) \_\_\_\_\_  
 Blatt-/Stängelanteil und Krankheiten und Schädlinge:  
 Hopfenabfall \_\_\_\_\_ % Pe ( ) Me ( ) Bo ( ) Bl ( ) RS ( )  
 Doldenblätter \_\_\_\_\_ % Minderschädlinge ( )  
 Alphagehalt \_\_\_\_\_ % Farbe ( ) Geruch ( )  
 Zuschlag \_\_\_\_\_ % Abzug \_\_\_\_\_ %

### Pflanzenschutz

Anwendungs- datum	Pflanzen- schutzmittel	Anwen- dungs- gebiet  (Krankheiten Schädlinge)	Teilfläche in %	Aufwandmenge in l/ha od. kg/ha	Wasser (l/ha)	Gerät *)	Namens- zeichen **)	Eigen Akh/ha	Fremd Akh/ha	Schlepper Sh/ha	Kosten	
											€/kg od. l	€/ha
	<b>Beispiele:</b>											
20.4.	Karate Zeon	Erdflöhen		0,075	400	2	BL	0,5	0,5	0,5		
15.6.	Forum	Peronospora		2,68	1500	1	BL	1,0		1,0		
30.7.	Fusilade Max	Quecke	33	2,0	400	2	BH		0,5	0,5		
<b>Summe</b>												

\*) **Geräte:** 0 = ohne Gerät 1 = Gebläsespritze 2 = Sonstige Spritze  
 \*\*) Namenszeichen des Anwenders: ...**BL = Betriebsleiter; BH = Betriebshelfer** .....



## Düngung (mineralisch und organisch)

Bodenuntersuchung (Jahr) 20 . .

Nährstoffgehalt (mg/100 g) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> \_\_\_\_\_ K<sub>2</sub>O \_\_\_\_\_ MgO \_\_\_\_\_ pH \_\_\_\_\_

Nmin-Untersuchung (Jahr) 20 . . kg N/ha \_\_\_\_\_

Düngeempfehlung für N und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> lt. aktueller Düngebedarfsermittlung

Düngeempfehlung kg/ha N \_\_\_\_\_ P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> \_\_\_\_\_ K<sub>2</sub>O \_\_\_\_\_ MgO \_\_\_\_\_ CaO \_\_\_\_\_

Datum	Düngemittel (z.B. NPK, Gülle, Rebhäcksel)	dt/ha m <sup>3</sup> /ha l/ha	Ausgebrachte Nährstoffe kg/ha						Gerät *)	Eigen Akh/ha	Fremd Akh/ha	Schlepper Sh/ha	Kosten	
			N <sub>ges</sub>	NH <sub>4</sub> -N (**)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	CaO					€/dt	€/ha
<b>Summe</b>														

\*) **Geräte:** 0 = ohne Geräte    1 = Gebläsespritze    2 = sonstige Spritze  
 3 = Düngerstreuer    4 = Stalldungstreuer    5 = Kompoststreuer    6 = Güllefass

\*\*\*) Ammonium-N (NH<sub>4</sub>-N) ist nur bei organischer Düngung einzutragen

### Weitere Angaben zur Ermittlung der variablen Kosten

Gründüngung	Art: _____	kg/ha _____	€/kg _____	€/ha _____
Aufleitdraht	Länge: _____	Stärke: _____	€/dt _____	€/ha _____
Heizöl	Verbrauch l/dt _____	€/l _____	€/ha _____	
Strom	Verbrauch kWh/ha _____	€/kWh _____	€/ha _____	
Konditionierung	ja ( ) nein ( )			
Fremd AK (Lohn, Beantragung, Verpflegung, Versicherung)			€/Akh _____	€/ha _____
Verpackung und Gebühren (Säcke, Herkunft, Zertifizierung)				€/ha _____
Versicherungen (Hagel, Sturm, Feuerinhalt)				€/ha _____
Gerüstreparatur (Material)				€/ha _____
Beiträge (Pflanzerverband, Hopfenring, Maschinenring, BBV)				€/ha _____
Beratungskosten				€/ha _____
Spezielle Steuern (ca. 48 €/ha)				€/ha _____
Bodenuntersuchung				€/ha _____

### Bemerkungen und Notizen

Arbeitswirtschaft					
Datum	Arbeitsgang	Gerät	Eigen-Akh/ha	Fremd-Akh/ha	Schlepper Sh/ha
	Wegackern				
	Schneiden				
	Nacharbeiten und Nachlegen				
	Drahtaufhängen				
	Drahteinstecken				
	Draht – Nacharbeiten				
	Kreiseln				
	Ausputzen und Anleiten				
	Saubermachen				
	Nachleiten				
	Entlauben				
	1. Hopfenputzen				
	2. Hopfenputzen				
	Einarbeitung Gründüngung				
	Einsaat Gründüngung				
	Bodenbearbeitung				
	Bodenbearbeitung				
	Bodenbearbeitung				
	Bodenbearbeitung				
	1. Ackern				
	2. Ackern				
	Bestandskontrolle				
	Bestandskontrolle				
	Bestandskontrolle				
	Bestandskontrolle				
	Windwurfstöcke aufhängen				
	Erntevorbereitung				
	Ernte und Abwaage				
	Rebenhäcksel ausfahren				
	Rebstrunken beseitigen				
	Wildverbissmaßnahmen				
	Gerüstreparatur				
	Bewässerungsmaßnahmen				
	Sonstige Arbeiten				
	Sonstige Arbeiten				
<b>Übertrag Summe Pflanzenschutz</b>					
<b>Übertrag Summe Düngung</b>					
<b>Summe</b>					

## 10 Hopfenring e. V. – der Erzeugerring für Hopfen



Hopfenring e.V.  
Kellerstraße 1, 85283 Wolnzach  
Telefon: 08442/957 300; Fax: 08442/957 333  
Beratungs-Telefon: 0800/957 3000  
E-Mail: [info@hopfenring.de](mailto:info@hopfenring.de)  
Internet: [www.hopfenring.de](http://www.hopfenring.de)



### FÜR QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT IM HOPFENBAU

#### Allgemeines

Der Hopfenring versteht sich neben der vorrangigen Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für die Hopfenpflanzler auch als Dienstleister für die Hopfenwirtschaft. Er ist Mitglied im Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern e. V. (LKP).

Mit der Arbeit und dem Leistungsangebot des Hopfenrings werden den bayerischen Hopfenpflanzern die Fördermöglichkeiten des „Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetzes“ (BayAgrarWiG) eröffnet.

Auch in Baden-Württemberg ist der Hopfenring als Beratungsdienst staatlich anerkannt. Damit kann den Hopfenanbaubetrieben in Tettnang die einzelbetriebliche Beratung gefördert werden.

Die Anzahl der Mitglieder beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 1.418.

Die Geschäftsstelle des Hopfenrings hat ihren Sitz im Haus des Hopfens in Wolnzach. Die Tätigkeiten konzentrieren sich auf:

- Produktionstechnische Beratung der Hopfenpflanzler im Rahmen der pflanzenbaulichen Verbundberatung durch einzelbetriebliche Beratung
- Sonstige Beratungsleistungen
- Projektarbeiten für die LfL
- Boden- und Qualitätsuntersuchungen
- Neutral kontroll. Vertragshopfenanbau
- Musterziehung für die neutrale Qualitätsfeststellung bei Hopfen (NQF)

- Durchführung des Zertifizierungsverfahrens bei Rohhopfen
- Qualitätsmanagementsystem QM-Hopfen
- Betreuung des Nachhaltigkeitssystems für die dt. Hopfenerzeugung
- Fortbildungsveranstaltungen für Sachkundige im Pflanzenschutz

Der Jahresbeitrag (netto) setzt sich zusammen aus: 4,00 € Grundbeitrag + 18,00 € für Infopaket + 1,29 € je ha Hopfenfläche.

#### Bodenuntersuchung auf Nährstoffe und DSN (Nmin)

Eine regelmäßig durchgeführte Bodenuntersuchung auf Nährstoffe und Stickstoff (Nmin) ist die Grundlage einer auf den Bedarf der Kultur abgestimmten, ökonomisch sinnvollen und ökologisch vertretbaren Düngung. Laut Vorgaben der Düngeverordnung sind Standardbodenuntersuchungen mindestens alle 6 Jahre durchzuführen.

Die Betriebe nutzen die kostengünstige Untersuchung über den Hopfenring für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Düngung. Im Jahr 2021 wurden 9.070 Bodenuntersuchungen abgewickelt.

#### Kosten für Mitglieder (Stand: 08/21)

Betriebspauschale	15,00 €
Standarduntersuchung (pH-Wert, Kalkbedarf, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O)	7,70 €

### Als Zusatz zur Standarduntersuchung

Magnesium (Pflicht im KVA)	4,05 €
Bor, Natrium, Mangan, Kupfer	
Zink, Eisen je Element	6,15 €
Spurenelemente im Paket	11,50 €
Humusgehalt (org. Substanz)	12,60 €
Gesamt-N	15,25 €
Kalifixierung	13,60 €
E-Post Pauschale	2,50 €

### Stickstoffuntersuchung (Nmin)

Die Untersuchungskosten betragen bei Probenahme durch den Landwirt 21,00 € je Probe.

Gegen zusätzliche Gebühr ist auch eine maschinelle Probenahme möglich.

Ansprechpartner für die Organisation der Bodenuntersuchung sind die Ringwarte. Das Ringwarteverzeichnis finden Sie auf Seite 60 des grünen Hefts.

### **Produktionstechnische Beratung, Sonstige Beratungsleistungen**

Die aktuelle Information und Beratung der Mitglieder zu allen hopfenbaulichen Themen gehört heute zu den wesentlichen Aufgaben des Hopfenrings. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit mit der staatlichen Hopfenberatung praktiziert. Der Hopfenring ist der Verbundpartner der LfL-Arbeitsgruppe Hopfenbau, Produktionstechnik.

Die Beratung ist unabhängig, neutral und kompetent und gliedert sich in:

#### A) Die produktionstechnische einzelbetriebliche Beratung:

- Pflanzenschutz
- Düngung
- Anbau & Zwischenfrucht
- Bewässerung
- Trocknung, Technik & Energie

In 2021 nutzten 360 Betriebe (38,6 %) in Bayern das einzelbetriebliche Beratungsangebot. In Baden-Württemberg nahmen 19 Betriebe das Beratungsangebot in Anspruch.

Die Beratung landwirtschaftlicher Betriebe wird in Bayern vom Bayerischen Staat gefördert, in Baden-Württemberg vom Land BW und dem ELER.

#### B) Sonstige Beratungsleistungen

- Gruppenberatungen, Feldbegehungen, Fachveranstaltungen, Seminare, Workshops und Arbeitskreise (2021: 45 Veranstaltungen)
- Informationen über Rundschreiben, Ringfax, E-Mail, SMS, Fachbroschüren, Arbeitsmittel
- Kostenfreie Beratungshotline (3.604 Aufrufe)

#### **Beratungstelefon: 0800 / 957 3000**

Mo-Do: 7:00 – 16:00 Uhr

Fr: 7:00 – 12:00 Uhr

**E-Mail: [berater@hopfenring.de](mailto:berater@hopfenring.de)**

#### **BLE-Förderprogramm Energieeffizienz**

Hopfenpflanzler, welche eine Reduzierung des Energieverbrauchs sowie der entsprechenden Energiekosten auf ihren Betrieben anstreben, können sich die hierfür notwendigen Investitionen über das „Bundesprogramm Energieeffizienz“ der BLE mit attraktiven Fördersätzen fördern lassen. Förderfähig sind folgende Bereiche:

1. Einzelmaßnahmen
2. Modernisierung von energieeffizienten Anlagen
3. Regenerative Eigen-Energieerzeugung und Abwärmenutzung
4. Mobile Maschinen und Geräte

Für den Hopfenbau kommen so also beispielsweise der Austausch hocheffizienter Elektromotoren bei Pflückmaschine und Trocknung, der Einbau einer Wärmerückgewinnung, oder auch der Einsatz eines mit Hackschnitzeln betriebenen Warmluft erzeugers in Frage.

Als von der BLE zugelassener Sachverständiger kann HR-Berater Sebastian Grünberger das notwendige CO<sub>2</sub>-Einsparkonzept für die Förderbereiche 2.-4. erstellen. Diese Beratungsleistung wird von der BLE mit 80% gefördert.

## Fortbildung im Pflanzenschutz

Nachdem der Gesetzgeber für Sachkundige im Pflanzenschutz eine regelmäßige Fortbildung in Dreijahres-Zeiträumen festgelegt hat, bietet der Hopfenring in Zusammenarbeit mit der Agrarberatung Bayern entsprechende anerkannte Fortbildungsveranstaltungen an.

Diese werden vorwiegend in den arbeitsärmeren Wintermonaten angeboten und von unseren kompetenten Fachberatern durchgeführt.

Die Gebühr beträgt je Teilnehmer einschließlich der Ausstellung der Bescheinigung netto 31,00 €.

## Arbeitsmittel

Für die Betriebsorganisation, Erfassung und Dokumentation aller produktionstechnischen Maßnahmen bei der Hopfenerzeugung und im Ackerbau werden zahlreiche Hilfsmittel angeboten:

- Vordruck Hopfenschlagkartei kostenlos
- Feldjournal Hopfen 4,67 €
- Pflanzenschutztafel lam. A3 3,74 €
- Pflanzenschutztafel lam. A4 2,80 €
- Trocknungsprotokoll (Heft) 4,67 €
- Konditionierungsprotokoll (Heft) 4,67 €
- Abwaageprogramm CoHaP 20,00 €

Alle Preise netto. Die Artikel sind in der Geschäftsstelle erhältlich oder werden auf Wunsch zzgl. Porto u. Versandkosten per Post zugeschickt.

## Online-Dienstleistungen

Die Geschäftsstelle des Hopfenrings steht den Mitgliedern für die Antragstellung folgender Vorgänge zur Verfügung:

- Mehrfachantrag Online
- Übertragung von Zahlungsansprüchen
- Agrardieselantrag

Die Hilfe umfasst Auskünfte und die Onlineübertragung der Anträge.

Unsere fachkundigen Mitarbeiter erledigen diese Aufgaben zuverlässig und kostengünstig.

Vorherige Anmeldung ist erforderlich!

## Mit QM-Hopfen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anstoßen!

Durch die Teilnahme am QM-Hopfen können Sie Ihren Betrieb durch eine Fachberatung in den Wintermonaten für die zahlreichen Herausforderungen des Hopfenbaus wappnen.

Hierzu zählen insbesondere rechtliche Fragestellungen rund um die DüV, CC-Kontrollen, Saisonarbeitskräften u.v.m. Außerdem unterstützen Sie unsere Berater in der Ermittlung wichtiger Betriebskennzahlen zur Planung effizienterer Prozesse und einer damit einhergehenden Kostensenkung.

Individuelle Fragestellungen rund um den Hopfenanbau können bei den zweistündigen Beratungsterminen ebenfalls bearbeitet werden.

Zusätzlich ist in dem QM-System das Nachhaltigkeitssystem bereits integriert und verursacht beim Pflanzler keinen Mehraufwand.

Neben den Beratungsinhalten erhalten Sie durch die zahlreichen Fachveranstaltungen, Checklisten und Dokumentationshilfen speziell für QM-Betriebe einen Wissensvorsprung sowie wertvolle Arbeitshilfen für die mühsame Büroarbeit.

Gegenwärtig nehmen 200 Hopfenbaubetriebe am QM-System teil. Diese erzeugten im letzten Jahr 31 % der bundesdeutschen Erntemenge.

## Nachhaltigkeitssystem für den deutschen Hopfenbau

Seit 2013 ist es den deutschen Hopfenerzeugern möglich, ihren Betrieb nach den internationalen Nachhaltigkeitskriterien, der sog. SAI-Standards, zu überprüfen und sich als nachhaltig wirtschaftender Betrieb registrieren zu lassen. Für die vergangene Ernte registrierten sich 562 Hopfenbaubetriebe. Sie bewirtschafteten 64,1% der dt. Hopfenanbaufläche.

Seit 2020 gelten für die NH-Zertifizierung neue SAI-Standards (SAI 2.1.).

Innerhalb einer Internet-Plattform des Hopfenrings ist allen Hopfenpflanzern die kostenlose Möglichkeit gegeben, schnell und unbürokratisch ihren Betrieb auf Nachhaltigkeit selbst zu prüfen und registrieren zu lassen.

### Zugangslink:

<https://www.hopfenring.de/leistungen/nachhaltigkeit-im-hopfenbau/>



Der regelmäßig an die SAI-Standards angepasste Selbstcheck muss jährlich vom Betriebsleiter **bis spätestens 15. Mai** online aktualisiert werden.

Eine Registrierung bzw. Änderung nach diesem Stichtag gilt dann erst für das darauffolgende Erntejahr.

Das Nachhaltigkeitssystem stärkt und fördert die Absatz- und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Hopfens. Darüber hinaus bietet es den Pflanzern einzelbetriebliche Vorteile.

Die deutschen Hopfenerzeuger leisten damit einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel und zum Ressourcenschutz.

### Neutral kontrollierter Vertragshopfenanbau (KVA)

Der Hopfenring ist vom Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern e. V. (LKP) mit der Durchführung der vertraglich festgelegten Kontrollen des "Neutral kontrollierten Vertragshopfenanbaues" (KVA) beauftragt. Er überprüft die Einhaltung der Erzeugungsregeln durch Betriebs- und Feldbesichtigungen und stellt für die Hopfen ein Qualitätszertifikat aus.

### Neutrale Qualitätsfeststellung

Im Rahmen der neutralen Qualitätsfeststellung bei Hopfen ist der Hopfenring in das System der Hopfenvermarktung mit einbezogen. Er ist in Bayern zuständig für die Bemusterung der Hopfenpartien im Anschluss an die Hopfenabwaage sowie die Anlieferung der Hopfenmuster zum

Labor. Die Untersuchung selbst erfolgt im neutralen Untersuchungslabor Agrolab.

Die Ergebnisse der neutralen Qualitätsfeststellung werden vom Hopfenring zur Darstellung der erreichten Qualität und für Beratungszwecke ausgewertet.

Die Zahl der bemusterten Partien und Untersuchungsproben bezifferte sich im Jahr 2021 auf 10.491.

### Wassergehaltsbestimmungen

#### 1. Mikrowellen-Feuchtemessgerät

Zur Feuchtigkeitsbestimmung des Hopfens stehen den Mitgliedern drei Untersuchungsstellen mit Mikrowellen-Feuchtemessgeräten zur Verfügung. Die regionale Verteilung im Anbaugebiet Hallertau mit Standorten in Mainburg, Mühlhausen und Wolnzach ergibt eine gute Erreichbarkeit für alle Mitglieder.

Diese Serviceleistung ist für die Ringmitglieder kostenlos.

#### 2. Ballen-Feuchtespießgeräte

Hopfenpartien mit einem sehr inhomogenen Feuchtigkeitsgehalt verursachen bei der Hopfenvermarktung häufig Probleme (Einzelballenbemusterung, Verderb). Vorbeugend und zur Überprüfung abgepackter RB-Hopfenballen eignen sich Ballen-Feuchtespießgeräte sehr gut. Für eine geringe Gebühr können Mitglieder in der Geschäftsstelle Geräte ausleihen.

### Bestimmungen Alphasäuregehalt

Zur Bestimmung des Alphasäuregehalts von Hopfenmustern nach EBC 7.4 bietet der Hopfenring folgende Möglichkeiten an:

- Alphaexpress zur schnellen Ermittlung des Alphasäuregehalts
- Freihopfen-Alphauntersuchung aus dem NQF-Muster

### Amtliche Hopfenzertifizierung

Im Auftrag des Landeskuratoriums für pflanzliche Erzeugung in Bayern e. V. (LKP) führt der Hopfenring für die Hallertauer Siegelgemeinden sowie für die Marktgemeinde Kinding im Anbaugebiet

Spalt das amtliche Zertifizierungs- und Bescheinigungsverfahren auf der Erzeugerstufe durch. Hierfür werden ca. 50 saisonale Mitarbeiter beschäftigt.

Die Zertifizierungsgebühr beträgt 1,34 ct/kg Bruttogewicht.

Zur Erstellung der Hopfenwaagscheine mit dem PC kann vom Hopfenring das EDV-Programm CoHaP zum Preis von 20,00 € erworben werden. Die gesetzliche Pflanzenschutzdokumentation, der Pflanzenschutzmittelbogen je Partie sowie die elektronische Übermittlung des PSM-

Bogens mit den Wiegedaten über den Hopfenring an die Firmen JBS, HVG und SHS können damit erledigt werden.

Zur Übertragung von Waagdaten der HAS-Waage auf den betriebseigenen PC bietet die Firma AST die Speicherbox HAS06 an. Damit können die Vorteile des CoHaP genutzt werden.

**Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. Versandkosten.**



## Unser Leistungsangebot in Bayern:

### ➔ Einzelbetriebliche Beratung

#### Feld:

- Bestandsbeurteilung/Pflanzenschutz (PS-Strategien, Applikationstechnik etc.)
- Anbauberatung (Bodenbearbeitung, Zwischenfruchteinsaat etc.)
- Düngeberatung (schlagbezogene Düngeplanung + Wirtschaftsdüngereinsatz)
- Sortenberatung (Standorteignung, Junghopfen, Pflanzengesundheit)

#### Technik und Energie:

- Dimensionierung und Leistungssteigerung
- Möglichkeiten zur Energieeinsparung, Mess- und Regeltechnik
- Alternative Energiequellen (Planung zur Umstellung)
- Datenerhebung (Verbrauchsdaten, Ermittlung der Luft-Wärmeverteilung)
- Unterstützung beim BLE Förderprogramm zur Energieeffizienzsteigerung
- Allgemeine Fragen zur Hopfen- und Trocknungstechnik

#### Büro und Betriebsorganisation:

- CC- und Fachrechtsberatung (Betrieb und Büro)
- Beratung zur Dokumentation (Dokumentationshilfen, Büromanagement etc.)
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Auswertungen, Ermittlung von Kennzahlen
- Qualitätssicherung (z. B. Bereich Ernte u. Logistik, Vergleich Qualitätsdaten)
- Qualitätsmanagementsystem (z. B. QM-Hopfen, QS, Nachhaltigkeit)

### ➔ Preise für die Einzelberatung in Bayern

<b>1 Stunde Beratung vor Ort:</b>	<b>59,00 € incl. MwSt.<sup>1)</sup></b>
-----------------------------------	---

<sup>1)</sup> Der Bruttopreis beinhaltet auch MwSt. auf staatliche Fördergelder.  
Pro Anfahrt werden 38,- € netto (45,22 € brutto) berechnet

### ➔ Beratungstelefon Hopfenbau (kostenfrei)

☎ **0 800 / 957 3000**

Mo-Do: 7:00 bis 16:00 Uhr

Fr: 7:00 bis 12:00 Uhr



## Unser Leistungsangebot in Baden-Württemberg:

### ➔ Modul 105: Gesamtbetriebliche Qualitätssicherung

- QM-Hopfen, Etablierung von GQS BW und Selbsterklärung zur Nachhaltigkeit im deutschen Hopfenbau
- Bestandsaufnahme, Sensibilisierung für Mängel und Darstellung von Optimierungsmöglichkeiten
- Datensammlung und -bewertung
- Umfassende Beratung zu rechtlichen Vorgaben und Anforderungen

### ➔ Modul 128: Ackerbauliche Spezialkulturen (Hopfen)

- Beratung in allen produktionstechnischen Fragestellungen und Schwachstellenanalyse im Betrieb und am Feld
- Aktuelle Empfehlungen zur Produktionstechnik z. B. Sorten, Pflanzengesundheit, Düngung, Bewässerung, Zwischenfrucht, Gerüstanlage und Aufbereitung des Ernteguts
- Ökonomische Begleitung des Betriebszweigs unter Berücksichtigung der ökologischen Erfordernisse
- Standortangepasstes Nährstoffmanagement

### ➔ Preise für die Einzelberatung in Baden-Württemberg:

Modul	Stunde/ netto	Stunde/ brutto	Förderanteil auf Nettobetrag *	Rechnungs-be- trag/Std. brutto	Höchstbetrag/ Förderung
105	90,00 €	107,10 €	72,00 € (80 %)	35,10 €	1.100 €
128	90,00 €	107,10 €	45,00 € (50 %)	62,10 €	1.000 €

- Förderfähig sind die Beraterzeiten vor Ort sowie Vor- und Nacharbeit

\* Gefördert vom Land Baden-Württemberg und dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER)



### ➔ Einzelbetriebliche Beratung ohne Förderung

Sollten die Förderbedingungen nicht erreicht werden, kann die Beratung des Hopfenrings auch ohne Förderung zum Preis von 90,00 € netto in Anspruch genommen werden.

### ➔ Beratungskreis Tettang

Nach der erfolgreichen Einführung des HR-Beratungskreises Tettang im Jahr 2020 wird auch im Jahr 2022 wieder ein Beratungskreis angeboten werden:

- Monatliches Gruppentreffen der Tettanger Hopfenpflanzer mit einem Hopfenring Fachberater
- Diskussion aktueller Fragestellungen im Hopfenanbau
- Entwicklung von Pflanzenschutz- und Anbaustrategien für die folgenden 4 Wochen



## 11 Organisationen im Hopfenbau

Organisation	Vorwahl	Telefon	Telefax	Anrufbeantworter (Warn-dienst)	e-Mail-Adresse	Internet
<b>Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft</b>						
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Arbeitsbereich Hopfen Kellerstraße 1, 85283 Wolnzach	08161	8640-2400	8640-2402		Hopfenbau.Wolnzach@LfL.bayern.de	www.LfL.bayern.de
Hüll 5 1/3, 85283 Wolnzach	08161	8640-2300	8640-2370		Hopfenforschungszentrum	
Peronosporawarndienst	08161	8640		-2460	@LfL.bayern.de	
<b>Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>						
Abensberg-Landshut Adolf-Kolping-Platz 1, 93326 Abensberg Klötzlmüllerstraße 3, 84034 Landshut	09443 0871	704-0 603-0	704-1155 603-1999		poststelle@aelf-al.bayern.de	www.aelf-al.bayern.de
Ingolstadt-Pfaffenhofen a. d. Ilm Auf der Schanz 43 a, 85049 Ingolstadt Gritschstraße 38, 85276 Pfaffenhofen	0841 08441	3109-0 867-0	3109-2444 867-1199		poststelle@aelf-ip.bayern.de	www.aelf-ip.bayern.de
Ebersberg-Erding Dr.-Ulrich-Weg 4, 85435 Erding	08122	480-0	480-1099		poststelle@aelf-ee.bayern.de	www.aelf-ee.bayern.de
Roth-Weißenburg i. Bay. Johann-Strauß-Straße 1, 91154 Roth	09171	842-0	842-1070		poststelle@aelf-rw.bayern.de	www.aelf-rw.bayern.de
<b>Baden-Württemberg</b>						
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Abteilung 3 Neßlerstraße 23-31, 76227 Karlsruhe	0721	9468-0	9468-112		poststelle@ltz.bwl.de	www.LTZ-Augustenberg.de
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Außenstelle Tettngang Kirchstraße 2, 88069 Tettngang	07542	52184	939097	01805/ 19719725	Max.Weber@ltz.bwl.de	www.LTZ-Augustenberg.de
Landratsamt Bodenseekreis Landwirtschaftsamt Albrechtstraße 77, 88045 Friedrichshafen	07541	204-5800	204-5968	01805/ 19719725	landwirtschaftsamt @bodenseekreis.de	www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de www.bodenseekreis.de
Regierungspräsidium Tübingen Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen	07071	757-0	757-3190		poststelle@rpt.bwl.de	www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de

## Organisationen im Hopfenbau

Organisation	Vorwahl	Telefon	Telefax	Anrufbeantworter (Warn-dienst)	e-Mail-Adresse	Internet
<b>Elbe-Saale</b>						
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) Naumburger Straße 98, 07743 Jena	0361	574041-391	574041-390		bibliothek@tlllr.thueringen.de	www.thueringen.de
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Abt. 7, Ref. 73 Waldheimer Str. 219, 01683 Nossen	035242	6317300	0351/261 21099		poststelle.lfulg@smekul.sachsen.de	www.landwirtschaft.sachsen.de
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt Dezernat Integrierter Pflanzenschutz Strenzfelder Allee 22, 06406 Bernburg	03471	334-348	334-109		pflanzenschutz @llg.mule.sachsen-anhalt.de	www.llg.sachsen-anhalt.de
<b>Weitere Hopfenorganisationen</b>						
<b>Gesellschaft für Hopfenforschung e. V.</b> Hüll 5 1/3, 85283 Wolnzach	08442	3597	2871		gfh@hopfenforschung.de	www.hopfenforschung.de
<b>Hopfenring e. V.</b> Kellerstraße 1, 85283 Wolnzach Beratungstelefon Hopfenbau	08442 0800	957-300 957-3000	957-333		info@hopfenring.de	www.hopfenring.de
<b>Hopfenpflanzerverbände</b> Verband Deutscher Hopfenpflanzer e. V. Kellerstraße 1, 85283 Wolnzach	08442	957-200	957-270		info@deutscher-hopfen.de	www.deutscher-hopfen.de
<b>Regionalverbände</b> Hallertau: Kellerstraße 1, 85283 Wolnzach Spalt: Johann-Strauß-Straße 1, 91154 Roth Tettngang: Kaltenberger Str. 41, 88069 Tettngang Elbe-Saale: Ahornstraße 27, 06268 Querfurt	08442 09171 07542	957-200 842-0 52136 0160- 99714072	957-270 842-55 52160		info@deutscher-hopfen.de poststelle@aelf-rh.bayern.de tt-hops@tettnganger-hopfen.de a.kunze@hvg-germany.de	www.hallertauerhopfen.de www.tettnganger-hopfen.de www.elbe-saale-hopfen.de
<b>Hopfenland Hersbruck e.V.</b> Herpersdorfer Hauptstraße 16, 90542 Eckental		0171- 4731730	09126/ 392931		markus-eckert@gmx.de	-
<b>HVG - Erzeugergemeinschaften</b> Kellerstraße 1, 85283 Wolnzach Spalt: Gewerbepark Hügelühle 40, 91174 Spalt	08442 09175	957-100 78888	957-169 78815		contact@hvg-germany.de info@spalterhopfen.com	www.hvg-germany.de www.spalterhopfen.com
<b>Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e. V.</b> Ledererstr. 2, 85276 Pfaffenhofen/Ilm	08441	6035	805380		info@hopfen.de	www.hopfen.de

