

# Sortenberatung WINTERGERSTE 2-zeilig, 2020/2021

	Tertiärhügelland / Gäu (22)	Jura / Hügelland (23)	Fränkische Platten (21)	Verwitterungsstandorte Südost (17)
Standard-Sorten	<b>California</b>  <b>LG Caspari</b> <b>Sandra</b> <b>SU Ruzena</b> <b>SU Vireni</b>	<b>California</b> <b>KWS Infinity</b> <b>KWS Moselle</b>  <b>Sandra</b> <b>SU Ruzena</b>	<b>California</b> <b>KWS Infinity</b> <b>KWS Moselle</b>  <b>Sandra</b> <b>SU Ruzena</b>	<b>California</b>   <b>Sandra</b> <b>SU Ruzena</b> <b>SU Vireni</b>
Begrenzte Empfehlung	<b>KWS Liga**</b>	<b>KWS Liga**</b>  <b>Valerie<sup>1</sup></b>	<b>KWS Liga**</b>  <b>Valerie<sup>1</sup></b>	<b>Padura<sup>2</sup></b> <b>Valerie<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup>auch Resistenz gegen Gelbmosaikvirustyp BaYMV-2  
Empfehlung für Flächen, die mit BaYMV Typ 1 und 2 befallen sind

<sup>2</sup> keine Resistenz gegen Gelbmosaikviren  
\*\* Winterbraugerste

# Ergebnisdarstellung nach Anbaugebieten

---

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für Wintergerste dargestellt.

Bayern ist hier in vier Gebiete unterteilt:

- Verwitterungsstandorte Südost (17)
- Fränkische Platten (21)
- Tertiärhügelland/Gäu (22)
- Jura/Hügelland (23)

Die Anbaugebiete orientieren sich nicht an politischen Grenzen, sondern reichen teilweise in benachbarte Bundesländer. Für jedes Anbaugebiet werden weitere Anbaugebiete entsprechend ihrer genetischen Korrelation (= Ähnlichkeit) als „Überlappungsgebiete“ definiert und auf diese Weise dynamische Großräume gebildet. Die relevanten außerbayerischen Überlappungsgebiete sind die Gebiete 16 und 19, davon aber jeweils nur die an die bayerischen Anbaugebiete angrenzenden Teilgebiete. Die Daten aus den Überlappungsgebieten werden je nach Ähnlichkeitsgrad gewichtet und bilden gemeinsam mit den Daten des Anbaugebietes die Basis für die Auswertung und Ergebnisdarstellung.

# Anbaugebiete Wintergerste LSV 153

